

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3193/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3193/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3193/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3193/A




cessaria
me med


turba. quia ee
me. nec habent


tendit


180


3193/

































procurat: Martinus

~~Constitutione~~ ~~de~~

Ind: cut the beef



42599
APHORISMI

HIPPOCRATIS, NICO.
LAO LEONICENO
VICENTINO IN
TERPRETE.
LIB. VII.

EIVSDEM PRAESAGIA,
Gulielmo Copo Basiliensi inter-
prete. LIB. III.

EIVSDEM DE RATIONE
victus in morbis acutis. Lib. IIII.

EIVSDEM DE NATURA
humana, Andrea Brentio Pataui-
no interprete.


GALENI ARS MEDICINA
lis interprete Nicol. Leoniceno.

B.



R.

Venet 1530



APHOR. HIPPOCR. LIB. I. 2

CAPHORISMO
RVM HIPPOCRATIS

liber primus, Nicolao Leoniceo
no Vicentino interprete.

Aphor. 1.



Ita brevis, ars vero
longa, occasio autē
præcepti: experimen-
tū periculosum, iudi-
ciū difficile. Nec so-
lum seipsum præsta-
re oportet oportu-
na facientem, sed & ægrum, & affli-
dentes, & exteriora.

Aphor. 2.

In perturbationibus ventris, & vo-
mitibus spontinis, si talia purgen-
tur qualia purgari oportet, cōfert, &
leuiter ferunt. sin minus, contrā. Sic &
vasorum innanitiō, si talis fiat qua-
lis fieri debet, cōfert, & bene tolerāt:
sin minus, contrā. Inspecere itaq; opor-
tet & regionē, & tempus, & ætatē, &
morbos in quibus cōueniat aut non.

Aphor. 3.

Habitus exercitatorum qui ad
summum bonitatis attingunt,

a ii

APHOR. HIPPOCRATIS.

periculosi si in extremo constiterint. neque enim possunt in eodem permanere, neque quiescere. Cum vero non quiescant, neque possunt proficere in melius: reliquum est igitur ut decidant in deterius. His de causis bonum habitum statim soluere expedit, ut corpus rursus nutriri incipiat. neque compressiones ad extremum ducendae: periculosum enim. Sed qualis natura fuerit eius qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit. Sic & euacuationes quae ad extremum deducunt, periculosae. & rursus refectiones, cum extremae fuerint, periculosae.

Aphor. 4.

Vlētus tenuis, atque exquisitus, in morbis quidem longis semper, in acutis vero, in quibus non conuenit, periculosus. Et rursus qui ad extremum deuenit tenuitatis, grauis ē. Nam & repletiones, quae ad extremum deueniunt, graues sunt. Aphor. 5.

IN tenui victu agri delinquant. quo fit ut magis ledatur. Quicūque enim error committitur magnus, maior in hoc fit, quam in paulo pleniori victu

propterea etiā sanis periculosus existit valde exquisitus victus, & constitutus, quoniam errores grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum exquisitus, eo qui sit paulo plenior, magis periculosus.

Aphor. 6.

EXtremis morbis, extrema exquisite remedia optima sunt.

Aphor. 7.

Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu utendum est. Vbi vero non, sed pleniorē victum contingit adhibere: tantum cibi, indulgendum est, quanto morbus extremis est mollior.

Aphor. 8.

Qvando morbus in suo vigore constiterit, tunc victu tenuissimo utendum est.

Aphor. 9.

Coniectari autē oportet, an æger cū victu sufficiat perdurare donec morbus cōsistat, & nūquid prius ille deficiat, nec possit cū victu perdurare, vel morbus antea deficiat, atque hebetescat.

Aphor. 10.

a iii

APHOR. HIPPOCRATIS.

Quibus igitur statim morbus consistit, his statim tenuis victus adhibendus est. quibus vero posterius debet consistere, his & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, cibis subtrahendus. prius vero vberius agendum, ut æger sufficiat.

Aphor. 11.

In accessionibus abstinere oportet. Inam cibum dare, nocuum est, & quibus per circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

Aphor. 12.

Accessiones vero & constitutiones, morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiva incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora intervalla fiant. Sed ex his quæ mox apparerent, indicia sumuntur: quæadmodum in morbo laterali, si circa initio statim sputum appareat, morbum breuiat, si vero postea appareat, producit. Et urinae, & alui excrementa, & sudores, quæcumque apparuerint, vel bonam morborum iudicationem, vel malam, vel breues, aut longos fore morbos ostendunt.

Aphor. 13.

Senes facillime ieiunium ferunt: secundo loco qui ætatem consistentem habent: minus adolescentes: omnium minime pueri, præsertim qui inter ipsos sunt viuidiore.

Aphor. 14.

Qui crescunt, plurimum habent calidi innati. plurimo igitur egent alimento, alioquin corpus absumitur. Senibus vero parum calidi innati inest: paucis propterea fomiti bus egent, quia à multis extinguuntur. Hanc etiam ob causam febres senibus non similiter acutæ fiunt, frigidum enim eorum corpus. Aphor. 15.

Ventres hyeme, & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi: quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est, unde & pluribus egent alimentis. iudicio sunt ætates, & athletæ.

Aphor. 16.

Victus humidus febricitantibus omnibus cōfert, maxime vero pueris, & aliis qui tali victu uti cōsueuerunt.

a iiii

APHOR. HIP P.

Aphor. 17.

ET quibus semel, aut his, & quibus plurane, an pauciora particulatim oporteat afferre, considerandum. Cōdonandum autem aliquid tempori, ætati, & consuetudini. Aphor. 18.

Aestate, & autūno cibos difficillime ferūt, hyeme, facillime: secundum locū ver habet. Aphor. 19.

His qui per circuitus, accessionem habent, nihil dare oportet, neq; cogere, sed subtrahere adiectioni ante iudicationes.

Aphor. 20.

Quæ iudicatur, & iudicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere.

Aphor. 21.

Quæ ducere oportet, quo maxime natura vergit per loca conferentia eò ducere.

Aphor. 22.

Concocta medicari, atq; mouere non cruda, modo non turgeant, plurima vero non turgent.

Aphor. 23.

Diectiones, non multitudine sunt
æstimandæ, sed si talia deiciantur
qualia conueniunt, & ægri facile
tolerant. Atq; vbi vsq; ad animi de-
fectionem expedit ducere, faciendū,
si æger possit tolerare. Aphor. 24.

In acutis passiōibus raro, & in prin-
cipiis medicinis purgantibus vti, &
hoc cum præmeditatione faciendū.

Aphor. 25.

Si qualia oportet purgari, purgen-
tur, confert, & facile ferunt si con-
trā, difficulter.

APHORISMO

RVM HIPPOCRATIS

liber secundus, Nicolao Leonice-
no Vicentino interpretē.



Aphor. 1.
In quo morbo sōnus
laborem facit, morta-
le, si vero iuuat, non
mortale.

Aphor. 2.

Vbi somnus delirium sedat, bo-
num.

Aphor. 3.

APHOR. HIPPOCRATIS.

Somnus, atque vigilia, utraque si modum excefferint, malum.

Aphor. 4.

Non satietas, non fame, neque aliud quicquam quod modum naturae excefferit.

Aphor. 5.

Spontaneae lassitudines, morbos praenuntiant.

Aphor. 6.

Quicunque dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorem non sentiunt; his mens aegrotat.

Aphor. 7.

Quae longo tempore extenuantur corpora, lete reficere oportet, quae vero breui: breuiter.

Aphor. 8.

Si à morbo cibum assumens quis non corroboratur, pluri alimēto corpus uti significatur. quod si non assumente cibum hoc accadat, scire oportet quod indiget euacuatione.

Aphor. 9.

Corpora cum quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere.

Aphor. 10.

Non pura corpora quanta plus nutritur, tanto magis laedes.

Aphor. 11.

Facilius est impleri potu, quam cibis.

Aphor. 12.

Quæ reliquuntur in morbis, recidivas facere consueverunt.

Aphor. 13.

Quibuscunque crisis, id est iudicatio fit, his non grauis ante accessionem. Quæ vero subsequitur magna ex parte leuior existit.

Aphor. 14.

In profluuiis alui, mutationes excrementorum iuuant, nisi ad malam mutatio fiat.

Aphor. 15.

Vbi fauces ægrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, excretiones inspicere oportet. Nam si biliosæ fuerint, corpus vna ægrotat. si vero similes sanis, tutum est corpus nutrire.

Aphor. 16.

Vbi fames, laborandum non est.

Aphor. 17.

Vbi cibis præter naturam plus ingestus est, hic morbum facit. ostendit autem sanatio.

Aphor. 18.

Eorum quæ vniuersim & velociter nutriunt, veloces quoque sunt excretiones.

APHOR. HIPP.

Aphor. 19.

Actorum morborum non om-
nino sunt certæ prænu-
tiationes, aut salutis, aut mortis. Aphor. 20.

Quibus iuuenibus adhuc alius
humecta est, his senescētibz
exiccatur. Quibus vero iue-
nibus adhuc alius sicca est, his sene-
scentibus humectatur. Aphor. 21.

Famem, thorexis, id est vini potio
soluit.

Aphor. 22.

Quicunque morbi ex repletio-
ne fiūt, curat euacuatio. Et qui-
cunque ex euacuatione, reple-
tio. & aliorum contrarietas.

Aphor. 23.

Acuti morbi in quatuordecim die-
bus iudicantur.

Aphor. 24.

Septenorum, quartus est index. Al-
terius septimanæ octauus princi-
pium. Est autem & vndecimus con-
templabilis. Ipse enim quartus, est al-
terius septimanæ. Rursus vero & de-
cimus septimus contemplabilis. ipse
siquidem quartus, ē à quartodecimo:

LIB. II.

septimus vero, ab undecimo.

Aphor. 25

A Estiuæ quartanæ magna ex parte breues: autumnales, longæ, & maxime quæ hyemem attingunt.

Aphor. 26

F Ebrem cōuulsioni superuenire melius est, quā feбри cōuulsionem.

Aphor. 27

His qui non ex ratione leuius se habent, non oportet fidere, neque multum formidare mala quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia non sunt, neque multū durare, & permanere consueuere.

Aphor. 28.

F Ebricitantium non omnino leuiter, permanere corpus, & nihil minui, vel etiam plus quā ratio postulat contabescere, malum. hoc enim morbi longitudinem, hoc vero imbecillitatem significat.

Apho. 29

Cum morbi inchoant, si quid mouendum videtur, moue. cum vero consistunt, ac vigēt, melius est quietem habere.

Aphor. 30

APHOR. HIP P.

Circa initia, & fines, omnia imbecilliora. cum vero consistunt fortiora. Aphor. 31

Elus qui ex ægritudine bene cibatur, nihil proficere corpus malū. Aphor. 32

Omnes ferē qui male se habent circa initia bene cibati, nec quicquā proficientes: circa finem rursum cibū non appetunt. qui vero circa initia cibum valde non appetunt, postea bene appetentes, ii melius euadunt. Aphor. 33

In quouis morbo mente constare, & bene se habere ad illa quæ offerruntur, bonum. contra vero se habere, malum. Aphor. 34

In morbis minus piclitantur quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quā quibus secūdum nihil istorum congruit. Aphor. 35

In quouis morbo partes ad vmbilicū, & imū vētrē attinētes crassitudinē habere, melius est. multum vero extenuari, ac contabescere, prauum. Sed & hoc quoque ad inferiores pur

gationes, piculosum. Aphor. 36

Qui salubritatem corporis habent, p[er] medicamenta euacuat[ur] cito exoluuntur. & qui prauo vtuntur cibo. Aphor. 37

Qui bene se habet corpore, difficulter ferunt medicationes. Aphor. 38

Parum deterior potus, aut cibus, suauior aut, melioribus quidem, sed minus suauibus, est praefendus. Aphor. 39

Seniores iuuenibus plurimum egrotant minus. Qui vero morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte committuntur ad mortem. Aphor. 40

Rauedines, & grauedines in valde senibus coctionem non admittunt. Aphor. 41

Qui frequenter, ac fortiter absque causa manifesta exoluuntur, de repente moriuntur. Aphor. 42

Soluere morbum, quem apoplexiam vocant, forte, impossibile. debile vero non facile. Aphor. 43

Strangulati, atque dissoluti, nondum mortui, non referuntur qui

APHOR. HIP P.

bus spuma circa os fuerit.

Aphor. 44

Qui natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quā qui graciles.

Aphor. 45

Quicunque iuuenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime ætatis, & temporū, & locorum, & victuum quoque liberantur.

Aphor. 46

Dubius doloribus simul eundē locū infestantibus, vehemētior alterum obscurat.

Aphor. 47

Dum pus cōficitur, dolores, ac febres accidunt magis, quā iam confecto.

Aphor. 48

In omni corporis motu ubi laborare cœperit, quies statim lassitudinē aufert.

Aphor. 49

Qui cōsueti solitos labores ferre, & si fuerint imbecilles, & senes, non consuetis, fortibus, atque iuuenibus facilius ferunt.

Aphor. 50

Quæ ex lōgo tēpore consueta sūt, etsi deteriora sunt, insuetis minus molestare solent.

Oportet

LIB. III.

Oportet igitur ad insueta pmutari.

Aphor. 51

Purimum, atque repente euacua
re, vel replere, vel calefacere, vel
refrigerare, siue quouis alio modo
corpus mouere: periculosum. quo-
niam omne nimis est naturæ inimi-
cum. sed quod paulatim fit, tutum est
tum aliás, tum cum ab altero ad alte-
rum transitus fit.

Aphor. 52

Omnia secūdum rōnem facienti,
si non succedat secundū rōnem,
non est transeundum ad aliud, stante
eo quod à principio visum est.

Aphor. 53

Quicunq̃ue alios humiditas ha-
bēt, siquidem iuuenes fuerint,
melius commutant his qui
siccas habent. Ad senectam vero de-
terius commutant, nam fenescētibus
magna ex parte exiccant.

Aphor. 54

Magnitudo corporis iuuentē qui-
dem, neque indecens, neque illi
beralis, senectæ vero inutilis, & dete-
rior paruitate.

b

APHOR. HIPPOCRATIS.
CAPHORISMO,
RVM HIPPOCRATIS
liber tertius, Nicolao Leonice-
ceno Vicentino interprete.

Aphor. 1



Mutationes tēporū potif-
simū pariunt morbos:
& in quibusdam tēpo-
ribus magnę mutatio-
nes, aut frigoris, aut ca-
loris, & alia pro ratiōe, eodē modo.

Aphor. 2

Naturarū, hæ quidē ad æstatē, hæ
vero ad hyemē bene, malēve se
habent.

Aphor. 3

Orbi quoq; alii ad alia bene, vel
male se habent, & quædam æta-
tes ad tēpora, & loca, & victus gene-
ra.

Aphor. 4

In temporibus, quando eadem die
modo calor, modo frigus fit, autū-
nales morbos expectare oportet.

Aphor. 5

Astri auditū hebetātes, caligino-
si, caput grauātes, pigri, dissoluē-
tes. qñ huiusmodi tempestas pualue

rit, talia in morbis patiuntur. At si aquilonia fuerit, tusses, fauces, alui duræ, difficultates urinae, horrores, costarum dolores, & pectoris. quoniam hac tempestat praualuerit, talia in morbis expectare oportet. Aphor. 6

Quando estas fit verisimilis, sudores in febribus multos expectare oportet. Aphor. 7

In siccitatibus febres acutæ fiunt: & si annus magna ex parte talis fuerit, qualem fecerit constitutione, tales plurimum morbos oportet expectare. Aphor. 8

In constantibus temporibus, cum tempestive tempesta redduntur, morbi constantes & boni iudicii fiunt. In inconstantibus autem, inconstantes, & mali iudicii. Aphor. 9

Autumno morbi acutissimi, atque exitiales, maxima ex parte. Verum vero saluberrimum, & minime exitiale. Aphor. 10

Autumnus tabidis malus. Aphor. 11

De temporibus: si quidem hyems sicca, & aquilonia fuerit, ver

APHOR. HIP P.

vero pluuioſum, & australe neceſſe eſt, aſtate febres acutas, & lippitudi-
nes (Græci ophthalmias vocant) & in-
teſtinorum difficultates, præcipue ve-
ro mulieribus, & viris qui natura ſunt
humidiores.

Aphor. 12

SI vero hyems australis, & pluui-
ſa, & ſerena fuerit, ver autem ſic-
cum & aquiloniũ, mulieres quibus par-
tus ad ver ineſt, ex quacunq; occaſio-
ne abortiunt: quæ vero pariēt, imbecilles,
& morbidos infantes pariūt, quare vel
ſtatim intereūt, vel tenues, & valetu-
dinarii viuūt. Ceteris vero mortalibus
difficultates inteſtinoꝝ, lippitudines ſic
cæ fiunt. Senioribus aut deſtillationes
quæ cito interiment.

Aphor. 13

SI vero æſtas ſicca fuerit, & aquilo-
nia, autũnus vero pluuiioſus, & au-
ſtralis, dolores capitis ad hyemẽ fiūt,
& tuſſes, raucedines, atq; grauedines,
quibuſdam autem & tabes.

Aphor. 14

SI vero aquilonius, & ſiccus: his qui
naturam habent humidiores, &

mulieribus conferet, reliquis autem erunt lippitudines siccae, & febres acutae, & grauedines. nonnullis vero & atræ biles.

Aphor. 15

EX anni autē constitutionibus (quod in totum dixerim) siccitates īribus sunt salubriores, & minus mortiferae.

Aphor. 16

Morbi in pluuiarum multitudine magna ex parte fiunt febres longae, alui profluvia, putredines, morbi comitiales, & attoniti, quos apoplexias Græci vocant, & anginae. In siccitatibus autem, tabitudines, lippitudines, articulorū dolores, stillicidia vrinæ, & difficultates intestinorum.

Aphor. 17.

Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem corpora densant, contendunt, & bene mobilia, colorationa, & melius audientia faciunt, & alios exiccant, oculos mordent, & si pectus dolor aliquis obsederit dolorē augēt. Austrinæ dissoluunt corpora, & humectant, auditum obtundunt, capita aggrauant, &

APHOR. HIP P.

vertigines faciūt, oculis atq; corpori-
bus difficilem motum præstant, & al-
uos humectant. Aphor. 18

PEr tempora anni, vere quidem, &
prima æstate pueri, & qui hos se-
quuntur ætate, optime degunt, & sa-
ni sunt maxime. Aestate vero & au-
tūno, vsque ad aliquid senes. Reliquū
& hyeme, qui mediā ætatem habent.

Aphor. 19

MOrbi, omnes quidē in omnibus
tēporibus fiunt, quidā vero ma-
gis in quibusdam ipsorum & fiūt &
excitantur.

Aphor. 20

VEre etenim furores, & atræ biles
& morbi comitiales, & pfluua
sanguinis, & angina, & grauedines,
& raucedines, & lepre, & tusses, & im-
petigines, & vitilignes, & pustule vl-
cerosæ plurimæ, & tubercula, & arti-
lorum dolores.

Aphor. 21

AEstate aut, nōnulli horū, & febres
cōtinuæ, & ardētes, & tertianæ
febres, & quartanæ, & vomitus, & a-
lui profluua, & lippitudines oculorū,
& aurium dolores, & oris ulceratio

nes, genitaliū putredines, & sudamina.
Aphor. 22

A Vtūno vero, & plurimi vel æstiuī morbi fiūt, & febres quartanę, & erraticę, & lienes, aquę iter cutē, & tabes, & stillicidia vrinę, & difficultates ītestinoꝝ, & leuitates ītestinoꝝ, & coxēdicū dolores, & anginę, & anhelationes, (quas Græci asthmata vocāt) ilei, morbi comitiales furores, atræbiles.
Aphor. 23

H Yeme v̄o, morbi laterales & pulmōis īflāmātiōes, grauedines, atq; raucedines tussēs, dolores pectoris & laterū, atq; lūboꝝ, capitis dolores, vertigines, & apoplexię. Aphor. 24

I N etatibus aut talia cōtingūt, puis & nuper natis puerulis, oris vlcera (q̄ aphthę vocātur) vomitus, tussēs, vigilię, pauores, vmbilici īflāmationes, auriū humiditates. Aphor. 25

I N p̄gressu vero cū iam dentire incipiūt, gingiuarū pruriges, febres, cōuulsiones, alui p̄fluvia & maxime cū caninos edūt dētes, & his præsertim pueris, qui crassissimi sunt, & aluos duras habent. Aphor. 26

b iiii

APHOR. HIP P.

Cum vero iam magis adoleuerint
 tonsillæ & vertebræ quæ in occi-
 pitio ad interiora luxationes, crebri
 anhelitus (quos Græci asthmata vo-
 cant) calculi, lumbrici rotundi, ascari-
 des, verrucæ (quas Græci acrochordo-
 nas vocant) satyriæ, strumæ, & alia tu-
 bercula, sed præcipue ante dicta.

Aphor. 27

Gradioribus at, & iâ accedentibus
 ad pubertatē plurima ex his, &
 febres diurnæ magis, & ex naribus
 pfluuia sanguinis.

Aphor. 28

Plurimæ autem passiones pueru-
 lis iudicantur. nonnullæ quidem
 in quadraginta diebus, nonnullæ in
 septem mensibus, nonnullæ vero in an-
 nis septem, quædam vero iam ad pu-
 bem accedentibus. quæ vero permāse-
 rint, nec in pubertate finierint, pue-
 rulis, aut fœminis cum menstrua erū-
 punt, consenescere consueverunt.

Aphor. 29

Adolescentibus autem sanguinis
 Aspuitiões, tabes, febres acute, mor-
 bus comitialis, & alii, sed præcipue an-
 te dicti.

Aphor. 30

Vltra hanc ætatem asthma: id est creber anhelitus, morbi laterales pulmonis inflammationes, letarghi, phrenetides ardores, diuturna pflu- uia, cholera, difficultates intestinorū, leuitates intestinorū hemorrhoides.

Aphor. 31

Senibus spirandi difficultates, distil- lationes cū tussē, vrinę stillicidia, vrinæ difficultates, articulorum dolo- res, renū passiōes, vertigines, apople- xie mali habitus, pruritus totius cor- poris, vigilię, alui, oculorum, & nari- um humiditates, visus obtusus, glau- cedines, auditus graues.

APHORISMO

RVM HIPPOCRATIS

liber quartus, interpte Nico-
lao Leonicensi Vicentino.



Aphor. 1

Tero gerētes sunt me-
dicādę, si materia tur-
get quarto mense, &
vsq; ad septimum, sed
has minus. Iuniora
autem & seniora ve-

APHOR. HIPPOCRATIS.

rerī oportet.

Aphor. 1.

IN medicationibus talia educere ē corpore, qualia & sponte prodeū, talia vtilia, quæ vero contrario modo prodeunt, cohibere oportet.

Aphor. 3.

SI qualia oportet purgari, purgentur, confert, & leuiter ferunt. Contraria vero grauiter.

Aphor. 4.

Medicari æstate superiores magis, hyeme vero inferiores.

Aphor. 5.

Sub cane, & ante canem difficiles sunt medicationes.

Aphor. 6.

Graciles & facile vomentes purgare superius, cauentes hyemē.

Aphor. 7.

Vomentes vero difficulter, & mediocriter bene carnosos, per inferiora cauentes æstatem.

Aphor. 8.

Tabidos vero cauentes, ad superiores purgationes.

Aphor. 9.

Melancholicos plenius inferiores,
eadem ratione contraria appo-
nentes. Aphor. 10.

Medicari in valde acutis: si mate-
ria turget, eadē die. Tardare enī
in talibus malū est. Aphor. 11.

Quibus tormina, & circa vm-
bilicū labores, & lumboꝝ do-
lor, qui neq; à medicamento,
neq; aliter soluitur, in aquā intercutē
siccā firmatur. Aphor. 12.

Quorum alui intestinorum le-
uitate laborant, hyberno tpe
supra purgari, malum. Aphor. 13.

Ad helleboros qui nō facile supra
purgantur, eorū corpora ante po-
tionem pluri cibo, atq; quiete hume-
ctanda sunt. Aphor. 14.

Cum biberit quis helleborum, ad
emotiones quidē corporū ducere
magis, ad somnos vero, atq; quietem
minus. Indicat autē nauigatio turbari
motione corpus. Aphor. 15.

Cum volueris magis ducere helle-
borū, moue corpus: cū vero siste-

APHOR. HIPPOCRATIS.

E, somnū facito, & non moueto.

Aphor. 16.

Carnes sanas habentibus hellebo-
rus periculosus. Facit enim cōuul-
sionem.

Aphor. 17.

Si quis febrē non habēs, abstineat
à cibo, & cordis morsum, seu ver-
tiginem patitur, & oris amaritudinē
sentit, purgatione indigere per supe-
riora significat.

Aphor. 18.

Supra præcordia dolores, purga-
tione indigere per superiora signi-
ficant. Quicunq; vero inferiora mo-
lestant, per inferiora.

Aphor. 19.

Qui in medicamentis purgati,
non sitiunt, non quiescunt pri-
usquam sitiant.

Aphor. 20.

Non febricitantibus si tormina
acciderint, & genuū grauitas, &
lūborū dolor, purgari inferius oport-
ere significatur.

Aphor. 21.

Diectiones nigræ, qualis est san-
guis niger, sponte venientes, siue
cum febre, siue sine febre, pessimæ: &
quanto colores magis prauī fuerint

plures, peius: cum medicamento vero melius, & quanto colores plures non prauī. Aphor. 22.

MOrbis quibuscumque incipientibus si atra bilis, vel supra, vel infra exierit, letale.

Aphor. 23.

Quibuscumque ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, siue quo vis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger de subter exierit, postridie moriuntur.

Aphor. 24.

Difficultas intestinorum, si ab atra bile incoeperit, letalis est.

Aphor. 25.

Sanguis quidem supra, qualiscumque fuerit malus: infra aut, bonus est.

Aphor. 26.

A difficultate intestinorum habitato, si veluti carunculae exeant, letale est.

Aphor. 27.

Quibus in febribus sanguinis fluxerit multitudo, quacumque ex parte cum reficiuntur, alui his humectantur.

Aphor. 28.

APHOR. HIPPOCRATIS.

Q Vibus biliosæ deiectiones, superueniente surditate cessant: & quibus surditas, superuenientibus biliosis deiectionibus cessat.

Aphor. 29.

Q Vibus in febribus sexto die rigores fiunt, difficile iudicium sequitur.

Aphor. 30.

Q Vibuscunq; accessiones fiunt, quacunq; hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habent difficile.

Aphor. 31.

L Assitudinem habentibus in febribus, in articulos & circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

Aphor. 32.

Q Vibuscunq; resurgentibus ex morbis, si quid laborauerit, hic fiunt abscessus.

Aphor. 33.

S Ed & si ante morbum aliqua parte doluerit, hic morbus firmatur.

Aphor. 34.

S I à febre habito tumore nō exiēte in faucibus, strangulatio repente superuenerit, letale.

Aphor. 35.

Si à febre habito loculum, peruer-
titur, & vix potest deuorare sine
vilo tumore, letale est.

Aphor. 36.

Sudores febricitanti si incoeperint,
boni, & tertio die, & quinto, & se-
ptimo, & nono, & vndecimo, & quar-
todecimo, & septimodecimo, & vi-
gesimo, & vigesimo septimo, & trige-
simo quarto. hi enim sudores indicat
morbos. Qui vero non ita fiunt, labo-
rem significant, & morbi longitudi-
nem, & recidiuam.

Aphor. 37.

Frigidi sudores, cum acuta quidē
febre mortem: cum mitiori autē,
longitudinem morbi significant.

Aphor. 38.

Qua parte corporis sudor est,
ibi significat morbum.

Aphor. 39.

Et qua parte corporis calor, aut fri-
gus, ibi morbus.

Aphor. 40.

Et vbi in toto corpore mutatiōes,
& si corpus refrigeretur, vel rursus
calefiat, vel color alter ex altero fiat,
longitudinem morbi significat.

Aphor. 41.

APHOR. HIPPOCRATIS.

SVdor multus ex somno factus absque causa manifesta, corpus uti plurimum cibo significat. Si vero cibum non accipiet, hoc accidat, scire oportet quod evacuatione indiget. Aphor. 42.

SVdor multus calidus, vel frigidus superfluens, frigidus magis, calidus minus, significat morbum.

Aphor. 43.

Febres quaecumque non intermittentes, tertia die fortiores fiunt, magis periculosa. Quocumque autem modo interimiserint, periculum abesse significatur. Aphor. 44.

QVibus febres longae, his tubercula, vel labores in articulis fiunt. Aphor. 45.

QVibus tubercula, vel in articulis labores fiunt: hi pluribus utuntur cibis. Aphor. 46.

Si rigor incidat febre non deficiente, aegro iam debili: letale est.

Aphor. 47.

Excreationes in febribus non intermittentibus, liuidae, cruentae, foetidae, omnes malae, & biliosae, & si bene exeunt, siue per alui excretionem, siue per urinas:

per vrinas: bonæ. si vero non aliquid
eorū quę iuuant, per hęc loca excerni-
tur: malū.

Aphor. 48.

IN febribus non intermittētibz, si
partes exteriores frigide, interiores
vruntur, & sitim habeat, letale est.

Aphor. 49.

IN febre nō intermittente, si labrū,
vel oculus, vel nasus, vel superciliū
peruertatur, vel non videat, vel nō au-
diat, iam debili existente corpore,
quicquid horum euenerit, mors pxi-
ma est.

Aphor. 50.

VBi in febre non intermittēte dif-
ficultas spirandi, & deliriū acci-
derit, letale.

Aphor. 51.

IN febribus, abscessus q ad primas
iudicationes non soluunt, longitu-
dinem morbi significant.

Aphor. 52.

Q Vicūq; in febribus, vel in aliis
morbis sponte illachrimant,
nihil absurdum. qui vero non
spōte, absurdus.

Aphor. 53.

Q Vibz circa dētes in febribus
quidā lentores nascuntur, his
fortes fiunt febres.

c

APHOR. HIPPOCRATIS.

Aphor. 54.

Q Vibus plurimum siccae tussis
leuiter irritantes in febribus
ardētibus fiunt, nō multū siti
infectantur.

Aphor. 55.

EX inguine tumoribus febres oēs
malae, praeter diarias.

Aphor. 56.

Febrecitanti sudor superueniens fe-
bre non deficiente, malū. Proro-
gatur enī morbus, & multā significat
humiditatē.

Aphor. 57.

Qui à conuulsione, aut disten-
sione neruorū tenetur, febre
superueniente liberatur.

Aphor. 58.

A febre ardente habito, rigore su-
perueniente, solutio.

Aphor. 59.

Tertiana exquisita septenis circui-
tibus, quod longissimū est, iudi-
catur.

Aphor. 60.

Qui in febribus aures ob-
surduerūt, sanguis ex naribus
fluens, aut alius turbata, sol-

Fuit morbus.

Aphor. 61.

Febrecitante nisi diebus imparibus

febris reliquerit, solet recidiuare.

Aphor. 62.

Q Vibus in febribus morbus regius ante diē septimū accidit, malū.

Aphor. 63.

Q Vibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febre soluantur.

Aphor. 64.

Q Vibus in febribus morbus regius, septimo, vel nono, vel vndecimo, vel quartodecimo superuenerit, bonū: nisi dextrū ilium obduruerit. si vero non, non bonū.

Aphor. 65.

IN febribus circa ventriculū & fortis æstus, & cordis morsus, vel dolor, malū.

Aphor. 66.

IN acutis febribus conuulsiones, & circa viscera dolores fortes, malū.

Aphor. 67.

IN febribus ex somnis timores, vel conuulsiones, malū.

Aphor. 68.

IN febribus spiritus offendens, malum. conuulsionē enim significat.

Aphor. 69.

Q Vibus urinae crassæ, grumosæ, paucae, nō sine febre, multum

APHOR. HIPPOCRATIS.

do veniens ex his tenuis iuuat. ꝑcipue
vero tales veniunt qbus ab initio, vel
breui sedimē inest. Aphor. 70.

Q Vibus vrinæ perturbatæ qua-
les sunt iumentorū, his dolor
capitis vel adest, vel aderit.

Aphor. 71.

Q Vibus septima iudicatur, his
nubeculam habet quarta die
vrina rubeā, & alia ex rōne.

Aphor. 72.

Q Vibus vrinæ albæ, & perspi-
cua, malæ: præsertim si in de-
lirantibus appareant.

Aphor. 73.

Q Vibus ilia suspensa murmurā-
tia lumborū dolore superue-
niente, his alui humectantur,
nisi flatus erūpant, aut vrinæ multitu-
do proueniat. hæc vero in febribus.

Aphor. 74.

Q Vibus speratur abscessum fu-
turum ad articulos, liberat ab
abscessu vrina multa, crassa &
alba facta, qualis in laboriosis febli-
bus quarto die quibusdā incipit fieri.
Si vero etiam ex naribus fluxerit san-

guis, breui admodum solutio fit.

Aphor. 75.

Si sanguinē, aut pus mingat: aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat.

Aphor. 76.

Quibus in vrina crassa existente carūculę parue, aut veluti capilli vnā exeunt, his à renibus excernitur.

Aphor. 77.

Quibus in vrina crassa furfurea quædam simul exeunt, his vesica scabie laborat.

Aphor. 78.

Qui cunque sponte sanguinem mingunt, his à renibus venulam ruptam significatur.

Aphor. 79.

Quibus in vrinis arenosa subsistunt, his vesica laborat calculo.

Aphor. 80.

Si sanguinem mingant, aut grumos, vel stillicidiū vrinę habeant, & dolor in anum incidat ventrem, & pectinem, & semen: circa vesicam labor est.

Aphor. 81.

Si sanguinē aut pus minxerit, aut squāmulas, & grauis odor adsit,

c iii

APHOR. HIPP.

vesicæ exulcerationem significat.

Aphor. 82.

Q Vibus in vrinaria fistula tubercula nascuntur: his suppuratione facta, & eruptione, solutio.

Aphor. 83.

Mictio noctu plurima facta, parvam significat deiectionem.

CAPHORISMO
RVM HIPPOCRATIS LI
ber quintus, interprete Nicolao Leonicensi Vicentino.

Aphor. 1.



Conuulsio ex helleboro, letalis est. Aphor. 2.

Conuulsio ex vulnere, letalis est.

Aphor. 3.

Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus, aut conuulsio superueniens, malum.

Aphor. 4.

Ex superflua purgatione, conuulsio, aut singultus superueniens, malum.

Aphor. 6.

Si ebrius quispiam repente obmutuerit, conuulsus moritur, nisi febre cor

ripiatur, aut vbi ad horam peruenerit qua soluuntur crapulæ, vocem recuperet.

Aphor. 6.

Q Vicūq; à distentione corripitūtur, ī quatuor diebus pereūt: si vero has effugerint, sani fiūt.

Aphor. 7.

Q Vibuscūq; morbi comitiāles fiunt, ante pubertatem mutationem accipiunt. quibuscūq; autē vigesimo quinto, cōmoriuntur.

Aphor. 8.

Q Vicūq; morbo laterali laborātes in quatuordecim diebus nō repurgātur, hi ad suppurationē vertūtur.

Aphor. 9.

T Abes fiūt maxime etatibus à decimo octauo vsq; ad trigessimum quintum.

Aphor. 10.

Q Vicūq; ab āgina liberātur, his ad pulmonē vertitur, & ī septē diebus pereūt: si vero has effugerint, suppurātur.

Aphor. 11.

Q Vi tabe molestātur, si sputum qđ extussiunt graue olet, iniectum carbonibus, & capilli in capite defluūt, letale.

Aphor. 12.

c iiii

APHOR. HIP P.

Q Vibuscunq; tabe laboratibus
capilli à capite defluunt, his
alui profluuium superueniente
moriuntur. Aphor. 13.

Q Vicunq; spumofum sanguinē
expuunt, his è pulmone edu-
ctio fit. Aphor. 14.

A Tabe habito profluuium alui su-
perueniens, letale. Aphor. 15.

Q Vicūq; ex morbo laterali sup-
puratur, si in quadraginta die-
bus purgantur, à die à qua fit
ruptio, liberatur. Si vero nō, ad tabē
transeunt. Aphor. 16.

C Alidū vbi quis sapius eo vtatur,
hæc mala affert, carniū effoemi-
nationem, neruorum incontinentiā,
mentis torporē, profluuiā sanguinis,
animi defectionē, hæc ad quē mors.

Aphor. 17.

F Rigidum autem, conuulsiones di-
stentiones, liuores, rigores febriles.
Aphor. 18.

F Rigidum inimicum ossibus, den-
tibus, neruis, cerebro, spinali me-
dullæ. calidum vero, vtile.

Aphor. 19.

Quæcūq; refrigerata sunt excallescere oportet, exceptis his quibus sanguis fluit, aut fluxus est.

Aphor. 20.

Vlceribus, frigidum quidem mordax cutē obdurat, dolorem insuppurabilem facit, liuorē obducit, rigores febriles, cōuulsiones, distentiones.

Aphor. 21.

Est autem ubi in distentione sine ulceratione, iuvene bene carnosio, ætate media, frigide aque multa perfusio calorem reuocat. Calor autem, hæc soluit.

Aphor. 22.

Calidū suppuratoriū nō in oī vlcere, magnū ad securitatē iudiciū, cutē molit, extenuat, dolorē sedat, rigores, cōuulsiones, & distentiones mitigat: & ex his q̄ ad caput attinent, eius soluit grauitatē, plurimū autē confert ocium fracturis, sed nudis p̄cipue, eorūq; maxime qui in capite vlcera habent, & quæcūq; à frigore moriūtur, vel vlcerātur, & repentibus comesis, sedi, pudendis, vtero, vesicæ. his calidū amicū, & iudicans, frigidū inimicum

APHOR. HIPPOCRATIS.

& perimens.

Aphor. 23.

IN his frigido vtendum vnde fluit
sanguis, aut fluxurus est, nō ad ipsa,
sed circa ipsa vnde influit: & quæcūq;
inflammationes, vel inflammina ad ru-
brum, & subcruentū sanguine recenti
tendūt, nā veteribus nigredinē affert.
Erysipelas etiā non vlceratū iuuat: nā
exulceratū lēdit.

Aphor. 24.

FRigida qualis nix, & glacies pe-
ctori inimica, tussiles mouēt, & san-
guinem, & destillationes.

Aphor. 25.

TVMores articulorū, atq; dolores
absq; vlcere, & podagricos quo-
que, atq; cōuulsa, horū plurima frigi-
da aqua large effusa leuat, & extenu-
at, soluitq; dolorē. nā modicus torpor
dolorem soluit.

Aphor. 26.

AQUA quæ cito calet, & cito refri-
geratur, leuissima est.

Aphor. 27.

QVI noctu bibere appetunt. his
admodum sitientibus si super
dormierint, bonum.

Aphor. 28.

Suffitus aromatum muliebria ducit. sæpius vero ad alia utilis esset nisi capitis faceret grauitatem.

Aphor. 29.

Grauidas purgare turgente materia à quarto mense vsq; ad septimum, minus vero has. Recentiores autem, & seniores vereri oportet.

Aphor. 30.

Mulierem vtero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, letale est.

Aphor. 31.

Mulier vtero gerens sanguine misso ex vena, abortit: & magis si foetus sit maior.

Aphor. 32.

Mulieri sanguinē euimenti, menstruis erupentibus, solutio.

Aphor. 33.

Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum.

Aphor. 34.

Mulieri in vtero gerenti si alius plurimū profluat, periculum est ne abortiat.

Aphor. 35.

Mulieri quæ vterinis molestat, aut difficulter parit superueniēs sternutatio, bonum.

APHOR. HIP P.

Aphor. 36.

Mulier menses decolores, nec per
idē semper tempus venientes,
purgationem indicāt esse necessariā.

Aphor. 37.

Mulier vtero gerenti si mammae
graciles repente fiant, abortit.

Aphor. 38.

Mulier vtero gerenti, si altera mā-
ma gracilis fiat geminos habē-
ti, alterū abortit. & si quidem māma
dextera gracilis fiat, marem: si vero
sinistra, foeminam.

Aphor. 39.

Si mulier quę neq; grauida est, neq;
peperit, lac habet: huic menstrua
defecerunt.

Aphor. 40.

Quibuscumque mulieribus ad
māmas sanguis colligitur, fu-
rorem significat.

Aphor. 41.

Si velis noscere an conceperit mu-
lier, cum dormitura est ei aquam
mulsam potandā da: & si alui tormi-
na patietur, concepit: si minus, non
concepit.

Aphor. 42.

Mulier si marē concepit, bene co-
lorata est: si vero foeminam, ma-

le colorata.

Aphor. 43.

Si mulieris grauidæ, i vtero sit erysi-
pelas, letale.

Aphor. 44.

Quæcūq; p̄ter naturā tenues exi-
stentes vtero gerūt, abortiūt
priusq; crassescāt.

Apho. 45.

Quæcūq; mediocriter corpora
habentes, abortiunt, secundo
aut tertio mense sine occasio-
ne manifesta: his acetabula vteri ple-
na mucoris sunt, & nō possunt ex pō-
dere foetum continere, sed disrumpū-
tur.

Aphor. 46.

Quæcūq; p̄ter naturā crassæ,
nō cōcipiunt vtero. his omen-
tū os vteri cōprimit: & prius
q; extenuentur, non concipiunt.

Aphor. 47.

Si vterus in coxam vergens suppu-
ratur, necesse est linamētū fieri.

Aphor. 48.

Foetus, mares quidē in dextris: fœ-
minæ vero in sinistris magis.

Aphor. 49.

Vt secunda p̄locidat, sternutato-
rio appposito, & nares apprehen-
dito, & os.

Aphor. 50.

APHOR. HIP P.

M Vlieri si velis mēstrua cohibere,
cucurbitulā quāmaximā ad
māmas appone. Aphor. 51.

Q Væ vero gerunt, his vteri os
comprimitur. Aphor. 52.

M Vlieri vtero gerēti, si lac multū ē
māmis effluat, foetū ibecillum si
gnificat, si vero māmē solide fuerit,
foetum significant saniozem.

Q Væ corrupturæ sunt foetus, his
māmē extenuātur. Si vero rur
sus duræ fiant, dolor aut mā
mas, aut coxas, aut oculos, aut genua
infestabit, & non corrūpēt. Apho. 54.

Q Vibus os vteri durū est, his vte
ri os cōprimi est necessarium.
Aphor. 55.

Q Væcunque vtero gerente à fe
bribus corripuntur, & fortis
ter calefiūt sine occasione ma
nifesta, difficulter pariunt, & cū picu
lo, aut abortū facientes periclitātur.
Aphor. 56.

I N fluxu muliebri si cōuulsio, & ani
mi defectus aduenerit, malum.

Aphor. 57.

Si mēstrua plura fiāt, accidūt morbi: & si non fiant, ex vtero morbi contingunt.

Aphor. 58.

Recto intestino, aut vtero inflāmationē patiēte, vrinx stillicidiū accidit, & renibus purulentis vrinx aduenit stillicidium.

Aphor. 59.

Si mulier nō concipit, scire autē velis si cōceptura sit, pānis circumtecta de subter suffias, & si odor videatur p corpus ire ad nares, & os, scito quod ipsa non ex seipſa sterilis est.

Aphor. 60.

Si mulieri vtero gerenti purgationes eant, ipossibile est foetum esse sanum.

Aphor. 61.

Si mulieri cessent purgationes, neque febris, neque rigor superueniat, & fastidia incidunt, iudica ipsam in vtero habere.

Aphor. 62.

Quæcunq; frigidos, & spissos vteros habent, non cōcipiūt. Et quæcunq; p̄humidos vteros habēt nō cōcipiūt. extinguitur enī in eis genitura. Et quæcūq; siccos, magis

APHOR. HIP P.

& adurentes. nam ex defectu alimēti
corrumpitur semen. Quæcunq; vero
ex vtriusq; mediocrem habent tempe-
raturam, hæc fecundæ sunt.

Aphor. 63.

Similiter aut & in maribus. aut enī
ppter corporis raritatem spiritus
extra fertur, vt semen nō trāmittatur
ad os: vel propter spissitudinem hu-
mor nō exit foras: vel ppter frigidi-
tatē nō cōcalescit, ita vt ad hūc colli-
gatur locum: vel ppter caliditatē hoc
idem accidit.

Aphor. 64.

LAc dare caput dolentibus, malū:
malū vero & febricitantibus, &
quibus ilia suspēsa murmurāt, & siti-
culosis: malū autē & quibus in febri-
bus acutis bilioſe sunt deiectiones, &
qbus sanguinis multi deiectio facta
est. Cōuenit autē, & tabidis dare qui
nō valde multū febricitāt, & in febri-
bus longis, & paruis, si nullū ex supra-
dictis signis affuerit, & præter ratio-
nem cōsumptis.

Aphor. 65.

Quibus tumores in vlceribus
apparent non conuelluntur
maxime, neque infaniunt.

Verum

Verum his euanescētibus de repente
huiusdā à tergo cōuulsiones & distē
tiones fiūt: quibusdā autē insania, vel
dolor lateris acutus, vel suppuratio,
vel difficultas ītestinorum, si tumores
sunt rubicundi. Aphor. 66

Sil in vulneribus fortib⁹, & prauis
tumor nō appareat, ingēs malū.
Aphor. 67

Molles, boni: crudi vero, mali.
Aphor. 68

Dolenti partē capitis posteriōrē,
in frōte recta vena incisa pdest.
Aphor. 69

Rigores incipiūt mulieribus quidē
ex lumbis magis, & per dorsum
ad caput: sed & viris parte corporis
posteriore magis, q̄ anteriore, veluti
femorū, cubiti. Sed & cutis rara indi
cio aut est pilus. Aphor. 70

Aquartanis capti nō admodū cō
uulsiōibus capiūtur. Si vero prius
capiantur, & quartana supuenerit, li
berantur. Aphor. 71

Quibus cutes circuntenduntur
aridæ & siccæ, sine sudore mo
riūtur, qbus vero laxæ & raræ,
d

APHOR. HIPP.

cum sudore moriuntur.

Aphor. 72.

Q Vi regio morbo laborant, nō multum ventosi sunt.

CAPHORISMO,
RVM HIPPOCRATIS

liber sextus, interprete Nico
lao Leonicensi Vicentino.

Aphor. 1.



N longis leuitatibus
intestinarū si ructus
acidus fiat qui prius
nō erat, signum bo
num.

Aphor. 2.

Q Vibus nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur. Quibus vero contraria, salubrius degunt.

Aphor. 3.

IN longis difficultatibus intestinalium, inedia ex fastidio malum, &

V cum febre peius.

Aphor. 4.

Vulnera circum glabra, praua sunt.

Aphor. 5.

Dolores qui sunt in lateribus & pe

etoribus, atq; aliis partibus, si multū differāt p̄discēdum. Aphor. 6.

Renum, & vesicæ vitia in senioribus difficulter sanantur.

Aphor. 7.

Dolores vētris sublimes, leuiiores. Qui vero nō sublimes, fortiores.

Aphor. 8.

Aqua inter cutem laborātibus, vl̄cera in corpore facta difficulter sanantur.

Aphor. 9.

Latæ pustulæ non admodum pruriunt.

Aphor. 10.

Caput dolēti, & circūdolenti, pus, vel aqua, vel sanguis effluens p̄ nares, aut os, aut aures, morbū soluit.

Aphor. 11.

Atrabile vexatis, & renū passionibus, hēmorrhoides superuenientes, bonum.

Aphor. 12.

Adiuturnis sanato hēmorrhoidib⁹, si vna nō seruatur, piculū est aquā iter cutē, vel tabē aduenire.

Aphor. 13.

Asingultu habitū sternutatio superueniens liberat.

Aphor. 14.

Ab aqua iter cutem habito, si aqua a venis in ventrem defluerit,

d ii

APHOR. HIPPOCRATIS.

solvitur morbus.

Aphor. 15

A Longo alui profluvio habito, spontaneus vomitus superueniens morbum soluit.

Aphor. 16

A Morbo laterali, vel pulmōia habito, alui profluvium adueniens, malum.

Aphor. 17

Lippientem alui profluvio corripere, bonum.

Aphor. 18

Vesica dississa, aut cerebro, aut corde, aut septo, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut vetriculo, aut iecore, letale est.

Aphor. 19

Cum dississum fuerit os, aut cartilago, vel nervus, aut genæ particula tenuis, vel præputium, neque augetur, neque coalescit.

Aphor. 20

Si ventrem sanguis præter effunditur, necesse est suppurari.

Aphor. 21

In infanientibus si varices, vel hæmorrhoides superuenerint, infantiæ solutio.

Aphor. 22

Quæcumque rupta ex dorso ad

cubitus descendunt, venæ sectio soluit. Aphor. 23.

Si timor, atq; maestitia longo tempore habētes pſeuerent, ex eo atrabilis significatur. Apho. 24.

Si quod intestinorum graciliū disſcindatur, non coalescit. Aphor. 25.

Erysipelas ab exterioribus verti ad interiora, non est bonum: ab interioribus autē ad exteriora, bonū. Aphor. 26.

Qui in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluuntur. Aphor. 27.

Quicūq; suppurati, aut aquam inter cutē patiētes vrūtur, aut secantur, si pus, aut aqua vniuersim effluxerit, omnes moriūtur. Aphor. 28.

Evnuchi, neq; podagra laborant, neq; caluifiūt. Aphor. 29.

Mulier podagra non laborat, nisi menstrua defecerint. Aphor. 30.

Per podagra non laborat ante vsum venereorum.

APHOR. HIPP.

Aphor. 31.

Dolores oculorū meri potio, aut
balneum, aut venæ sectio, aut me-
dicamentum epotum soluit.

Aphor. 32.

BAlbi ab alui profluvio maxime
capiuntur.

Aphor. 33.

Qui acidum eructant: non val-
de morbo laterali corripun-
tur.

Aphor. 34.

Qui Vicunq; calui sunt, his magnę
varices non fiunt. Quibus ve-
ro caluis varices magnę super-
ueniunt, hi rursus capillati fiunt.

Aphor. 35.

Aqua inter cutem laborantibus
tussis superueniens, malum.

Aphor. 36.

Difficultatem vrinx vena detecta iu-
uat: secare vero interiores.

Aphor. 37.

Angina habito, si tumor fiat
in collo, bonum.

Aphor. 38.

Cancros occultos omnes melius
est non curare. Curati enim cito
pereunt: nō curati vero, longius tem-
pus perdurant.

Aphor. 39.

Conuulsio fit, vel ex repletiōe. vel
inanitione: ita vero & singultus.

Aphor. 40.

Quibus dolor circa iliū fit abs-
que inflammatione, his febris
superueniens morbum soluit.

Aphor. 41.

Quibuscunq; suppuratio in cor-
pore existens non innotescit,
his ob crassitudinē puris, aut
loci, non innotescit. Aphor. 42.

Morbo regio laborantibus, si fiat
hepar durum, malum.

Aphor. 43.

Quicunque lienosia à difficulta-
te intestinorum capiūtur, his
superueniente longa difficul-
tate intestinorum, aqua inter cutem,
leuitas intestinorum aduenit, & mor-
iuntur. Aphor. 44.

Quibus ex stillicidio vrinę ileos
superuenerit, ī septem diebus
pereunt, nisi febre superueniē-
te, satis vrina fluxerit. Aphor. 45.

Vlcera quęcunque annua sunt, aut
etiam diuturniora, os abscedere
est necessariū, & cicatrices cauas fieri.

d iiii

APHOR. HIPPOCR.

Aphor. 46.

Qui gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur.

Aphor. 47.

Quiuscunque venæ sectio, vel purgatio, cum medicamento cōuenit, hos verè purgare, vel venam incidere oportet.

Aphor. 48.

Lenosis difficultas intestinorū superueniens, bonū.

Aphor. 49.

Quicunque morbi podagrici fiūt, hi sadata in quadraginta diebus inflammatione finiunt.

Aphor. 50.

Quiuscunque præciditur cerebrum, his necesse febre, & bilis vomitum superuenire.

Aphor. 51.

Quicunque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim multi fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

Aphor. 52.

Oportet vero & considerare oculorum in dormiētibus suspēctiōnes. Nam si quid album cōmissis pal-

pebris subinspicitur, neque ex alui
profluuiio, aut medicamento potione
istud contingat, malum est signum,
& letale valde. Aphor. 53.

DEsipientiæ quæ cum risu fiunt, se-
curiores. quæ vero cum studio, pe-
riculosiores. Aphor. 54.

IN acutis passionibus quæ cū febre
sunt, luctuosa suspiria, malum.

Aphor. 55.

DOlores podagrici, vere, & autū-
no magna ex parte mouentur.

Aphor. 56.

IN morbis melancholicis ad hæc
periculosi decubitus, stuporem cor-
poris, vel conuulsionem, vel furorē,
vel cæcitatem significant.

Aphor. 57.

APoplexiæ autem fiunt, maxime
à quadragesimo anno vsque ad
sexagesimum.

Aphor. 58.

SI omētum excidat, necessario pu-
trefcit.

Aphor. 59.

QVibuscunque à coxendicū do-
lore molestatis excidit coxa,
& rursus incidit, his mucores
superueniunt.

Aphor. 60.

APHOR. HIPPOCR.

Quibuscumque à coxendicum
dolore molestatis diuturno ex
cidit coxa, his crus tabescit, &
claudicant, si non vrantur.

APHORISMORVM HIPPOCRATIS LIBER SEPTIMUS, Nicolao Leonicensi Vicentino interprete.

In morbis acutis, frigus partium
extremarum, malum. Aphor. 1.

In osse ægrotante caro liuida, ma-
lum est. Aphor. 2.

A vomitu singultus, & oculorum
rubor, malum. Aphor. 3.

A sudore horror, non bonum. Aphor. 4.

A furore difficultas intestinorum,
vel aliqua inter cutem, vel men-
tis alienatio, bonum. Aphor. 5.

In morbo diuturno fastidium cibi
& deiectiones syncerae, malum. Aphor. 6.

Aphor. 7.

EX multa potatione rigor & desipientia, malum

Aphor. 8.

ATuberculi intus ruptione, exolutio, vomitio, aut animi defectio fit.

Aphor. 9.

AProfluvio sanguinis, desipientia, ac convulsio, malum.

Aphor. 10.

ABileo, vomitus, singultus, desipientia, vel convulsio, malum.

Aphor. 11.

AMorbo laterali inflammatio pulmonis, malum.

Aphor. 12.

APulmonis inflammatione phrenitis, malum.

Aphor. 13.

AB æstibus fortibus convulsio, aut distentio, malum.

Aphor. 14.

IN capitis ictu obstupescētia, & desipientia, malum.

Aphor. 15.

ASanguinis sputo, puris sputum.

Aphor. 16.

APuris sputo phtisis, & fluxus. cum vero sputū retinetur, moriūtur.

APHOR. HIPPOCRATIS.

- I**N hepatis inflammatione singultus, malum. Aphor. 17.
IN vigilia, conuulsio, vel desipientia. Aphor. 18.
IN ossis exutione erysipelas. Aphor. 19.
AB erysipelate, putredo, aut suppuratio. Aphor. 20.
AForti in vlceribus pulsu, profluuium sanguinis. Aphor. 21.
AVentris dolore diuturno, suppuratio. Aphor. 22.
ADiectione sincera difficultas intestinorum. Aphor. 23.
IN ossis præcisione desipientia, si in vacuum apprehenderit. Aphor. 24.
EX medicamenti potione conuulsio letalis est. Aphor. 25.
IN forti dolore vëtris, partium extremarum frigiditas, malum. Aphor. 26.
MVlieri vtero gerenti, si tensio superuenerit, facit abortum. Aphor. 27.
Aphor. 28.

Q Vando os, aut cartilago, aut
neruus abscinditur in corpo-
re, non augetur.

Aphor. 29.

Q Vi alba pituita detinetur, si
fortis ventris fluxus superue-
nerit, a morbo liberatur.

Aphor. 30.

Q Vibus in alui profluuiis excre-
menta spumosa sunt, his ex
capite pituita defluit.

Aphor. 31.

Q Vibuscūque febricitantibus,
in vrinis fiunt sedimina, ve-
luti farina crassior, longam
ægritudinem fore significat.

Aphor. 32.

Q Vibus autem biliosa sedimi-
na supra tenuia, acutum mor-
bum significant.

Aphor. 33.

Q Vibuscunq̃ue vrinæ distantes
sunt, his turbatio fortis in cor-
pore fit.

Aphor. 34.

Q Vibus in vrinis bullæ subsi-
stunt, morbum renalem, &
longum significant.

APHOR. HIPPOCRATIS.

Aphor. 35.

Q Vibus insidens pingue, ac simul totum his, renum vitium acutum significatur.

Aphor. 36.

Q Vibus autem morbo renali laborantibus, prædicta accidunt signa doloresque circa spinæ musculos fiunt, si quidem circa loca exteriora fiant, abscessus quoque exterius futuros expecta: si vero dolores magis circa loca interiora fiant, etiã abscessus expecta futuros interius.

Aphor. 37.

Q Vicunque euomunt sanguinẽ, si sine febre quidem, salutare: si vero cum febre, malum. Curare vero acerbis, & refrigerantibus.

Aphor. 38.

D Eistillationes in ventrem superiorem suppurantur intra viginti dies.

Aphor. 39.

S I quis sanguinẽ minxerit, & grumos, & stillicidio vrinæ laboret, & dolor inciderit in femur & inum ventrem, pectinemque qui circa vesicam male se habere significatur.

Aphor. 40.

Si lingua repente incontinens fiat,
aut aliqua pars corporis stupore
elanguit, tale est melancholicum.

Aphor. 41.

Si timor atque mœstitia longo tē-
pore hominem habentes perse-
uerauerint, tale est melancholicum.

Aphor. 42.

Si senioribus supra modum purga-
tis, singultus superuenerit, non bo-
num.

Aphor. 43.

Si febris non ex bile habeat, mul-
ta aqua calida capiti superinfusa,
solutio fit febris.

Aphor. 44.

Mulier ambi dextera non fit.

Aphor. 45.

Qvicunque suppurati vruntur,
vel secantur, si pus purum flu-
xerit, & album, euadunt. si ve-
ro subcurentum, & fœculentum, ac
fœtidum, pereunt.

Aphor. 46.

Quorū hepar suppuratū aduri-
tur, si pus purū fluxerit, & al-
bum, euadūt: in tunica enim
his pus cōtinetur. si vero qualis amur-
ca fluat, pereunt.

Aphor. 47.

APHOR. HIPP.

Dolores oculorum post meri portionem, & aquæ calidæ balneū, venæ sectione curato. Aphor. 48.

Aqua inter cutem laborans, si à tussi habeatur, desperatus est. Aphor. 49.

Vrinæ stillicidium, & mingendi difficultatem, vini potio & venæ sectio soluit, incidere autem interiores. Aphor. 50.

Angina habito, tumor, & rubor in pectore superueniens, bonum. extra enim vertitur morbus. Aphor. 51.

Quibus cerebrum sphacelatū, id est corruptum est, in tribus diebus pereūt. si vero hos euaserint, sani fiunt. Aphor. 52.

Sternutamentum fit ex capite, calefacto cerebro, aut humectato eo quod in capite inani. Aer enim intus contentus extra erumpit. sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus. Aphor. 53.

Quicunque hepar circūdolent, his febris superueniens soluit dolorem. Aphor. 54.
Quibus

Q Vibus à venis sanguinē mitte
re confert, his verē venā oportet
secare. Aphor. 55.

Q Vibus iter vētriculū, & septū
pituita reposita est, & dolorē
affert nō habens exitum, neq;
ad alterū ventrē: his per venas ad vesī
cam pituita versa soluitur morbus.

Aphor. 56.

Q Vibus hepar aqua plenum in
omentum eruperit, his venter
aqua repletur & moriuntur.

Aphor. 57.

H Alyce, anxietudo, oscitatio, hor
ror, vinū equali potū soluit egri
tudinem.

Aphor. 58.

Q Vibus in vrina ī meatu tuber
cula fiunt, his suppurationē fa
cta, & eruptiōe, soluitur dolor.

Aphor. 59.

Q Vibus cerebrū aliqua ex cau
sa cōcussū fuerit, necesse est
statim mutos fieri.

Apho. 60.

Corporibus carnes habētibus hu
midas, famem adhibere conue
nit. fames enim corpora siccāt.

APHOR. HIPPOCRATIS.

Aphor. 61.

Vbi in toto corpore mutationes
& corpus refrigeratur, & rursus
calefit, aut color est alium ex alio cō-
mutat: lōgitudō morbi significatur.

Aphor. 62.

Svdor multus, calidus, vel frigidus,
semper fluēs humorē abduci, ro-
busto quidē supra, debili vero infra si-
gnificat.

Aphor. 63.

Si quis cibum febricitāti dederit, vt
sano robur, sic laboranti morbus.

Aphor. 64.

Quæ per vesicam excernuntur,
inspicere oportet, si talia qua-
lia sanis excernuntur. Quæ igi-
tur minime similia sunt his, hæc mor-
bosiora. Quæ vero sunt sanis similia
hæc minime morbosa.

Aphor. 65.

Et quibus deiectiones, si stare per-
miseris, & nō moueris, veluti strig-
menta subsistunt: & si pauca, paucus
est morbus, & si multa, multus. his cō-
fert alui purgatio. quōd si aluo non
purgata dederis sorbitiones, quanto
plures dederis, tanto magis nocebis.

Aphor. 66.

EXcreationes in febribus nō intermittentibus liuidę, sanguinę bilioſę, & fœtidę, omnes malę. Cum vero bene excernuntur, bonum eſt, & per ventrem, & per veſicam, & vbi aliquid ſecedens ſteterit non purgatum, malum.

Aphor. 67.

Corpora oportet vbi quis purgare voluerit fluida facere. & ſi ſupra, ſiſtere aluū. ſi vero infra, humectare.

Aphor. 68.

Somnus, vigilię, vtraque modum excedentia, morbus.

Aphor. 69.

In febribus non intermittentibus, ſi exteriora frigent, interiora vruntur, & febris habeat, letale.

Aphor. 70.

In febre non intermittente ſi labrū, aut naſus, aut oculus, aut ſuperciliū pueritur, ſi non videat, ſi nō audiat, & iā debilis ſit quicquid horum fuerit, mors ppe eſt.

Aphor. 71.

Apituita alba, aqua inter cutem ſuperuenit.

Aphor. 72.

e ii

APHOR.HIPP.

AB alui profluvio difficultas ī testi-
Anorum. Aphor.73.

ADifficultate ī testinoꝝ, leuitas ī te-
stinoꝝ supuenit. Aphor.74.

ACorruptione, abscessus ossis.
Aphor.75.

ASāguinis vomitu, tabes, & puris
purgatio supra. Aphor.76.

QValia fuerint vesicæ, aut alui
excremēta, & ex carnibus, &
sicubi à natura corpus exierit
si paꝝ, paucus est morbus: si multum,
multus: si valde multum, letale est.

APHORIMORVM HIPPO
CRATIS FINIS.

CHIPPOCRATIS

COI PRAESA GIORVM

liber primus, Gulielmo Co
po Basiliensi īterprete.



1.
Nil perinde medico cō
ducibile censeo, quā vt
prudentem se præstare
laboret.

2. 3.
Sl enim apud agros præterita, prę
sentia, & futura, atq; ea q̄ ipsi inter

narrādū omiserūt nouerit, prædix-
ritq; nihil, quod egris vfu fuerit, igno-
rare putabitur . quo fit vt audentius
homines medico sese comittant.

4.

E Tenim perquam salutarem adhi-
bebit curationem, si futuras affe-
ctiones præuiderit. Nā fieri nō potest
vt omnes egros sanitati restituat, quā
quam hoc multo præstantius erat,
quam futura prænoscerē.

5. 6.

I Gitur quum homines intereāt, alii
quidē ob morbi vehemētiā, ātea q̄
vocetur medicus, nonnulli vero, voca-
to licet medico, repēte moriuntur, ac
alii vnico dum taxat die, alii paulo lō-
giori spacio vitam extendūt, prius q̄
medicus arte sua singulis morbis oc-
currendo resistāt. Proinde harum af-
fectionum naturas noscere oportet,
quantum videlicet corporis viribus
sint superiores.

7.

Quin ē si diuinū qdpiā morbis
inest, huius quoq; puidētiā pdi-
scere. sic enim optimo iure, &
admirabilē, & bonū se præstabit me-
dicū: quos enim supstitēs fore cogno-

c iii

PRÆSAG.

uerit, eos rectius quoque seruabit, utpote ex multo tempore singula consulte perpendēs. Itaque morituros, victurosque presentēs, atque denunciās, oēm prorsus calūniam vitabit.

NOTAE EX FACIE.

8. 9. 10.

IN acutis morbis sic cōsiderār oportet, in primis quidē egri faciē, an sanorum faciebus, maxime vero suę ipsius, similis sit. ea enim optima censenda est: quę vero maximo discrimine ab hac similitudine recedit, grauissimū periculū portēdit, cuius hę sunt notę. Nares acutę. oculi cōcaui, collapsa tempora, frigidaē cōtractę aures, & imis partibus leniter versę, cutis circa frōtē dura intēta & arida, totius faciei color aut niger, aut pallidus aut liuens, aut plumbeus. 11.

Quod si iter morbi initia huiusmodi facies appareat, neque ex aliis indiciiis cōiectura sumi possit, inquirendū est, an vigilia, aut vētris vehemens resolutio, aut inedia præcesserit: quorum si quodpiā deprehēderis, nihil piculi timendū est. atque si ob huiusmodi cās, hęc

faciei spēs orta est, vna die, nocteq; finitur. si vero eas p̄cessisse eger negauerit, diutiusq; iam dicto tēpore, hec forma durauerit, scire licet eum morti proximum esse.

12.

QUod si in vetere morbo iā tri-
duo, quadriduo ve talis est, inq-
renda sunt ea signa, q̄ supra p̄-
posui. ad hæc, reliqua quoq; indicia,
nō solum ex facie, verumetiam ex re-
liquis corporis partibus perpenden-
da sunt, præcipue ex oculis.

NOTAE AB OCULIS.

13.

NAm si lumē refugiūt, & illa-
chrymāt, idq; p̄ter volūtātē,
aut puertūtur, alterq; ex iis
minor ē, & q̄ i ipsi alba esse
debēt, rubescūt, aut genę pallēt, atq; i
isdē venulę nigricāt, aut lippitudo i-
natās tādē āgulis iheret, aut frequēs ē
oculorū motus, iiq; aut vehemēter sub-
federūt, aut facti tumidiores sūt, fue-
ritq; aspectus horridus obscurusq;, at
que vniuersę faciei color mutatus: hæc
omnia signa, mala, perniciosaque pu-
tanda sunt.

14.

e iiii

PRÆSAG.

Quinetiā oculorū per somnum
suspectiones obseruandę sunt.
Vbi enim palpebrę non com-
mittuntur, sed inter has ex albo ocu-
lorum aliquid apparet, neq; id fluens,
alius, aut medicamēti potio præcessit
præsertim si quis nō sic dormire cōsue-
uerit: prauum hoc signum. letalēq; ad
modum est. 15.

Si palpebra, aut labrū, aut nasus re-
torquetur, aut pallet, aut liuore in-
ficitur, accedente quopiā reliquorum
signorū egrum morti proximum esse
haud dubitādū est. Mortem etiā por-
tendunt labra resoluta, suspensa, frigi-
da candicantia.

A DECUBITV NOTAE.

Deprehendendus est æger in
dextrum sinistrū velatus cu-
bās, brachiis, ceruice, & cru-
ribus paulū reductis ac vni-
uerso corpore molliter affecto, qui fe-
rē sani quoq; iacētis habitus est. qui p-
pe quū optimus sit ille decubitus, qui
à sanorum consuetudine non variat. 16.

17.

Sed non laudatur decubitus, quo
brachia, ceruix, & crura extendū
tur. 18.

Id vero grauius est, si seipsum eger
continere non valēs, ad pedes sub
inde delabitur. 19.

Vbi pepes nudat, neq; iis calor sub
est, vbi brachia, ceruicē, & crura
īequabiliter dispergit ac nudat, malī
morbi, angorisq; signū est. 20. 21.

Perniciosum est, vbi hiās q̄s assidue
dormit, aut vbi supinus iacet, cru
ribus vehemēter cōtortis, cōplicitisq;.

Si p̄nus iaceat is, q̄ p̄ bonā valetudi
nē sic dormire nō cōsuevit, aut deliriū
aut vētris dolorē portēdit. 22. 23.

Vbi residere vult æger in ipso mor
bi vigore, malū qdē īdiciū est in
oībus acutis affectibus, sed lōge pessi
mū pulmōibus laborātibus. 24.

Stridor dētiū p̄ febres, p̄ter cōsue
tudinē à teneris contractam, insa
niā significat & mortē. atqui ab vtrif
que futurū periculum denunciandum
est. Si vero iā deliranti, stridor quoq;
accedit, vix aliā eque perniciosam in

PRÆSAG.

uenies notam.

25.

VLcus, siue ante, siue in ipso morbo natū est, obseruari debet. nā si moriturus est homo, aridum aut liues, aut pallidū, añ mortē appet. 26.

EX mannū lotionē huiuscemodi notas perpēde, in acutis febribus, in peripneumonia, phrenetide, capitis dolore, si quis eas faciei admouerit, vt inde quidpiā superuacue ueniat, aut festucas carpat, aut à veste floccos, aut à pariete paleas auellat, omnes hæ malæ letalēsq; sunt. 27.

Spiritus frequens, aut coloris, aut inflammationis in partibus: septo transuerso superioribus, indicium est. Magnus, & ex longis interuallis, delirium declarat. Frigidus ex naribus & ore p̄diēs, letalis admodū est. 28.

Facilis spiratio, in acutis morbis, quibus febris copulatur quicq; intra quadraginta dies finire solēt, magnū habet ad salutem momentum.

DE SVDORE. 29.

Svdores, saluberrimi censentur, in omnibus acutis morbis, si in diebus decretoriis oriantur, se.

brimq; finiant, aut vbi toto corpore æqualiter insudante, æger morbum facilius sustinere videtur. Contrà inutiles, q id efficere nō valēt. Pessimi omnium sunt frigidi, & vbi caput dūtaxat aut facies, aut ceruix insudat: quippe qui in acuta quidem febre, mortem, in mitiore vero, morbum diuturnū fore significant.

A PRÆCORDIIS NOTÆ.

30.

A Tq; inter optima indicia sunt præcordia, vbi sine vllō sensu doloris in vtraq; pte æqualiter mollia sunt. Inflāmata vero, dolentia, & intēta, & vbi aliter in dextra aliter in sinistra parte afficiuntur, suspecta haberi debēt. 31. 32.

P Rēcordioꝝ venę, si pulsēt, aut turbationē, aut deliriū portēdūt: sed eoꝝ qui sic affecti sunt, oculos aspicerē oportet: quippe frequens illoꝝ motus, insaniam cōminatur. 33.

P Rēcordia tumida, dura, dolētia, si in vniuersum sic affecta sūt, maximū malū portēdūt, si vō altera pte dūtaxat, ex sinistra minus piculū est.

PRÆSAG.

34. 35. 36. 37.

Cæterū huiusmodi tumores, in pri-
cipio qdē proximā mortē denun-
ciant. vbi vero viginti dies excesserit,
neq; q̄scēte febre, neq; tumore remis-
so ad suppurationē cōuertūtur. Atq;
inter primos circuitus, sanguis ē nari-
bus fluēs, nō mediocri ipsis præsidio
est. sed tū sanguinis eruptio expecta-
ri debet, quū interrogati, aut caput do-
lere, aut oculos caligare fatētur. id ve-
ro iunioribus, videlicet circa quītum
& trigēsimum annum, plarunq; eue-
nire solet.

38. 39.

Mollis tumor dolorē nō inferens,
& digitis cedens, lōgiori tēpore
finitur, sed nō ita graue ab eo piculū
pendet. Quōd si intra sexaginta dies,
neq; febris desinit, neq; tumor resedit
suppurationē expectare oportet. Idē
haud secus in reliqs quoq; vētris parti-
bus perpenditur.

40.

Itaque durus, magnusq; tumor, do-
lore crucians, mortis periculū, non
multo post fore denunciat. Mollis ve-
ro & sine dolore, quiq; prementi digi-
to cedit, longus esse solet.

41. 42. 43.

VEntris tumores, non tā crebro, vt hi qui in p̄cordiis oriūtur, abscessum effitiūt. quōd si sub vmbilico cōstituātur, nequaquā ad suppurationem cōuertentur, sed ex superioribus maxime sedibus, sanguinis fluorē expectare oportet. In qbus omnis humor duturnus, ad suppurationem ferē spectat.

44.

ITaq; suppurationum obseruatio sic accipienda est. earum enim q̄ in exteriorē partē erūpunt, optimæ sunt parue, admodū eminētes, atq; in acutū fastigiatae, pessimæ vero sunt, quæ maximæ, quæq; planissimæ sunt.

45.

Sed illarum quæ intus excitantur, optimæ censentur, quæ exteriorē cutem non decolorant, & contrahuntur, nulloque dolore cruciant, atque vbi exterioris cutis color manet vniformis.

46.

Pvs illud optimum est, quod albū & leue est, & haudquaquā foetet. qđ vero ab hoc variat, pessimum est.

PRÆSAG.
CHIPPOCRATIS
COI PRÆSAGIORVM LI
ber secundus, interpretæ Gulielmo Copo
DE AQUA INTERCVTEM.

1.



Qua inter cutem si ex
acuto morbo cœpit, pi
culosa est. neq; enim fe
brim soluit, sed dolori
bus torquet atq; interfi
cit, oritur vero magna
ex parte vel ab ilibus & lumbis, vel à
iecinore.

2.

Sed ubi ab ilibus lumbisq; ortum
contraxit, pedes tumidos reddit,
fluorē diuturnū inducit, qui neq; lum
borum. illiūue dolorē soluit, neque vē
trem efficit molliorem.

3.

At quibus à iecinore aqua inter cu
tem proficiscitur, ii tussi vexātur,
sed qua penē nihil excreatur, pedes tu
ment, deiectio dura, coctāque est, cir
ca ventrē tumores, modo in dextra,
modo in sinistra parte attollūtur, de
inde desinunt.

4. 5. 6.

MAli etiam morbi signum est, caput & pedes, manusque frigidas habere, ventre & lateribus calentibus. Securitatem pollicetur corpus, quod æqualiter molle, & calidum est, quod que facile conuertitur & surgit.

7. 8. 9.

GRauitas vero, quæ vel manus & pedes, vel reliquum quoque corpus premit, periculum significat. Quod si cum grauitate, vngues quoque ac digiti liuore afficiantur, cōtinuò perniciem expectare oportet. At omnino nigri, tum digiti, tum pedes, minus quæ liuentes, periculum portendunt. sed tunc ad reliqua signa refugere oportet. etenim si æger facile malum sustinet, adsintque alia quædam indicia, quæ securitatem polliceri solent, superpurationem sperabis, atque superstes manebit æger sed denigratæ corporis partes decident.

10.

Testiculi pudendâque retracta, vehementes dolores, atque letale periculum significant.

PRÆSAG.
DE SOMNO. 11. 12.

Quod vero ad somni rationē pertinet, quēadmodū sani etiā solent, interdū vigilare, noctū vero dormire oportet: à qua cōsuetudine si q̄s aberrauerit, peior erit somnus q̄ inter quartā horā & noctē, quā q̄ matutino tēpore ad quartā. pessimū tamen est, si somnus neq; noctū, neq; interdiu accedit. id enī ob dolorē laborēq; accidit, vel deliriū futurū signat.

DE ALVI EXCREMENTIS.

13.
Alvi excrementa inter bona indicia sunt, si mollia, si figurata sunt, si eodē ferē tēpore quo in secunda valetudine deici solebāt, excernūtur: si his q̄ ingerūtur proportionē respondent, utpote quæ inferiorem ventrem recte valere declarāt.

14.
Si vero liq̄da fuerint, prestat ut sine stridore, neq; frequēter, neq; ex breuib; interuallis deiciātur, etenim fatigatur æger, si crebro surgit, vigiliisq; consumitur, quum vero affatim

tim saepeq; deiicit, ne animus eum deficiat, periculum est.

15.

Conuenire debent excrementa, his quæ assumuntur, & bis ter ve interdium, noctu vero semel deiici, idque maxime matutinis temporibus pro cuiusq; cōsuetudine.

16. 17.

Ad finē iam tendente morbo, bonum est si crassiora reddantur, ac rufa, & odoris foeditate, sani hominis aliu non vehementer excedant.

18.

Lumbricos etiā cū excrementis sub fine morbi descēdisse nihil nocet.

19.

Venter in quouis morbo vacuus, corpulentusq; esse debet.

20.

Periculosum stercus est, quod perliquidum, albicans, pallidum, vehementer rufum, aut spumans est.

21.

Item malum est, quod exiguum, glutinosum, idēq; subpallidum est.

22.

Omniū maxime letiferū est, nigrū, pingue, liuēs, aut qd' peioris odoris q̄ pro consuetudine.

f

PRÆSAG.

23.
Varia excremēta, q̄q̄ diutius mor-
tem differunt, non tñ minus sunt
letalia. huiusmodi & ramētoſa ſunt,
bilioſa & nigra, atq; porri colorē imi-
tantur. 24.

Inter optima ſigna eſt flatus, q̄ neq;
ſtrependo, neq; pedendo emittitur.
quāq; enim ſatius eſt ipſum cum ſtre-
pitu exire quā includi: tñ hoc pacto
p̄diens aut dolore, aut delirare agrū
ſignificat, niſi ſua ſponte flatū ipſum
emiſerit. 25.

Precordiorū recentes quidē dolo-
res, gibboſq; niſi inflāmatio quo
que acceſſerit, murmur in ipſis exor-
tum ſoluit, ac vnā cū ſtercore, & vri-
nis, atq; flatu agreditur. quod vbi nō
contingit, ſi tamen ex ſede ſua tranſ-
fertur, bonum ſignum eſt, idq; magis
ſi ad inferiora deſcendit.

DE VRINIS.

26.
Vrina illa optima eſt, in qua
per totū morbi decurſum re-
ſidet album, leue, equale: hec
nimirū ſecuritatem, breuēq;

morbū significat. Quod si aliqd horū
deest, vt modo liqda sit, modo albū,
leueq; in ipsa resideat, hęc vt longiorē
morbū denūciāt, ita securitatē mino-
rem pollicetur. 27.

S Vbrubra vrina, in qua subrubrū,
leueq; residet, q̄q; supiore morbū
diuturniorē, eundē tñ salubriorē fore
declarat. 28.

M Ala est vrina, quū id qd̄ residet,
parti farinae crassiori simile est.
peior vero, si lamis. ac vitupatur quo-
que alba tenuisq; quāq; longa maius
periculū illa portendit in qua quædā
tanq; surfura resident. 29.

N Ebulę in vrina suspensę, albę qdē
bonę, nigre vero malę sunt. 30. 31. 32.

CÆterū quoad vrina rufa, tenuisq;
apparuerit, crudū morbū signat.
q̄ si diutius talis pmāserit, ne priusq;
morbus quiescat, eger viribus destitu-
tus succubat, periculū est. Perniciosissi-
ma est vrina, q̄ mali odoris, & diluta,
& tenuis, & nigra, & crassa est. 33

IN viris quidē & mulieribus nigra,
in pueris vero tenuis & diluta, de-

PRÆSAG.

terrима est.

34.

SI vrina tenuis & cruda, sic diu fertur, vt reliqua signa salutaria sint, plerūq; infra septū trāuersum abscessus oriri solet.

35.

Neq; leuiter terrere nos debet vrina, cui pinguedo telis araneorū similis innatat, qppe quę hoīem tabe cōsumi significat.

36.

Nubecularū positum, supremū ne locum, an infimū teneant, obseruare oportet. Nā quę in ima pte cōstituantur cū coloribus quos supra ppositi, bonę sunt, atq; laudātur: quę vero sursum attolluntur, malę, vituperandęq; sunt.

37.

Sed caue ne vesica quoquo mō affecta (si huiusmodi reddiderit vrinas) te decipiat. tales enim nō ad vniuersum corpus, sed ad ipsam dūtaxat vesicam referri debent.

DE VOMITV.

38.

Perquā utilis est vomitus, q̄ bilem pituitę mixtam habet, si neq; crassitie, neq; multitudine admodū excedat. nā syncerę

pituita, bilisue vomitus piculosus est.

39.

SI vero viridis, aut liuidus, aut niger est, quilibet horum colorum acciderit, viciosus est.

40.

SI vero oēs affatim in eodē appareant, mortis periculū valde timendum est.

41.

42.

AD vltima ventum esse testatur liuidus vomitus, praeipue si malus in hoc odor est. si quidem foetores in quouis vomitu mali sunt.

DE SPVTO.

43.

44.

45.

IN pulmonis, costarumq; doloribus, oportet vt sputū celeriter, facileq; secreetur, & cruor sputo vehementer misceatur. Etenim si multo post doloris initium, aut cruentum, aut rufum, aut nō sine multa tussis, nec adeo cōmixtum expuitur, viciosum censetur.

46.

QUippe cruentum si syncerum quoque fuerit, periculum subesse testatur. album vero, viscidum, & rotundum, inutile est.

47.

f iii

P R Æ S A G.

MAli etiā morbi testimonium est
qd' admodū viride, quodq; spu
mosum est. 48.

ID vero omni alio deterius est, qd'
sic est syncerū vt nigrū quoq; videat
tur. Neq; tutum est sputū, quod nō ex
purgatur, nec proiicit ipsum pulmo,
sed ob nimiam plenitudinē feruet in
gutturē. 49

IN omnibus morbi pulmonis destil
latio, sternutamentūq;, siue præfue
rint, siue supuenerint, periculū osten
dunt: quāq; in cæteris morbis, vel peri
culosissimis, vtilitate carent. 50.

Sputum cruentū cui paulū sangui
nis admixtū est, in morbi princi
pio, inflāmato pulmone pectū, secu
ritatē atq; auxiliū pollicetur. qd' vero
ad septimū vsq; diē, longiori ve spa
cio tale apparet, nō adeo tutū est. 51.

Omnē sputum, quod dolorem nō
mitigat, malū est. Nigrum (vt su
pra demonstraui) pessimum est:
sed longe saluberrimum est, id quod
dolorem placat.

DE SUPPURATIONE.

§ 2.

DOlores in dictis sedibus, quos neque sputi purgatio, neque soluta alius, neque sanguinis missio, neque medicamentum, neque victus ratio, sedare potuit, scire licet eos ad suppurationem tendere.

§ 3. § 4. § 5.

Suppuratio erumpens, sputo adhuc bilioso apparete, siue bilis seorsum, siue vnà cū pure expuatur, admodū perniciosa est, p̄sertim si à die morbi septimo inceperit pus ab huiuscemodi sputo p̄cedere. Itaq; timendū est ei qui sic expuit, ne decimaquarta die moriatur, nisi salutiferū aliqđ iudiciū interea supueniat.

§ 6.

Porro bonæ spei signa sunt, si eger bñ sustinet morbū, si facile spirat, si dolor leuatus est, si sine difficultate s̄creat, si corpus equaliter molle & calidū est, neque sitis infestet: p̄terea vrina, alui sedimīa, somni, sudores, vt de singulis supra demonstrauimus, probe rñ dent. quorū si nullū deest, haudquaquā eger morietur. Cōtrā, si intolerabilis

f iiii

P R Æ S A G.

est morbus, si halitus magnus & frequēs est, neq; mitigatus est dolor, vix sputū redditur, sitis vehementer cruciat, febris inæqualr corpus afficit, si deniq; vēter & latera vehemēter calēt, fronte, manibus, & pedibus frigore affectis. atq; vrina & alui excremēta, & somni, & sudores, ex supra ppositis notis periculū minantur. quicquid horum iam picto sputo supuenerit, aut nono, aut vndecimo die ægrum moriturum significat, ita vt decimū quartum non queat attingere. Huiusmodi coniectura letale sputum cōsequi oportet, qđ videlicet ad decimū quartū diem ægrū viuere nō permittit. Ex pdictis itaq; signa, tum bona, tū mala ppēdere, ac subinde futura prædicere oportet. § 7.

Reliquæ autem vomitæ magna ex parte rumpūtur. sed aliæ in die vigesimo, aliæ trigesimo, aliæ quadragesimo, nonnullæ ad sexagesimū vsq; perueniunt. § 8.

Proinde suppurationis initiū obseruare oportet, qđ ab eo die putandum est quo primū quis aut febris

citauit, aut inhorruit, aut pro dolore grauitatē illius partis sensit, quā antea dolor infestabat. Nā talia in suppurationū principio accidere solent. ab hoc igitur tēpore, vsq; ad iam definita spatia, vomicarū eruptiones expectandæ sunt.

59.

AN vero alteram dūtaxat partem vomica occupet, ex his ferē notis perpendere licet, si alterū latus dolore cruciatur, & altero calidus est, atq; vbi in partē sanam aliquis decubuit, interrogatus, onerari eam, veluti ex pondere aliquo, respondeat. quibus cognitis, in eo latere suppurationem esse coniicies, cui grauitas incūbit.

60. 61.

SVppuratos omnes hoc pacto deprehendes. Si febris non dimittit, eaq; interdiu leuior est, noctu incrementum, multus sudor oritur, tussendi cupiditas est, sed nihil penē excreatur, oculi cauantur, malæ rubent, vngues in manibus curuantur, digiti, maximeq; summi calent pedes tumēt, cibī fastidiū est, pustulæ toto corpore nascuntur. Atq; diuturnarū vomicarum

PRÆSAG.

hæ sunt notæ, quibus haud dubia fides adhibenda est. Sed quæ breviori spatio duraturæ sunt, ex iisdem notis deprehenduntur, atque ex his quoque quæ in principio apparere solent, simul si spiritus maiori cum difficultate trahitur.

62.

Celeriorē, tardiorē ve eruptionem ita cōiicies. Si p̄tinus ab initio tussis fuit, & spiritus difficultas, atque sputi excretio, vomica intra vigesimū diē erūpet. Si vero nō adeo vehemēs fuerit dolor, cæteraque illi ex proportionē r̄spondeant, serius ruptura sequetur. quo tēpore & dolorē & spirandi difficultatem minui, atque sputi scretū incrementum, ante videlicet puris eruptionē, necesse est.

63.

Cæterum à periculo tuti sunt, quibus eodem die quo eruptio facta est, febris cōquieuit, desierūtque vrgere cibi fastidiū & sitis, alius exigua quædam & figurata reddit, pus album, leue, simplici colore, & sine pituita est, atque sine dolore leui tussicula eiicitur. Hæ sunt notæ perquā salubres, quæ ce-

leriter liberant hominē. ab his securitatem quoq; pol icētur, quę ad ipsas proximē accedunt. At certū periculū est, si febris non quieuit, aut post quietem repetit. Item si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est liuidum aut pallidū, si nihil nisi spumantem pituitā eger screat. Itaque seruari non possunt, quibus oīa hęc accidūt. quibus vero non oīa, alii quidem moriuntur, alii vero post longa temporū interualla sani euadunt. Ex omnibus autē iam ppositis cōiecturis, reliquarum quoq; affectionum signa considerare oportet.

DE ABSCESSIBVS.

64.

Quibus ob laborantē pulmonē, abscessus secundū aures oriuntur, & in partibus infernis suppurantur, ac fistulam efficiunt, iis secunda valetudo contingere solet.

65.

In quibus huiuscemodi notas obseruabis. Si febris non cōquiescit, neq;

PRÆSAG.

dolor mitigatur, si sputum non pro
ratione eiicitur, si aluus, neque bilio-
sa, neque liquida, neque sincera excer-
nit, si in vrina admodū exigua, mul-
ta resident, ac reliqua quoque signa
omnia securitatem polliceatur, eius-
modi abscessus expectandi sunt.

66.

Q Vi aliis quidem eueniunt in
partibus infernis, si quodam
modo inflāmata fuerint præ-
cordia: aliis vero in superioribus, si
præcordia neque tumore, neque do-
lore infestantur, sed accedit pro tem-
pore spiritus difficultas, quæ deinde
sine vlla euidenti occasione quiescit.

67.

IN vehementi periculosaque peri-
pneumonia non inutiliter in cru-
ribus nascuntur abscessus: nec potest
aliud quicquam melius accidere, præ-
sertim si mutato sputo sic appareat.
Siue enim tumor, siue dolor sentitur,
sputo cruento in pus iā conuerso ex-
cretōque, tutissimum id indicium est.
Nam & æger à periculo liberatur, &
abscessus doloris expers, celerrime cō

quiescit. At si neq; sputum probe ex-
cernitur, nihilq; residet in vrina quod
bonam spem fulcire videatur, ne ex
eo arriculo claudicet æger, vel pluri-
ma certe sustineat negocia, pericu-
lum est.

68.

Si vero subsederunt abscessus, sed
rursus repetunt, non prodeunte
spuito, ac perseverante febre, grauis
timor est, ne delirium subeat æger,
aut moriatur.

69.

Sanè ex suppuratiōibus, quas pul-
monum morbi concitarunt, ferè
senes moriuntur: ex cæteris, iuniores.

70.

Lumborum, inferiorumque par-
tium dolores, quibus febris quo-
que accedit, si ad septum trāsuerfum
transeunt, relictis inferioribus: admo-
dum perniciosi sunt. animaduerten-
da tamen reliqua quoq; indicia sunt.
si enim periculosum aliquod signum
accesserit, hominem à spe deponit.
Quum vruntur suppurati, si pus flu-
xerit purum, candidum, & sine foeto-
re, seruatur. si vero subcruentū, cæno-

PRÆSAG.

sumque, percunt. Si ad septum transuersum, malum ascenderit, nullo reliquorum signorum periculum ostendente, futuræ suppurationis indubitata spes est.

EX VESICA NOTÆ.

71.

Vesica dura, dolens, graue periculum, letalēque comminatur. idque si continua quoque febris accesserit. nā vesicæ dolores, validā necādi vim obtinēt. quo tēpore alius etiā nihil reddit, nisi dura quædā, ac ne ea quidē, nisi cogatur.

72.

At vero vrina purulenta procedēs in qua residet albū & leue, metū detrahit.

73.

Quod si ab huiusmodi vrina dolor leuatus nō ē, neq; vesica mollior effecta est, neq; febris conqueuit, laboratē p primos morbi circuitus moriturū, denūciādū est.

74.

Id vero pueris à septimo anno, ad decimum quintum præcipue accidere solet.

HIPPOCRATIS

COI PRÆSAGIORVM LI.

ber tertius, interpte Gulielmo Copo.

DE FEBRIBVS

I.



Ebres, siue sanus ab
 ipsis qui euadat, siue
 pereat, æquali die-
 rû numero finiuntur.

2. 3.

VT enim saluberrimæ febres, quæ
 videlicet tutissimis fulciuntur no-
 tis, die quarto vel antea quiescere so-
 lent, ita pessimæ quæque, & quibus
 periculolissima adsunt signa, die quar-
 to, vel citius interficiunt.

4. 5.

PRimus itaq; earû insultus ita fini-
 tur, alter in septimû diē pducitur
 tertius i vndecimû, quartus i decimû
 quartû, quintus i decimûseptimû, sextus
 in vigesimû. Igitur accessiões ipsæ ex
 acutissimis morbis p quatuor i viginti
 auctæ finiuntur. verû huiuscemodi sap-
 putatio per dies integros nimirû fieri
 nō potest, quippe quū nec anus, nec
 mēses ipsi, integris numerētur diebus.

PRÆSAG.

6.

DEinde eadem ratione, atque ad-
ditione, primus circuitus ad qua-
tuor & triginta, alter ad quadragin-
ta, tertius ad sexaginta dies pueniet.

7. 8.

Sed huiusmodi morbos, qui lon-
giori spacio finiri debent, ab ini-
tio perquam difficile est discernere,
quod simillima sint eorū principia.
aiaduertere tamen à prima die oportet,
atque singulos dierum quaternio-
nes obseruare: sic enim haud obscure
scies, quod se conuersurus sit morbus.
Ac quartanæ quoque conditio hunc
seruat ordinem

9. 10.

Morbi autem tempore breuissi-
mo finem attingentes, facilius
dignoscuntur, vepote qui maximis
protinus ab initio distinguuntur dif-
ferentiis. siquidem ad sanitatē tendē-
tes, facile spirāt, nō dolēt, dormiunt
noctu, ac reliqua quoq; signa, maxi-
mā eis securitatē pollicentur. Periturū
vero difficulter spirāt, delirāt, vigilāt,
ceteraque id genus pessima signa eis
accedunt.

11. 12.

Vtigitur

VTigitur (his sic se habētibus) morbos ad iudiciū tendentes cōiectura cōsequi oportet, & ex tēpore, & ex singulis additionibus, ita eadē quoque ratione in mulieribus, morborū iudicia, à partu numeranda sunt.

13.

Capitis in febre vehemētes, perpetuique dolores accedente letaliū notarum aliqua, valde sunt perniciosi. si vero nullo tali signo apparēte, diem vigesimū dolor excesserit, neque febris cōquiescat, ex naribus sanguinis fluxum, aut in partibus inferioribus abscessum expectabimus. Similiter dolori etiā recenti, sanguinis p̄fusio ex naribus, aut suppuratio superuenire solet, prācipue si dolor, & tēpora, & frontē infestauerit.

14.

Maxime vero sanguinis fluxio expectanda est in iuuenibus, qui quinquagesimum & trigessimū annū nōdum superauerunt. nā maioribus natu, suppuratio ferē oritur.

15. 16.

Auris dolor acutus cū febre nō intermittēte, vehemētiq; graue periculū minatur. nā & mentē turbat, &

g

PRÆSAG.

hominem rapit. Quum igitur anceps sit huius rei exitus, à primo protinus die omnibus signis accurate animum adhibere oportet. Nam ex eo casu iuniores quidem intra septimū diem, seniores vero multo tardius moriuntur. quippe qui non æque magnas febres experiuntur, neq; adeò insaniūt. proinde sustinere possunt donec suppuretur affectus. Quòd si morbus in hac ætate reuertatur, magna ex parte interficere solet. Sed iuniores, antea quā auris suppuretur, pereunt: nisi pus candidū ab ea defluens, securitatem polliceatur. præsertim vbi salutarium quoq; signorū aliquod apparet.

17.

NEquè leuiter terreri debemus vbi febricitanti fauces exulcerantur: cui si aliud quoq; ex magnis quæ supra declarauimus accesserit, in periculo hominem versari, denunciandū est.

DE ANGINA.

18.

Angina, periculosissima est, celeriterq; enecat, si neq; in faucibus, neq; in ceruice quæ

apparet, si dolor vehemens est, si vix spiritus trahitur: etenim eodē die iugulat, licet interdū vsq; ad secūdum, aut tertium, aut etiam quartum protrahatur.

19.

Q Væ vero in reliquis quidē non minore dolore afficit, in faucibus vero tumore ruboreq; excitat, superiori non minus periculosa est, sed longius spacium habebit, præcipue si vehemens fuerit rubor.

20.

S Ed tum præcipue malū prolongatur, quū non solum fauces, sed ceruicem quoq; rubor occupat. maxime vero potest ab ea secūda valetudo contingere, si rubor simul & ceruicem & pectus cōprehendat, neq; ad interna reuertatur erysipelas.

21.

Q Vum vero deletur erysipelas, sed non in decretoriis diebus, neque in exteriores partes cōuertitur tumor, neq; pus screat ager, sed leuis & à dolore imunis videtur, id aut mortem significat, aut dolore reuersum.

22.

g ii

PRÆSAG.

Tvtius est & tumorē & ruborē in
externas maximē ptes conuerti.
si vero ad pulmonē conuersio fiat, de-
mentiā excitabit, quāquā nonnulli sic
affecti, magna ex parte suppurātur.

23.

CVirguliosi cum rubore tumescit,
sine periculo præcidi non potest,
etenim inflāmatio, sanguinisq; profu-
sio ei accedit. Proinde satius est aliis
quibusdā auxiliis vti, quibus extenua-
ri possit. Quū vero pallidior efficitur,
vua nominari solet: quod si tum ima-
eius pars crassa & rotūda, summa ve-
ro tenuis videatur, intrepide præcidi
debet. Satius tamen fuerit, antea quā
manus adhibeatur, aluum vacuare, si
tcmpus id ita pmittat, vt interim suf-
focatio hominē non præoccupet.

24.

QVibus febres, neq; salutaribus
notis apparentibus, neque in
diebus decretoriis cōquiescūt,
ii reuersionem timere debent.

25. 26.

IN longa febre, ex qua tamē æger li-
berari pōt, si neq; ob inflāmatōnē,

neq; ob aliam vllam manifestā cām,
dolor infestat, aut tumidū, aut dolo-
rosum in articulis abscessum expecta-
re oportet, præcipue in imis partibus:
maxime vero in his ætatibus quæ tri-
ginta annos non exceſſerūt, eiusmodi
abscessus nasci cōsueuerunt, idq; in
tempore breuiori.

27. 28.

Non tamē expectandus est absces-
sus, donec vigesimā diem febris
præterierit. is natu maioribus raro ac-
cidit, quibus longo spacio duret febris.

29.

Solet etiam continuis febribus ab-
scessus supuenire. Interpellata vero
febris, eadēq; errabunda, in quartanā
mutabitur, præcipue si autūnus proxi-
mus est.

30.

Atq; vt abscessus oriūtur in his qui
triginta annis minores sunt, ita
quartana eos qui trigesimū annū aut
agunt aut exceſſerunt, præcipue corri-
pit.

31.

Igitur scire licet, abscessus hyeme
magis accidere, serius finire, sed nō
facile reuerti.

32.

g iii

PRÆSAG.

Si cuiuspiam in nō letali febre, caput dolet, aut ante oculos obscura quādam obseruātur, aut cordis dolor accidit, is bilem euomet. Si vero horruerit & inferiores præcordiorum partes frigore afficiantur, citius ad vomitionem properabit quod si eo tempore quidpiam aut biberit, aut ederit, id quoque quācelerrime euomet.

33. 34.

Quibus itaque à primo p̄tinus die dolor supuenerit, iis quarto & quinto die ingrauescit, mox in septimo liberantur. Sunt nō pauci qui in tertio die dolere incipiunt, quinto maxime molestantur, deinde nono vel vndecimo tuti euadūt. Sed quos dolor quinto die vexare cœperit, reliqua ex proportionē respondeant, iis decimoquarto die finitur morbus. Hæc tum viris, tum mulieribus, sed in tertianis maxime contingere solent. Iunioribus vero cum in is ipsis, tum præcipue in continuis febribus, atque tertianis synceris.

35.

ITaq; quibus in huiusmodi febre caput dolet, oculi vero obscuras illas imagines non vident, sed caligantione hebetantur, aut splendentia quādam cernere se putant, ac præcordis dolore, in alterutra parte præcordia tenduntur, ac neq; dolor infestat, neq; inflammatio, iis pro vomitu sanguis è naribus profluet, idque præcipue iunioribus accidit. si vero trigessimum annum vel agunt, vel superauerunt, vomitum potius quā sanguinis fluxum expectabimus.

36.

Si pueris in acuta febre alius nihil deiicit, neque somnus accedit, sed terrentur, flent, color mutatur, ut modo pallidus, modo liuidus, aut ruber efficiatur, neruorum distentio timeri debet, utpote quæ pueros qui septimum annum nondum excefferunt, quā promptissime inuadit. Grandiſculos vero pueros, atque adultos, non adeo in febribus neruorum distentioprehendit, nisi vehementis admodum malitiæ signum aliquod affuerit, qualia videlicet in phreneticis videntur.

§ iiii

PRÆSAG.

37.
ERgo ex omnibus signis, vt de singulis morbis singula præscripta sunt, & morituros, & eos qui ad bonam valetudinē redire poterunt, siue pueri sint, siue natu maiores, sic conii cere oportet. 38.

ATq; hæc de acutis morbis, atq; de his qui, ab eis nascuntur, dixisse velim. 39. 40.

CÆterum si recte discernere volueris, & morituros, & eos qui à periculo tuti sunt, & quis morbus longo, & quis breuiori spacio finietur, discerne omnium signorū inter se collatorum vires (vt supra demonstrauimus) accurate iudicare, tum aliorū, tum præcipue vrinæ, ac sputi, quum scilicet simul & pus & bile æger screat. itē supuenientium quoq; morborū impetū, ac temporū anni conditionē accurate obseruare oportet. 41. 42.

Postremo quod ad coniecturas, reliquaq; signa pertinet, haudquaquam vel ignorandum, vel negligendum est, quòd quouis anno, & quouis anni tempore, mala signa timorem, vtilia vero

ro bonam spem denuncient. Etenim
in Lybia, & Delo, atq; Scythia, pro-
posita iam signa, vera esse comproba-
uimus.

43.

VNde scire licet, in iisdē terris mul-
to plura quā supra proposuimus,
illum facile assequi posse, qui ea recte
& iudicare & perpendere didicerit.

44.

Sed nullius morbi hic nō descripti
nomen desyderandum est. nā om-
nes qui in dictis temporum spaciis
morbi finiuntur, iisdem quoq; indi-
ciis discernuntur.

HIPPOCRATIS COI PRÆ
SAGIORVM TRIVM
LIBRORVM
FINIS.

HIPP.
CHIPPOCRATES
DE NATURA HOMI-
nis, ab Andrea Brentio
Patauino con-
uersus.



Vi consuevit audi-
re eos qui de huma-
na natura altius q̄
ad medendi facul-
tatem pertinet, di-
sputant, huius certe
oratio, vt ab aliis
audiatur, apta non est. Neque enim
prorsus dixerim hominem aerem
esse aut ignem, aut aquam, aut ter-
ram, aut aliquid aliud: quod minime
vnum in homine inesse manifesto
apparet. Sed id quibus placet, dicere
permitto. Atqui mihi quidem nō vi-
dentur huiuscemodi hoīes recte sen-
tire. Nam cum idem sentiant, idem
que concludant, loquuntur tamen
diuersa. Aiunt enim vnum quid esse
quod est, ac id esse vnum & omne:
verbis autem discrepant. Quoniam

DE NAT. HVM.

34

id vnum & omne eorum alius asse-
rit esse spiritum, alius colorem, ali-
us liquidum, alius aridum. Tum sua
quisque ratione concludunt argu-
menta, ac testimonia & indicia as-
ferunt, quæ nullius sunt penitus mo-
menti. Quod vero eodem sunt sen-
su, verbis autem dissentiant: ea re
patet eos ignorare quæ profitentur.
Quod quidem his præcipue perspi-
cere licuit, qui illorum contentioni-
bus interfuerint. Nam cum iidem
illi boni viri eodem in conspectu at-
que confessu auditorum inter se con-
tendant, nunquam tamen in eodem
sermone vnus idemque vir tres de-
inceps alios conuicit. sed modo hic
superior est, modo ille, cuicumque
præsertim fuerit lingua magis flu-
xa, magisque in turbam idonea.
Qui autem recte sentire putans ali-
quid de rebus pollicetur, is meritò
rationes suas probabiles atque inui-
ctas semper affert. siquidem vera in-
telligit & recte demonstrat. At ve-
ro isti quidem videntur impruden-
tia sua non tam in verbis, dum dispu-

HIPP.

tant, errare, quàm etiam Melissi sententiam sequi atque probare. sed de his hæcenus. Etiã ex medicis quidã ho iem sanguine tantũ, quidã bile quidã pituita constare dicunt: ipsique omnes eandem subiiciunt conclusionem. Aiunt enim vnum quid esse, cui nomen ad illorum cuiusque libidinem imponitur. porrò id vnum formam & vim mutare à calore, vel frigore coactum: mox dulce aut amarum, aut album, aut nigrũ, aut aliud quid diuersum fieri. Verum hæc non sic habere mihi videntur. Nam si homo vna re constaret, nullo vnquam morbi genere afficeretur. neque enim esset vnde doleret, cum vnum tantũ modo foret. Quodd si affligeretur, vna vtique curatio necessario foret. Contrà, nunc plures existũt: quia plura in corpore sunt, quæ cum plus iusto inter se calfiunt, aut refrigerantur, aut siccescũt, aut humefiunt, morbos pariunt. ex quo multa habentur ægrotationum genera & multæ quæque illarum curationes. Cæterum, mea quidem opinione, qui hominẽ

languine
centet,
non ma
saltem
minu
solu
funt
quo id
me dista
bii sue
quibus
dixerim
secund
in quo
nili
frig
que fig
ram, e
no quo
corpon
fieri ne
vnum
aliud
miser
dem
facult
dem

sanguinem & nullam aliam rem esse
censet, is deberet demonstrare eum
non mutare formam aut variari, aut
saltem aliquod anni tempus: aut ho-
minis ætatem ostendere, qua sanguis
solus appareret esse in homine. veri-
simile nanque fore aliquod tempus,
quo id vnum in seipso esset. Hac a-
me dicta etiã in eos conueniunt, qui
bili siue pituitæ tantum tribuunt. Ex
quibus vero hominem ego constare
dixerim, ea & secundum legem, &
secundum naturam, cum & vniuscui-
usque ætati tam iuuenili, quàm se-
nili, tum tempori tam calido quàm
frigido conuenire demonstrabo: at-
que signa etiam & argumenta affe-
ram, eaque aperiam, quibus necessa-
rio quodque augetur aboleturue in
corpore. Primum generatio ab vno
fieri nequit. Quoniam enim pacto
vnum quid generare posset, nisi quid
aliud admisceretur? Tum nec quæ
miscentur, generarent: nisi essent eius-
dem generis, eandemque haberent
facultatem. Rursus nec generatio qui-
dem nobis perfecta foret, nisi cali-

HIPP.

dum & frigidum, siccum & humidū
 inuicem temperate & pati modo se
 haberent: aliter inanis esset si alteru-
 trum altero valentius infirmius ve fo-
 ret. Proinde qui verisimile est vt ali-
 quid ab vno generetur, cum id ne à
 pluribus quidem fieri possit, nisi mu-
 tuo temperamento mixtis: Cum igitur
 natura eiusmodi sit cum omniū
 reliquarum rerum, tum etiam homi-
 nis: necesse est hominem non vna re
 constare, sed vnumquodque eorum,
 quæ generationi suppeditauerint, ta-
 lem quampiam vim in corpore pos-
 sidere, qualem contribuerit. Rursus
 homine animam agente singula in
 propriam naturam discedunt, vñ
 inquam in vñ, siccum in siccum,
 feruidum in feruidum, algidum in al-
 gidum. Nempe talis est tum animun-
 tum, tum cæterarum omnium re-
 rum natura. omniaque sic orta, occi-
 dunt similiter. Ex his enim quæ præ-
 diximus omnibus, cuiusque natura
 consistit, desinitque pari ratione: cum
 id in seipsum vñde concreuerit, se re-
 ceperit. Corpus autem humanum ha-

bet in se sanguinem & pituitam, & bilem duplicem, tum flauam tum atram, ex quibus & consistit & egrotat, & valet. Valet quidem præcipue cum ea inter se vim & copiam mediocriter temperatas maximeque p mixtas habuerint. Contrà, laborat cum eorum aliquid est plus minusve iusto, siue cum in corpore secretum est, neque cum aliis confusum. Quod quidem non modo locum, ex quo abscesserit, afficit: verum etiam ad quem abscesserit, exercet, propter nimiam & exuperantem copiam. Vtique si quid citra superfluitatem foras eruperit, negocium præbet propter exinanitionem similiter intus si vacue sit migrat ve, aut ab aliis excernitur, duplicem molestiam præbeat, necesse est, quemadmodum dictum fuit, videlicet vnde abscesserit, ac vbi exuperat. Quod vero dixi me quibusunque hominem constare statuerim, ea semper esse demonstraturum secundum institutum & naturam, idcirco aio sanguinem esse & pituitam, & bilem tum flauam, tum

atram. Atq; horum nomina primū
quidem instituto distincta esse dico,
quòd nulli eorum idem nomen in-
ditum sit: deinde secundum naturam
formas discrepare, minimèque pi-
tuitam similem esse sanguini, aut san-
guinem bili, aut bilem pituitæ. Quo-
nam enim pacto inter se similia esse
possunt, cum neque ad visum, neque
ad tactum similia esse cognoscantur?
Neque enim pariter calida, siue frigi-
da, siue sicca, siue humida sunt. Ergo
quando tantum inter se & forma &
vi differunt, necesse est ea non esse
vnum: siquidem neque ignis & aqua
idem sunt. Quòd ea omnia vnum
non sint, sed ex ipsis quodque pro-
priam vim atque naturam trahant,
vel hac vna re tibi maxime consta-
re posset. quia pharmaco quod pitui-
tam siue bilē aut flauam, aut atrā cit,
dato, pituita siue bilis flaua aut atra
tibi euomitur. Itē aliqua corporis ps-
vulnere affecta, tibi sanguinē emittet.
Atq; oīa vsu hæc tibi veniēt tā inter-
diu q̄ noctu, tā hyeme q̄nā æstate, nul-
lo tēporis spacio itermisso. donec ho-
mo spiritū

mo spiritum accipere reddereq; potest. poterit autem, donec aliquo isto rû priuetur cognatorû. Quæ quis negaret esse cõgenita: cû luce clarius appareat hominem dum inter viuos agit, cum ea omnia in se semper habere quæ nunc dico atq; demõstro, tum etiam natum altumq; ab homine eadem illa omnia habente. Qui autem vnum quid esse hominem putant, hî mihi propterea in hanc opinionem venire videtur, qd ex iis q epoto pharmaco inter purgationes animam efflarût: quosdam bilem, quosdã pituitam euomentes conspicati, putarunt hominem quoduis illud esse, quod p purgamenta morientem eiicere conspexissent. Eadem nituntur ratione qui hominem dicunt esse sanguinẽ, quoniam cruorem, qui sibi sub conspectum ex iugulatis hominibus manans subiicitur, animam in homine esse putarunt. hæc sunt quibus omnes isti vtuntur in suis sermonibus, argumenta. Verum qui bilem solum per purgationem eiecerit, adhuc mortuus est nemo, sed sumpto pharmaco

h

HIPP.

quod bili mouendæ est, primum bilem, mox pituitam, porro alteram bilem atram & quidem per vim, tū demum moribundus sanguinē euomit purum: quod idem contingit his qui sumunt potiones pituitam mouentes, Primum enim pituitam, deinde bilem flauam, ex hac atram, postremo sanguinem purum euomunt, atque è vestigio finiunt vitam. Nam pharmacum cum corpus intrarit, primo id quod omnium maxime sibi secundum naturam cognatum atque simile est, agit: exinde reliqua trahit & purgat. quemadmodum stirpes & semina terram ingressæ, sibi quod ex ipsarum natura est trahunt vel acre, vel amarum, vel dulce, vel salsum, vel aliud quid diuersum, in primisque ex eo plurimum, quod sibi naturali propinquitate maxime coniunctum est, arripiendo, tum cætera deinceps attrahendo. Talem quoque modū pharmacæ seruant quæ bilem mouent, primum meracissimam purgant, deinde mistam. Item pituitæ pharmacæ primū meraciore pituitā ciunt, post

confusam. iugulatis sanguis fluit primo quidē feruentissimus atq; perquā rubidus, mox magis pituitosus magisq; biliosus. Hyeme crescit in homine pituita. quod ipsa præcipue ex oībus quæ in corpore sunt, natura sua, eo tēpore frigidissima, est argumēto. quia si pituitā, bilē, sanguinē tangere libuerit, pituitā profecto facile oīum algidissimā reperiēs: tamē & si lētissima sit ac non nisi summa cū violentia secūdū atrā bilē citetur. Quæ enim per vim veniunt, ea propter violentiā feruētiora reddūtur. Sed tamē præ his oībus pituita suapte natura multo frigidissima apparet. Quod autē hyems corpus pituita impleat, tibi patebit, cū ex sputo & mucco ac pituita nasi, quæ hyeme supra modum fluentia emunguntur, tum vero ex cæteris morbis pituitosis, præsertimque tumoribus qui præcipue eo tempore maxime albicant. Vere autem pituita in corpore valentissima inest: sed sanguis crescit, suscipitque indies maius incrementum. tunc enim frigora remittuntur & im-

bres relaxantur, ex quibus & dierum quoque tempore sanguis augetur: cuius naturæ id anni tempus, quoniā humidum est & calidum, maxime cō simile existit, indicio q̄ homines verno æstiuoq; tempore potissimum torminibus corripiuntur, ac supra modum calescunt & rubent atq; sanguis ē naribus fluit. æstate vero adhuc sanguis cum viget, sed bilis effertur accrescitque & in autumnum pertinet. In autumno sanguinis parum est, quia illius naturæ id temporis contrarium habetur. Bilis & æstiuo & autumnali tempore imperium corporis obtinet, argumento, q̄ homines & sponte sua & per purgationum potiones bilem biliosissimasq; res euomūt vel excernunt. quod item ex febribus & hominū coloribus patet. Pituita æstiuo tempore longe infirmissima est, quòd ei tempus ob calores siccitatesque vehementer aduersatur. Autumno, sanguinis quota pars est in homine: quoniam id tempus siccum est, & hominem iam refrigerare incipit. Sed atra tūc bilis, quàm plurima est & po

tentissima, quæ instante vero hyeme
 decrefcit imminuiturque refrigerata.
 Rurſus pituita viciffim augetur, tum
 ab imbribus numeroſioribus, tum à
 noctibus longioribus. Profecto hæc
 omnia ſemper habet corpus huma-
 num. quæ certe nō negauerim pro tē-
 poris circūſiſtentis qualitate, ac pro-
 pria cuiuſq; natura, ſeparatim modo
 maiora, modo minora fieri. Vt an-
 nus omnis omnium iſtarū rerum ca-
 liditatis ſcilicet & frigiditatis & ſicci-
 tatis & humiditatis particeps eſt. ne-
 que enim quæpiam illarum vel quo-
 ta temporis parte conſiſteret, ſine re-
 liquarum omnium quæ in hoc mun-
 do ſunt, conſortio. imò ſi qua defice-
 ret, omnes ſimul abolerentur: quippe
 quæ ab eadem ſunt conſtitutę neceſſi-
 tate, inuicemq; aluntur & ſubſtentan-
 tur. Simili modo homo, ſi quid eorū
 ipſi deficeret quæ congenita ſunt, nō
 amplius vitā degere poſſet. In anno,
 modo hyems maxime, modo ver,
 modo eſtas, modo autumnus viget.
 haud aliter in homine interdum pi-
 tuita dominatur, interdum ſanguis,

h iii

interdum bilis, tum flaua, tum atra,
euidentiore quoque argumēto: quia
si quater in anno eidem homini vnā
eiusdem generis potionem dederis,
hyeme tibi euomentur pituitosissi-
ma, vere humidissima, æstate biliosis-
sima, autumno nigerrima. Cum igitur
hec ita se habeant, oportet ægro-
tationes quæ hyeme incrementum su-
scipiunt, æstate desinere: & econtra,
quæ æstate creuerint, hyeme termina-
ri, nisi intra dierum circuitum, de quo
postea loquemur, absoluatur. Verno-
rum morborum liberatio in autum-
num expectanda est. Autumnales au-
tem, veris tempore liberentur neces-
se est. Hæc vero quisquis stata tempo-
ra supauerit, hunc fore annum scire
oportet. Sic medicum morbis mede-
ri oportet, habita bene cuiusq; quod
in corpore pro tempore & eius natu-
ra viget, ratione. In primisque præte-
rea non ignorare debet morbos qui
ex impletione proficiunt, exina-
nitione curari: & ediuerso, qui euacue-
factione proueniūt, sanari saturitate.
Qui à labore, hos quiete: qui ex ocio,

eos exercitatione euinci. In summa,
oportet medicū scire obsistere instāti
bus & morbis & formis & temporis
bus & ætatibus, & cōtenta laxare, &
laxata contendere. tali nanq; modo
morbi vitium facillime desistere po-
terit. Et hoc mihi sanatio esse videtur.

Observationes morborum.

MOrbi alii á victus genere,
alii á spiritu quē trahētes vi-
uimus, proueniunt. Sed de
vtriusq; hoc modo discepta-
ri atque diiudicari oportet. Cum vna
ægritudine complures eodē hoīes tē-
pore corripīūtur, causam ad id reiice-
re debemus, quod maxime cōe est,
quoq; oēs vtimur. id autē spiritus est
quē accipimus reddimusq;. tunc enim
victum nostrum nequaquā in causa
esse manifesto cōstat, cū morbus om-
nes pariter attingit, tā iuniores q̃ se-
niores, tam fœminas quā mares,
tam temulentos quā abstemios, tā
qui ordeaceum quā qui triticeum
in cibatu sumunt panem, tam qui pa-
rum quā qui multum laborant.

Ergo non victus rationi in causa po-

h iiii

nendum est: cum homines quoque
 scendi modo vtentes in eandem inci-
 dunt agrotationem. Cum vero eodē
 tempore diuersi morbi gignuntur, si-
 ne dubio victus cuiusq; culpa ē. Opor-
 tet itaq; remedia adhibere cum mor-
 bi occasione, quemadmodum a no-
 bis alibi dictum est, repugnando, tū
 etiam victus genera mutando. quan-
 do quidem cibos quibus homo vti so-
 litus est, nequaquā aptos esse liquet, vel
 vniuersos vel plerosq;, vel vnum eorū
 quēpiam. quod cum didiceris inspe-
 cta tamē & considerata, vt à me iam
 dudum dictum est, hominis natura,
 ætate, forma, & anni tēpore, & mor-
 bi genere; debes victum mutare & re-
 media facere, modo demēdo, modo
 addendo: cum hoc vt omnem cura-
 tionem tuā siue victum ad cuiusq; eta-
 tis habitum tempora, formas, mor-
 bosq; dirigas. Atqui si morbus vnus
 omnes promiscue & vulgo infestat,
 clarum est non victum, sed quem tra-
 himus spiritum, in causa esse. quippe
 qui morbidam plane quandā excre-
 tionem habeat, Perpetuum igitur est

homines per id temporis hæc admo-
neri, scilicet ne victum mutant q mor-
bi causa nō existat: prospiciant vt cor-
pus sit quā solidissimum atque atte-
nuatissimum cibis potibusq; quibus
vti consueuerint, sensim demendo. q̄a
si festinantiū victus mutaretur, à mu-
tatione periculum foret aliqd in cor-
pore innouandi. Quare solito victu
vtendum est, cum noxæ causa sit nul-
la hominis. Insuper vt q̄ paucissimus
spiritus corpus igrediatur, isq; vt ma-
xime peregrinus sit prouidendū, tum
loca in quibus morbus grassatur, quo
ad fieri potest, mutando, tum corpora
attenuando. sic enim minime mul-
to ac denso homines egeant spiritu.
Morbi qui à corporis membrorum
validissimo profiscuntur, grauissimī
sunt: atq; si ibi vbi cœpti sunt, manse-
rint, necesse est validissimo membro-
rū laborāte totum corpus laborare.
Sin autem ab ībecillioribus se in va-
lidissima insinuauerint, facilius absol-
uuntur. quia vī facile vindicantur quę
influant.

De venarum natura.

HIPP

VEnæ corporis crassiores ad hunc modum oriuntur, quatuor paria sunt. Primum quod ab occipite ortum, tendit per ceruicem summa perreptans latera spinæ, ad clunes & crura: deinde per tibias & malleolos exteriores ad pedes. quam ob rem doloribus dorfi & coxarum, de poplitibus malleis ve exteris sanguinē mitti solitum est. Secundum venarum par, de capite circum aures per ceruicem, iugulariæ dictæ sunt, intus propter spinam & lumbos ad testes & fœmora perfertur, atque per poplites & tibias propter interiores malleolos ad pedes. Quapropter doloribus lumborum & testium sanguinem poplitibus aut malleolis mittimus interioribus. Tertiū par venarū, à tēporibus per ceruicem sub scapulis porrigitur ad pulmones & altera de parte dextra in sinistram pergēs māmam subit, & ad lienē renemque descendit: altera de sinistra in dextrā procedens à pulmonibus māmam subit, mox iecur petit & renē: vtraque postremo ad podicem desit.

nit. Quartum par, ortum à sincipite, de sede oculorum per ceruices ad humerorū clauiculas deuenit, vnde per lacertos ad agilem, mox per cubitos ad volam & digitos. vnde intus remeans ad alas propaginem mittit, quæ summam costas perreptat, dum altera ad lienem, altera ad iecur perueniat. deinde vtraque emînens per ventrem ad genitale desinit. ita venæ crassiores habent. Procedunt quoque à ventriculo per corpus aliæ per multas & variæ venulæ ramulorum modo, per quas alimentum corpori transmittitur, quod à crassis venis & interioribus & extimis ferunt ventriculo, & reliquo corpori sibi que inuicem subministrant, internæ: scilicet externis, & externæ internis. Quam ob rem has mittendi sanguinis rationes seruare aptissimū est. operæque precium est, vt cultellus q̄ longissime à loco vbi dolor esse & sanguis cogi dicit, adigatur. quia tali modo haud magna repent e mutatio fieret & cōsuetudo remoueretur eodē amplius cocūdi, oībus q̄ aut febre ītegrī mul-

tum puris excreant, aut dolore vacui
 sedimentum vrinae admodum puru-
 lentum, aut stercora cruenta, sicut in
 torminibus, & diuturna habent: qua-
 lia esse solent iuuenibus quinq; & tri-
 ginta annos natis, & hominibus etiā
 grandiore æuo: his omnibus eadem
 illa res morbi causa existit. Qua pro-
 pter eos exercitationibus atque cor-
 poris laboribus deditos esse oportet,
 ac ne operariorum quidem labores
 in adolescentia subterfugere, deinde
 laboribus remissis corpus implendū
 est molli carne & à priore multū dis-
 ferēte, ita vt adeptū & aduenticiū
 corpus à superiore & vernaculo disci-
 minis habeat multum. Si quis igitur
 ita affecti quādoq; in ægrotationem
 inciderint, quā primum euadunt. sed
 post à morbo, subinde tēporis curri-
 culo corpus liquatur, & ad saniei effi-
 giem per venas, quæ latissimæ & p-
 uix sunt, diffluit. Quod si ad inferiore
 ventriculum cite ruit, tale ferme qua-
 le intus erat emittitur per meatus se-
 cessum. quippe quod utpote via de-
 cliui & lubrica, haud diu in intestino

detineatur. Quibus in pectus destilla-
rit, suppuratione infestatur: quia diu-
tius in pectore sedens cum veluti ac-
cliui expurgatione sursum versus dif-
ficulter eiiciatur: marcescit & suppu-
rat. Si ad vesicam eruperit, à loci ca-
lore calefit, album redditur, secerni-
tur ac rarefit, rarefactūq; desuper flui-
tat, pars crassa subsidet, quæ pus di-
citur. ideoq; pueris calculi concrescunt,
ob eius loci & reliqui corporis calidi-
tatem. quod vsu viris nequaquam ve-
nit, propter corporis frigiditatē. Nō
alienum est scire, hominē prima die
supra quā possit, esse calidissimum,
nouissima autem frigidissimum. ne-
cesse enim est calere corpus quod ado-
lescit, & ad vires incrementūque ten-
dit, ediuerso illud supra modum, fri-
gere, quod coeperit aboleri & tanquā
maturum ac victum atque caducum
in ruinam præceps festinare. Atque
hac ratione homo prima die quanto
maximum suscipiat incrementū, eo
magis calefit. sic extrema quanto,
plurimum vitalis roboris detrahitur,
tanto frigidiorē esse necesse est. Ex

illis autem qui prædicto modo affecti sunt, plerique sponte sua, si tempestive, scilicet quinto & quadragesimo die liquari cœperint, sanescunt. Sin autem eam dierum metam præterierint, per se annum conualescunt, nisi vero quapiam alia re homo offendatur. Morbos qui sensim oriuntur & quorum causæ cognitu faciles existunt tutissimos appellare licet. Quare presentissima curatio, si quāprimū morbi causæ occurratur. qua sublata, morbus absque negotio discedit. Quibus in vrina ad arenularum similitudinem aliquid subsidit, seu pori, id est tophi lapilli, his tubercula ad crassam venam enata sunt, atque suppuruerunt. deinde cum ea haud ita cito erumpunt, pori deuoluti ex pure per venam, simul cum vrina in vesicam extruduntur. Si vrinæ cruentæ sunt, in venis vitium est. Si vrina quæ crassa est, habuerit ad effigiem capillamenti caruunculas admodum minutas, signo est vitium esse in renibus & articularibus. Si pura & i summa vrina videnti furfures huc illuc quæ inatet, sciri licet

vesicę scabię subesse. De febribus.

Magna ex parte febres à bile sunt. genera earum quatuor sunt, absque illis quæ doloribus eueniunt. Nuncupantur autem, continens, quotidiana, tertiana, quartana. Continens, à copiosissima atque meracissima bile prouenit, & per quā breui iudicatur. qm corp⁹ à vehemēti calore feruescēt dē nullo tps īteruallo refrigescit, celeriter soluitur & absumitur. Quotidiana, secūdū cōtinētē à largissima bile est, & ex omnibus aliis citissime euincitur. longior est continente, quo pauciore ex bile venit. tum quia corpus propter intermissionem requiescit in continente autem nullo vnquam tempore quietem habet quia nulla sit intercapedo. Tertiana, diuturnior est quam quotidiana, a minore bile accedit. quanto plus in tertiana quā in quotidiana corpus requiescit, tātō diuturnior ē, quā quotidiana. Quartana aliōqn pari rōne lōge diuturnior terni anis ē: tū qā minus bilis hñs estū afferētis, tū quia corpus amplius refri-

*que dolo: y
vide 2^o d
crisi ear:
191. col. p.*

gescit, quod ab atra bile id superan-
 tis materiæ profiscitur ac difficulter
 euellitur. Nā cum ea inter omnes cor-
 poris humores lentissima, & glutino-
 sissima sit; diuturniores sedes cōstituit.
 Quod autem febres quartanæ, atræ
 bilis participes sint, hac re tibi pate-
 bit quod homines autumnali potissi-
 mum tempore, & in ætate viginti-
 quinque annorum vsq; ad quadrage-
 simum quintum annum, quæ ex om-
 nibus ætatibus, maxime atra bile de-
 tinetur, corripuntur quartanis, qui-
 bus autumnus inter omnia alia anni
 tempora expositissimus est. Quos igi-
 tur ultra citra ve id tempus ac eam
 ætatem quartana accesserit, pro com-
 perto habere debes hanc febrem mi-
 nime diuturnam fore, nisi quid aliud
 homini officiat.

LIBRI DE NATVRA HV-
 MANA FINIS.

HIPPOCRATIS

COI, DE RATIONE VI

ctus in morbis acutis liber pri-

mus, Gulielmo Copo Ba-

siliensi interprete.

Priscorum medicoꝝ tres fuisse fami-
lias meminit Galenus libro de curan-
di via & ratione. Vna eorum fuit me-
dicoꝝ, qui Coū insulam incolebant:
quoꝝ princeps fuit Hippocrates. Alia
Rhodioꝝ. Tertiæ sectæ authores Cni-
dii vocabantur, á Cnido īsula: vna ex
quinque Cycladibus. Horum placita
Hippocrates hoc loco Cnidas sen-
tentias vocat.



Vi Cnidas vocatas sen-
tentias, posteritati lite-
ris prodiderunt, quam-
uis in singulis morbis,
& affectus & accidentia
quædam egroꝝ recte quidem illi scri-
pserint, tamē ea dūtaxat attigerūt, q̄
nullo ferē negotio scriberet is quoq̄,
qui medicinā nō didicit, si laborantē
accurate sup singulis affectionibus in-
terrogaret. quippe multa, quę non re-

DE RA. VICIN MOR. ACV.

- ferēte agro, medicum pranoscere ne
cesse est, pręterierunt. atq; in aliis qui
dem alia, quorum nonnulla non me
1 diocrem ad coniecturas cōmoditatē
habere videntur. Igitur de his quę vel
3 ad coniecturam, vel ad curationis ra
tionem pertinent, equidem longe ali
ter atque illi enarrauerunt, sentiendū
4 puto. quapropter eos haudquaquam
laudauero, idque non solum ob hanc
causam, verū etiam quòd paucis ad
modum medicamentis vsi sunt. Nam
prater ea quę de acutis morbis prę
cipiunt, hęc dumtaxat tradiderūt, ela
terium, id est medicamentum quod
purgādi vim obtinet, serum, & lactis
suo tempore potionem. Quę si satis
efficacia ad morboꝝ curationē essent
ipsi summa laude fuissent extollendi,
utpote qui pauca admodū, sed qbus
nihil deesset, prescripssent. Id vero lō
5 ge ab est à veritate. Proinde postero
res, suscepto corrigēdi munere, medi
ca magis via, ea q singulis exhibenda
sunt, instituere tētauerunt. Etenim de
6 victus rōne, veteres nihil pene scripse
rūt. sed hęc ptē haudquaq; cōtemnēdā

pteriusse videtur, quibus nonnulli singulorum
morborum varietates multifidosque ipsorum
modos, non ignorarent. Quin et in hoc pec-
caverunt, quod omnium morborum nume-
rum manifeste deprehendere conati sunt.
id vero perdifficile est, si inde coniecturam
feceris, quod morbi inter se differunt, nullus
que sit idem morbus, nisi idem quoque no-
men sortiatur. ¶ Mihi vero placuit uni-
uersae huic arti sic mentem adhibere, ut
enarrata in ipsa singula officia, perbe-
ficiantur, & quae celeritatem desiderant, ce-
lenter, & quae puritatem, pure: & quibus do-
lor accedere non debet, ea iucundissime
tractentur, ac reliqua id genus omnia secun-
dum hunc modum (quod a proximo illo plane
abhorret) in meliorem formam redigan-
tur. Quocirca illum medicum in primis
laudandum putaverim, quod in acutis morbis,
ea quae plures enecare solent, longe diuersa
ab aliis ratione, imo melius commutare possit.
igitur hi sunt acuti morbi, quos veteres
vocauerunt costalem, peripneumoniā, ischa-
miā, lethargum, ardorem, & si quae alii illos
sequantur, inter quos omnino febres con-
tinuae egrum interficiunt. Quum enim
nullum commune pestilentis morbi genus

DE RA.VIC.IN MOR.AC.V.

grassatur, sed dispersi, dissimilesque fuerint morbi, ii magis quam reliqui omnes hominem perimere solent.

Ioldiote vero (quod ad huiusmodi mor

Ibos pertinet) sicuti nequeunt quantum quisque à proximo differat, discernere: ita modo has, modo illas curationis formas, aut laudant, aut vitu

I2 perant. Cuius rei haud mediocre indicium est, quod horum morborum curandi rationem populares, utpote rudes, omnino ignorant. medicos enim arbitrantur esse eos qui medici non sunt, maxime ubi dictorum morborum genus aliquod inciderit. facile enim est apud agros nomina usu comprobata proferre: quippe si aut ptisanæ cremorem, aut vinum aliquod, aut aquam mulsam quis nominauerit, vulgares hæc eadem apud medicos, tum præstantiores, tum deteriores sine ullo discrimine in usum venire existimant. verum e contrario res sese habet: nam longo interuallo (quantum ad iam proposita attinet) inter se diffident. Igitur scribere aggredior, in primis ea, quæ quamuis scitu utilia

sint, tamen si medicis ignorantur, de
inde ea quoque quæ magnopere vel
iuuare, vel lādere consueuerunt. Quæ
ignorantur, hæc ferè sunt. Cur alii qui
dem medici non colatam ptisanam
perpetuo exhibentes, minime se erra
re putant. alii vero omnino præcipi
unt, vt ne hordeum quidem vllum la
borans deuoret, magnam inde no
xam timentes, sed per lintheum cola
tum cremorem exhibent. Sunt qui ne
que crassiorē ptisanam, neque suc
cum eius dādum censeant, idque alii
vsque ad septimum diem, alii donec
finiatur morbus. Sane huiuscemodi 14
quæstiones, medici neque propone
re, neque propositas explicare consue
uerunt. Quam ob rem populares gra 15
ui admodum calumniam vniuersam
artem damnant, perinde ac si nulla
(quātum ad acutos morbos attinet)
videatur esse medicine professio. Tan 16
ta enim est artificum inter se pugna,
vt quod vnus saluberrimum, id alter
protinus perniciosum esse contendat
Atque hac ratione factum est, vt diui
nationi ferè ars ipsa comparetur. Si

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

quidē augures, eādē auem, ad sinistrā quidem faustam, ad dextram vero infelicem esse putāt. Similiter vbi victimarum exta inspectantur, talia quādam inueniri solent, a quibus deinde vatum nonnulli omnino dissentiunt.

- 17 Hanc perpensionem, tum honestissimam esse, tum cognatione quadam, plurimis, eisdemq; perquam vtilibus in arte rebus, cōuenire dixerim. vtpote quæ agris vniuersis, magna quadā vi, sanitatē, sanis securitatē, exercitantibus bonū habitum, & quicquid aliud quoq; volueris, pollicetur.

DE PTISANA.

- 18 **I**gitur ptisana in his morbis, cæteris quæ ex frugibus constāt pulmētariis, mea quidem sententia rectissime antefertur. neque mediocri laude efficiendi sunt ii, qui eam anteponere decreuerūt. Nam viscositas eius lenis, contiua, iucunda, lubrica & modice laxa est, sitim arcet, & (vbi ablutione opus est) facile descendit, non astringit, non vellicat grauius, neque in ventre tumescit. quippe quum decoqueretur, tumuit quan-

tum maxime tumescere potuit. Cæte
rū qui in huiusmodi morbis ptisana
vtūtur, ne vna quidē die venas (vt ita
dicam) concidere sinant, sed ab eius
vsu nequaquā desistant, nisi aut medi
camentū aut clyster id impediāt. Pro
inde qui bis die cibum ex consuetudi
ne sumunt, bis quoq; ptisana eis exhi
benda est. Qui vero semel duntaxat,
iis primo quidē die semel tātū detur,
facta tamen additione. Quod si fieri
pōt, bis quoq; exhibeatur, vbi videli
cet res ita expostulare videtur. At in
prīcipio neq; multā, neq; crassam da
re, sed aliquid tum cōsuetudinis gra
tia, tum ēt ne venæ concidāt ingerere
conuenit. Sed de sorbitionis incremē
to animaduertendum est. Nam si quā
aridissimum esse conieceris morbū,
haud ita multum ipsius dare oportet:
sed ante sorbitiouem, aut aquā mul
sam, aut vinū, vtrū magis profuturū
existimaueris, ppinare. vtriusq; vero
vsum in singulis affectionibus postea
dicemus. At si humidū fuerit os, & q̄
à pulmone excernūtur debitam qua
litatem seruauerint, augenda est (vt

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

- summatim dicam) sorbitionis quantitas quippe quo copiosior, citatiorque humor apparuerit, eo maturiorem: quo vero tardior, minorque, tardiorē
- 24 morbi finem denunciat. Verum hæc ipsa per se magna ex parte talia deprehenduntur. multa vero haud inutilia à quibus cōiecturas capere oportet, hic omisimus, de ipsis postea dicturi. Cæterum quo copiosior fuerit
- 25 purgatio, eo cibum oportet esse austiorem, idque vsque ad morbi iudicationem, cuius impetus magna ex parte duos dies non excedit, ubi vel quinto, vel septimo, vel nono die morbus finiri debet. quocirca & pares, & impares dies accurate ppēdere oportet. His ita cognitis, sorbitionem matutino quidē tempore exhibe, vespere autem ad alios etiam nū cibos trāsire poteris. ¶ Huiuscemodi igitur institutio magna ex parte iuuat eos qui protinus ab initio tota vtuntur ptisana. ¶ Quum itaque pleuritici aliquid
- 27 notatu dignum scire & expurgare cœperit, dolores ipsorum ilico sua sponte desinunt. Quinetiam purga,

tiones hoc pacto longe perfectiores
sunt, minusque suppuratione afficiū-
tur, q̄ si aliena victus ratione educa-
rentur. insuper iudicationes simplici-
res, facilioresq; fiunt, neq; tam facile
morbi reuertuntur. ¶ Sane ptisanam 28
ex hordeo quam optimo facere, &
eam probe concoquere oportet. idq;
præsertim si non solo cremore vti de-
creueris. sic enim præter reliquas pti- 29
sanæ commoditates, lubricitas eius
prohibebit, ne inter deuorādum, no-
xam inferat, hordeum, neque enim
adherebit, neq; per thoracē transeun-
do morā faciet. Quum enim studio-
se coquitur, perq; lubrica euadit, sitim 30
nequaquā excitat, atq; vt facillime con-
coquitur, ita imbecillissima est. qui-
bus nimirum omnibus indigemus.
¶ At nisi exquisita fuerit huiusmodi
sorbitiois præparatio, aded vt nihil 31
desit, quo minus expectatum auxiliū
præstet, noxia sæpenumero efficitur.
¶ Etenim quibus cibus recens conclu-
sus est, si eo non vacuato, sorbitio de- 32
tur, dolor iam instans irritabitur aut
si dolor nō est, ptinus inducetur, spūs

DERAT.VIC.INMOR.AC.

- 33 reddetur q̄ frequentissimus, id quod
nō mediocre malum est. nam pulmo
exiccatur, & præcordia, abdomen,
atque septum trāuersum dolore cru-
ciantur. Quinetiam vbi lateris dolor
continuus est, atq; calidis fomētis nō
leuatur, neq; procedit sputū, sed lentū
& iocctum est, si tum neq; alui ductio
ne, neq; sanguinis missione (si horum
auxiliorum alterutrum conferre vi-
deatur) dolorē solueris, sed ptisanam
sic affectis exhibueris: nihil obstat
quo minus præcipiti morte rapiantur.
34 Et itaq; ob has causas, atque id ge-
nus alias, qui totam ptisanā ingerūt,
vel septimo die, vel citius moriuntur,
ac alii quidē demētes, alii vero à spiri-
tus difficultate stertentes suffocantur.
35 Proinde vetustissimi, eos syderatos eē
putabant, cum ob eas quas modo cō-
memorauimus causas, tum vero q̄
mortuis, latus liuore affectum ad pla-
36 gæ similitudinē videbatur. Cuius rei
causa est, q̄ perseverante adhuc dolo-
re, mors propter difficilem anhelatio-
nem obortam, ipsos præoccupat. ci-
tantur enim spirationes. Ex multa re-

ro frequētiq; spiratione (vt diximus)
sputum incoctum, viscosumq; factū,
non procedit: sed in pulmonis meatibus
retentum, stertorem efficit. Quū
itaque ad hoc difficultatis peruenerit
magna ex parte mortiferum esse cō- 37
suevit. Quippe retentum sputum, pro
hibet aeris ad interna lationem, ip- 38
sumq; celeriter egredi cogit. quo fit,
vt vicissim alterum ab altero male af-
ficiatur. siquidem retentum sputum,
spiritū frequētem reddit: spiritus au-
tē frequens, sputum sic facit viscosum 39
vt elabi non possit. ¶ Solent vero ea,
quæ supra diximus, accidere, non so-
lū ob ptisanam importune sumptā,
verū etiam multo magis, si quid aliud
edatur, vel bibatur qd sit ptisana de-
terius. Ergo easdem fere commodi-
tates magna ex parte adipiscuntur, 40
& ii qui tota ptisana, & qui succo ip-
sius, quique neutro horum, sed potio-
ne duntaxat vtuntur. Atque accidit in-
terdum vt diuersæ sint singulorum cō-
moditates. Id vero omnino obser- 41
uādū est. Si quempiam qui non ita
dudum cibū accepit, nec alui adhuc

DERAT.VIC.IN MOR.AC.

- onera deiecit, febris, vel vnà cum dolore, vel etiam sine dolore corripuit, sorbitio danda non est, donec conieceris cibum ad imas intestinorū partes descendisse. Infestante itaque dolore, potui dandum est oxymel, hyeme quidem calidum, æstate vero frigidum. Sed vbi sitis vehementer cruciat, & aquam mulsam, & aquā ipsam dare conuenit. deinde si vel dolor, vel periculum, aliquod aliud imminet, danda est sorbitio, sed neque multa, neque crassa, ac ne id quidem prius quam dies septimus præterierit, si vires ægri sufficiant. Illi qui nuper cibum accepit, si vires valent, & viget ætas, clyster immitti debet, si cibus iam pridem sumptus, nondum descendit. Imbecillo autem glandem supponere oportet, nisi sponte deiectio sequuta est. Sane tempus exhibendæ sorbitionis, tum ab initio, tum per totum morbi decursum summopere obseruandum est. etenim pedibus frigore affectis, non solum à sorbitione, verum etiam à potione maxime abstinendum est. sed tum dabi

mus & sorbitionem & potionem, quum calor ad pedes vsque peruenerit. Nam hoc tempus quam maxime opportunum est, cū in omnibus morbis, tum præcipue in acutis, potissimum vbi & febris, & periculum vehemens subest. ¶ Proinde si acurate, 46
ea quæ supra proposita sunt, animadu-
uerteris, in primis ptisanæ cremorē,
deinde ipsam quoque ptisanam da-
re curabis.

LIBER SECVNDVS.



Ateris dolorem, siue is
protinus à principio, si-
ue postea obortus est,
non ab re fuerit tenta-
re, tepidis fomentis dis-
soluere. ¶ Calorifico au-
tē fomento, quo aqua calida in vtre,
vesica, vel vasculo æreo, aut testaceo
adhibetur, nullū aliud præstantius ē,
sed melle aliquod (quo iucūdius fiat 3
fomētū) prius lateri apponendū est.
¶ Quinetiā vtiliter adhibetur spongia
magna, mollisque, ex aqua calida ex-
pressa. vestiendū vero fomentū ē, vt
neq; vis eius celeriter deleatur, euane, 4

DE RA.VIC.IN MOR.AC.V.

- scatque, neque nidor ad ægri spiritū
pertingat, nisi fortassis vsum quen-
dam prestare videatur. nam interdū
nonnihil vtilitatis in ipso deprehen-
ditur. Ad hæc hordeum & eruum, in
5 aceto ita temperato, vt paulo acidi-
us sit, quàm vt ipsum bibere quis pos-
sit, macerantur, feruentque, deinde
marsupio iniecta adhibentur. Nec se-
cus de fursure quoque sentiendum ē.
6 Arida autem fomenta ex fale, miliō-
que frictō rectissime in laneis marsu-
piis apponuntur. etenim milium &
7 leue est, & iucundum. Sane dolores
ad iugulum vsque extensos, huiusmo-
di fomentum discutit. Sectio autem,
8 nisi iugulum quoque dolor compre-
hendat, haud æqualem in doloris di-
scussione obtinet facultatem. Vbi fo-
9 mentis dolor sedatus non est, nō diu-
tius calorificis vtēdum est, ne vel pul-
monem exiccent, vel suppurationem
excitent. ¶ Quum ergo ad iugulum
10 dolor extēditur, aut grauitas vel bra-
chium, vel mammillam, aut partes
quæ supra transuersum septum sunt,
infestat interna cubiti vena secanda

est. Neque dubites copiosum detra-
 here sanguinem, donec vel rubicun-
 dior multo, vel pro puro, rubidoque,
 liuidus effluxerit. vtrūque enim acci-
 dere solet. At si eas ptes q̄ sub trāsuer-
 so septo sunt, dolor afficit, sed ad iu-
 gulū nō ascēdit, tū vel nigro veratro,
 vel peplio alius ducēda ē miscere ve-
 ro oportet veratro vel daucū, vel sese-
 li, vel cuminum, vel anisum, vel aliud
 quidpiā odoris iucūdi. Peplio vero la-
 ser, id est silphii succū, quāquā & hęc
 ipsa simul mixta, haud absimiles vi-
 res obtinent. Cæterum vt hęc ambo 11
 quæ diximus, ita plura quoque alia
 quæ alui ducendæ vim habent, dolo-
 rem mitigant. sed omnium quæ ego
 nouerim hęc longe optima sunt. Nā
 & in his quæ sorbitionibus mixta vē-
 trē soluūt, nō nihil p̄sidii ē, nisi vel ob
 amarorē, v̄l aspitatē, aut mltitudinē,
 aut colorē, aut suspicionem aliquam,
 omnino fuerint ingrata. Quum me- 12
 dicamentum aliquis ebibit, mox
 ptisana sorbitioni danda est, non mi-
 nori pene quantitate q̄ consuevit, ni- 13
 si consuetudo rationi aduersetur. In

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

media vero purgatione sorbendum non est, sed vbi ad purgationis finem deuentum est, sorbitio detur, minor tamen q̄ pro consuetudine. Tandem leuato dolore, nisi aliud quidpiā obstiterit, liberalius exhibeatur. ¶ Idem
14 dixisse velim, quum ptisanæ cremor
15 in vsum venerit. Equidem satius esse puto, vt protinus ab initio sorbitio-
nem dare incipias, quā tertio, quar-
to, quinto, aut septimo die: quum vi-
delicet venę conciderunt, nisi sub hoc
spacio morbus fuerit iudicatus. ¶ At
16 que hos similiter, vt superiores, præ-
17 parare oportet. De sorbitionis exhi-
bitione, hec ferē sunt quę dicere decre-
ueram. Ac de potione quoque (qualis-
cunq; ex his, quas post hac declarabi-
mus, sumatur) eadem ratio est.

DE CONSVETVDI.

nis mutatione.

18 **S**ed nō ignoto omnes fere medi-
cos á debita obseruatione, quā
grauissime aberrare, quippe q̄
ab initio duos, aut tres, aut etiā
plures dies, fame cruciāt egros deinde
& sorbitiones

& sorbitiones, & potiones exhibent,
quodd videlicet operæprccium ipsis vi
detur, magnæ corporis mutationi
quidpiam qd valde sit magnū obii
cere. Equidem mutationem laudo, si
modica fuerit, recta enim debet esse
mutationis translatio. Maxime vero
in ciborum exhibitione mutationis
consideratio habenda est. Porro gra
uissime læduntur ii, qui tota vtuntur
ptisana, si mutationi peccatum acce
dat. ac læduntur quoque qui succum
duntaxat assument. Deinde noxa af
ficiuntur, qui solam potionem acci
piunt, sed minus quàm superiores.
Cæterum vt rectam victus rationem
instituiamus, salubria præcepta quæ
per bonam valetudinem obseruan
da sunt perpendere oportet. Quum
enim non parum intersit, hæne, an
illa victus ratione sani vtantur: cum
in aliis quibusdam, tum præcipue in
mutationibus: quomō fieri potest,
quo minus magna sit in morbis va
rietas, idq; maxime in acutis. Quodd
autem vitiosam victus rationē, quæ
nunquam variat, longe tutius sit ob

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- seruare, quàm subito vel ad meliorē
transire, facile intelligitur. Quippe si
ue bis, siue semel dūtaxat in die, quis
cibum accipere solitus est, si subito cō
suetudinem mutauerit, noxam, im
becillitatemque subibit. Etenim prā
22 dium assumens, qui id non consuevit
protinus imbecillus, grauis, agrotus
segnisque redditur. Quòd si præterea
cœnauerit, ructus acidus, & alui leui
tas subsequitur. grauatur enim subi
insueto onere ventriculus. qui antea
aridus esse, ac neque bis intumescere,
neque toties cibum coquere solebat.
23 Proinde iuuandi sunt tales compen
sata mutatione. siquidē dormire eos
oportet, tanquā noctem à cœna du
cerent, ac hyeme quidem frigus, esta
te vero calorem vitare. Si somnus nō
accedit, lento, frequentique incessu
ambulare, ac neque stare, neque cœ
nare debēt, nisi forte per exigua que
dam eāque minime noxia sumant.
minus bibere, idque meracius & ne
quaquam dilutum. ¶ Maiori tamen
24 molestia afficietur is: qui ter eadem
die ad satietatem vsque cibum inies,

ferit, ac multo magis si crebrius etiā
num assumpserit. Quāquā sunt non
nulli quibus nihil molestiæ affert, ter
in die cibo repleti, præsertim si ita
educari consueuerint. Quibus cōsue-
tudo fuerit bis die cibum assumere, ii
nisi pransi fuerint, imbecilli, egrotiq;
ac ignavi redduntur, dolore præcor-
dia torquentur, veluti suspensis visce-
ribus, vrina calida pallidāque reddi-
tur, & alui sedimina aduruntur, os a-
marore afficit, oculi cauantur, tem-
pora mouentur, extremæ partes fri-
gescunt. ¶ Sunt plerique qui omisso
prandio cœnare nequeunt. quòd si tū
cœnauerint, ventris grauitate mole-
stantur, ac per somnum multo ma-
gis vexantur, quàm si pransi fuissent.
Quā igitur eos, qui bona adhuc vale-
tudine degūt huiuscemodi ifestēt ac-
cidentia, si p̄ diei dūtaxat medietatē,
rō victus à cōsuetudinē mutetur, cōstat
vt neq; addi qcquā, neq; minui vtilr
possit. Igitur q̄ p̄ter cōsuetudinē semel
dūtaxat cibū accepit, deīde ex īanitis
toto die venis, q̄ tū solebat cœnauerit,
si quū à prādio abstinuit, & doluit, &

25

26

27

k ii

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

- agrotauit, assumpta autem cæna gra-
uis effectus est: par est eum multo ma-
gis grauari. Cui vero ex longiori spa-
cio venę conciderunt, si repente cœna
uerit, multo grauius afficietur. ¶ Re-
ficiuntur autem hi quibus præter cō-
suetudinem venę exinanitæ sunt, si
eodem die à frigore, calore, & fatiga-
tione tuti seruentur, quippe quod oīa
hæc ægre tolerari solent. deinde cœ-
na multo leuior, quàm pro consuetu-
dine, instituenda est: eaque nō aridā
esse sed humiditatis modum seruare
oportet. Vinum haud quaquam dilu-
tum potare, neque minus quàm cibo-
rum ratio desiderat. postero die exi-
guum cibum in prandio sumere, vt
paulatim ad consuetudinem fiat redi-
tus. ¶ Huiuscemodi vero noxas gra-
uissime ferunt ii, quibus superiores
partes amara bili redundāt. Quibus
vero in superioribus pituita contine-
tur, ii in ediam præter consuetudinē
magna ex parte facile tolerant. quo
fit vt minus quoque lædantur, si præ-
ter consuetudinem semel dūtaxat in
die cibo reficiantur. ¶ Præterea effi-

cax argumentum vel ex eo deprehēditur, quòd maxime in nobis mutationes, tum naturæ, tum habitus, potissimum morbos pariunt. Quamobrem neque venas importune exinani re, neque vigentibus, feruentibusque morbis aliquid ingerere, neque etiā per totum morbi decursum, vel ad hoc, vel ad illud quicquam permutare conuenit. ¶ Multa iis consentanea de ventriculo dixeris. vt pote qui cibos vel malos, ac potiones quoque (si ipsis vti cōsueuerit) facile sustinet. Cōtrā grauitèr ferre solet, tum cibos, tū potiones, quamuis suapte natura vitio careant, si præter consuetudinem ingerantur. Quo minus mirandū est, si maiore dolore afficitur illorū ventriculus, qui præter consuetudinē multas carnes, aut alia, aut laserpitium, aut laser, aut eius caulem, aut reliqua id genus vehementes vires obtinentia, edunt. Nec vlla admiratione capieris, si didiceris, mazam præter cōsuetudinem ingestam, tumultum, tumorem, flatum, tormināque excitare, præsertim vbi quis mazam edere

DE R A T. V I C. I N M O R. A C.

non consuevit. Et quòd calidus panis
 sitim, subitamque plenitudinem præ
 bet: quippe qui ariditatem inducit,
 tardeq; descendit. Item quòd panes,
 seu admodum puri, seu cibarii, repu
 gnante consuetudine ingesti, diffe
 rentes inter se affectus committunt.
 Similiter maza siue arida, siue humi
 da, siue viscosa sit. Ad hæc qualiter re
 centes polentæ, præter cōsuetudinem
 illas comedentem, afficiunt. Sic vini
 quoque & aquæ præter consuetudi
 nē potatio, subita in diuersum vsum
 facta permutatione. Præterea vinum
 quoque assatim epotum, siue dilutum
 est, siue meracum. hoc enim venas im
 plet & capitis grauitatem, sitimque
 excitat. illud superiores ventriculi par
 tes laxat, inferiores flatibus cruciat.
 Idem ex vino, tum albo, tum nigro
 44 accidet, vbi subita fuerit à consuetu
 dine mutatio. quāuis enim vinosum
 fuerit vtrunq; , magno tamen discri
 mine, corporis respectu, alterum ab
 altero dieffrt, vt nihil mirum sit, si dul
 45 ce, idemq; vinosum vinum, vbi subi
 ta fuerit mutatio non idem efficere

videatur. ¶ Cæterum hanc senten- 36
tiam, contraria quoque ratione ful-
cire oportet. siquidem in iis ratio vi- 37
ctus permutata est, corpore non per-
mutato, vt neque ob auctum robur
cibos addere, neque ob infirmita-
tem eos minuere oporteret. In singu-
lis itaq; perpende & vim & speciem 38
morbi, atque hominis naturam, ac
ægotantis in victus ratione consue-
tudinem, non solum in cibis, verum
etiam potionibus. ¶ Sed perquã mo- 39
dice, additioni studendum est, abla-
tioni vero in totum intendere, sæpe
numero prodest, modo sufficere pos- 40
sit infirmus, donec per vigorem mor-
bus maturus fuerit. Id vbi faciendum 41
sit post hac perstringemus. Cæterum 44
quamuis multa iam dictis consenta-
nea scribi possent, tamen res de qua
plurimum habui sermonem, effica-
cius testimonium nō desyderat, quip-
pe quæ cōmodissimum contemplāti
præbet aditum. Incipientibus igitur
acutis morbis, accidit interdum vt la-
borātium alii eodem quo incoeperūt
die cibos ingerāt, alii postero die, alii 43

DE RAT. VIC. IN MOR. A. C.

quicquid forte fortuna nacti sunt for
beant, alii cyceonem, id est cinum
bibant. Quorū error etsi grauior est,
quā si diuersa victus ratione vfi fuif
sent, tamen longe minus læditur is,
qui hac occasione peccauerit, quā si
duobus, tribus ve primis diebus, ve
nas pœnitus concidere sinens, mox
quarto quinto ve die huiusmodi vi
ctus rationem aggrediatur. Sed lon
ge grauissimum est, si omnibus iis die
bus venas exinaniri permittat: de
inde posterioribus diebus, prius ta
men quam morbus maturetur ad hu
iusmodi victus rationem se cōuertat.
Siquidem plurimi hoc pacto, mortis
periculum subeūt, nisi salubris admo
dum fuerit morbus. Errores autē ab
initio protinus commissi, non ita dif
ficulter corriguntur, sed faciliore cer
te admittunt medelaīm. Hoc documē
44 to nullum aliud puto salubrius. pri
mis enim diebus nullum sorbitionis
genus subtrahendū est his, qui paulo
post vti sorbitione cogantur. Etenim
45 qui hordeacea ptisana vtuntur, peni
tus nesciunt ipsam noxiam esse, si tri

bus, quatuor, pluribus ve diebus exinanitis iam venis sorbere incoeperint. Neque etiam cremorem eius dūtaxat accipientes, quum non recte sorbere incoeperint, noxam sibi inferri intelligunt. sed tum primum & cauent, & periculi magnitudinem agnoscunt, quum ante morbi maturationē, quis ordeaceam ptisanam sumit, qui cremore eius vti solebat. Vnde manifestissime colligitur, medicos non recte agrotis victus rationem præscribere. quippe qui in morbis, non venarum exinanitione, sed sorbitione egentibus venas concidere permittunt. Contrà vbi à venarū exinanitione ad sorbitiones transire periculosum est, ipsi confestim transmutando plarumque peccant. Ac nōnunquam a venarum inanitione, ad sorbitiones eo tempore transeunt, quo satius esset (ita exigente morbi irritatione) a sorbitionibus ad venarum exinanitionem transire. Quapropter quibusdam ex capite ac pectore cruda bilis attrahitur, quibus vigilia quoque morbi maturationem impediens accedit, mæsti-

46

47

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

tia, amaritudineque infestantur, delirant, ac splendentia quædam ipsorum oculis obiiciuntur, aures sibilo implentur, extremæ membrorū partes infrigidantur, urinæ redduntur incoctæ, sputa tenuia, salsa, colore synchero, exigua, sudores a ceruice profluunt, anxietate vexantur, spiritus errat, quippe quum sursum fertur aut frequens est, aut valde magnus, supercilia grauantur, animi defectio vrget, eaque mala, vestes a pectore piiciunt, manus tremore afficiuntur, imum labrum nōnunquam concutitur. ¶ Hec si ab initio apparuerint delirium, & quidem multum ac vehemens denunciant, atq; æger magna ex parte moritur. Quòd si mortem effugerit, aut abscessu, aut sanguinis fluore è naribus, aut crassi puris sputo liberatur, nec aliter euadere poterit. Neque video medicos harum rerum experientia ita exercitados, vt imbecillitates in morbis discernant, siue ob venarum inanitionem, siue ob aliam quædam irritationem (vt vel dolorem, vel morbi vehementiam) eueniant.

Neque eas affectionum species digno-
 scunt quas vel natura nostra, vel ha-
 bitus, singulis efficere solet, quanquā
 ab iis, vel salus (si cognoscantur) vel
 mors (si propter imperitiam lateant)
 expectanda est. Sane ut grauissimum
 peccatum censetur, si vel ob labo-
 rem, vel morbi vehementiam im-
 becillo, aliquis vel potionem, vel sor-
 bitionem, aut cibum exhibeat, exi-
 stimans eum a venarum exinanitio-
 ne factum debiliorem, ita impuden-
 tissimum est, eum quem venarum exi-
 nanitio reddidit imbecilliolem, non
 cognoscere, & abstinentia torque-
 re, quanquam ne hoc quidem pecca-
 tum periculo vacat. tamen ut supe-
 riore leuius est, ita magis deriden-
 dum. Si enim alius quispiam siue me-
 dicus, siue plebeius, accesserit, nota-
 ueritque accidentia, deinde contra
 prioris medici institutum, cibum, po-
 tionemq; exhibeat, plane cōstat hūc
 non nihil auxilii attulisse: pinde prio-
 ris artificis institutum grauissimam
 subit calūniam. videturq; superueniēs
 vel medicus vel plebeius veluti mor-

DE RAT. VICIN MOR. AC.

25 tuum resuscitasse. Nos de hac re notas
quasdam scribemus, quibus singula
discernantur. atq; hæc quæ iam pro-
posui, similia fere sunt accidentibus,
quæ ventriculum nonnunquam infe-
stant. Etenim si vniuersum corpus præ-
ter consuetudinem diu quieuerit, non
protinus robustius euadit. Quòd si lō-
giori quoq; spacio torpuerit, deinde
protinus labores aggrediatur, id qd
effecerit, vile erit. Similiter de reliquis
quoq; corporis partibus sentiendum
est. Neque enim pedes, neque aliæ cor-
poris partes, recte sua munera perfi-
cient, disuetudine laborem interci-
piente, si aliquando subito laborare
tentauerint. Similiter & dētes & ocu-
li & cæteræ quoq; partes afficientur.
Nam & cubile præter consuetudinē,
aut molle, aut durum molestum est.
quāquam quod sub diuo præter con-
suetudinem stratum est, corpus indu-
rat. Porrò horum omnium satis fue-
rit exēpla quædam perstringere. Esto
sane quod tibia cuiuspiam vlcere nō
omnino salubri laboret quòd neque
perdifficilem, neque facilem omnino

curacionem
tinus die,
initia, sic
eleuet, in
afficiantur
dini rebu
dum erote
die pinto
fuerent, &
doloit, qu
curatioe p
tam que
tur dolo
tos dies
tus. Itaq;
licer coll
nis lubri
lent, nox
tem graui
vehement
tinus, im
Sic reliqu
ta quiete,
res deduc
vbi ex ph
nauition
etiamnu

curationem admittat. Si prima protinus die, inter curationis videlicet initia, sic iaceat, vt nequaquam crus eleuet, inflammatione haudquaquam afficietur, multoque citius bonæ valetudini restituetur, quàm si inter curandum errorem committat. quòd si à die quinto, aut sexto, vel serius etiam surrexerit, & incedere conetur, magis dolebit, quam si protinus ab initio incuratiõe peccasset, si vero subito multumque fatigetur, grauiori cruciabitur dolore, quam si per iam propositos dies inter curandum fuisset fatigatus. Itaque ex his omnibus perfectum licet colligere testimonium, quòd omnis subita mutatio, si modum exceserit, noxam inducit. Venter autem grauius læditur si ei postea quàm vehementer conciderunt venæ, protinus imodice quidpiam ingeratur. Sic reliquum quoque corpus si ex multa quiete, subito ad vehementes labores deducitur. magis lædetur, quam ubi ex pleniori cibo ad venarum exanitionem transmutatur. Illorum etiamnum corpora torpere necesse

56

57

DE R A T. VIC. IN M O R. A C.

est, qui ex multa fatigatione, repente ad ignauiam secordiamque sese conuertunt. Proinde ventriculos ipsorum, haud ita multo cibo exercere oportet: alioqui & dolore & grauitate totum corpus vexabitur. Cæterum de immutatione vel ad hæc vel ad illa, longius fuit nobis sermo, quod huiusmodi notitia, ad omne fere negocium utilis est, præsertim ad hoc nostrum propositum, quæ scilicet in acutis morbis a venarum exinanitione ad sorbitionem trãseuntes, pmutatione a nostris præceptis aberrare nõ permittant. Etenim non est exhibenda sorbitio donec maturus videatur morbus, aut aliud signum, vel circa intestina, vt vacuatio aut irritatio, vel circa præcordia apparuerit. Vehemens vigilia, vt cruditatem incoctionẽque, tum ciborum tum potionis efficit, sic in diuersam partem transmutatio, corpus resoluit, & velut decoctum reddit, capitisq; grauitatem inducit.

LIB. III.
LIBER TERTIVS.

80

DE VINO.



Gitur vinum dulce,
& vinosum, & albū,
& nigrum, atq; aquā
mulsam, & aquā, &
oxymel, quātum ad
acutos morbos per-
tinet, his fere notis distinguere oportet. Dulce quidem vinum, non adeò, vt vinosum, capiti grauitatē affert, & minus tentat metem, nec vllū aliud tam facile p̄ intestina descendit. sed iecur, & lienē in tumorē attollit: ac ne his quidē vtile est, in quibus amara bilis exuperat. Nā & sitim excitat, & superiorem intestinorū partem inflat. inferiori vero intestino (q̄ ad flatum rationē attinet) non adeò infestū est. Sane flatus, quē dulce vinum excitauit, non facile pertineat, sed in p̄cordiis diu, commoratur. Vrinā oīno minus hoc, quā album vinosumq; ciere potest. At nullum aliud efficacius promouet sputum, nisi quum sitim induxerit, tum enim minus quā cetera spu-

DE R A T.V.C.IN M O R.A C.

tum euocat.vbi vero nō excitat sitim,
omni alio efficacius fcreatum iuuat.

- 8 Vini albi vinosi, tum laudes tum vitu
perationes, in dulcis vini enarratione
magna ex parte continentur. ipsum
enim omni alio facilius ad vesicā trā
sit, vrinam ciet, magnāq; semper au
xilium in his morbis afferre solet. quā
uis enim (quod ad reliquos vsus perti
net) ab alio vino superetur, quia tamē
per vesicā purgat, magnifice liberat,
si exhibeatur vt oportet. Has igitur
de vini tum vsu, tum noxa coniectu
ras (licet perpulchræ sint) maiores no
9 stri ignorauerunt. Fuluum vinum, &
nigrum austerum, eundem vsu ha
bere censerē in acutis morbis, nisi ca
pitis grauitatem inducerent, & men
tem attingerent, atque sputi vrinxq;
exitum impedirent. Cæterum a vino
albo aliisq; id genus non maxime ab
stinendum est, quum alui excremēta
10 & mollia, & ramentosa fuerint. Id ve
ro neminem latere debet, q; superio
res & inferiores corporis partes, vt mi
nus lædit vinum, dilutū, ita meracius
intestinis magis auxiliatur.

DE AQVA

LIB. III. 81
DE AQVA MVLŒA.

Aqua mulŒa per totum mor-
bi acuti decurŒum epota, his
qui amara bile abundant,
& quibus tumida Œunt viŒce-
ra, minus conuenit. quamquam ipsis
non adeo, vt vinum dulce, Œitim ex-
citāt : pulmonem autem lenit, Œpu-
tum mediocriter educit, tuŒŒientibus
prodeŒt, quippe quæ abŒtergendi fa-
cultatē obtinet, Œed plus viŒcoŒitatis
quā oportunū Œit, Œputo inducit. Ciet
vrinā efficaciter, niŒi viŒcerū aliquod
obŒtiterit. alui bilioŒa excremēta edu-
cit, quæ interdum vicioŒa Œunt, inter-
dum magis quā oportet & exupe-
rant & Œpumāt. Id vero bilioŒis ma-
xime accidit, & his quibus intume-
Œcunt viŒcera. ¶ Aqua mulŒa quo Œue-
rit dilutior, eo efficaciorē euocandi
Œputi vim obtinet, atq; pulmonem
reddit leniorē. Quæ vero minus dilu-
ta eŒt, alui Œpumofa excrementa, &
Œupra modum bilioŒa, & calidiora
magis quā dilutior ducit. quāuis
alias præterea noxas inferant huius-
modi excremēta. Neq; enim præcor-

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- diorum ardorem extinguunt, sed, excitant, efficiuntq; vt difficult er morbum sustineat ager, & membra hinc inde deiiciat. intestina etiam, & anū
- 17** vlcera. Quibus vero auxiliis ea curare oporteat, postea explicabimus.
- 18** igitur si in huiusmodi morbis, quis aqua mulsa, pro alia potione, post habitis sorbitionibus vtatur, is vt multa felicissime conuequatur, ita ferre nunquā sua spe frustrabitur. Ergo quibus danda vel inhibenda sit, vel quas ob causas ab ea temperandum sit, magna ex parte iam dictum est. Sed damnauerunt nonnulli aquam
- 19** mulsam, q; bibentium vires frangat, maturamq; mortem citet. Cui errori occasionem dederunt hi, qui mortē sibi fame consciuerunt. Sunt enim nonnulli qui aqua mulsa perinde ac si huiusmodi quandam vim habeat, vtuntur. sed id perpetuum non est.
- 20** quippe per se potui data (nisi ventrē,
- 21** turbauerit) aqua longe valētior est.
- 22** Quinetiam vino albo, tenui, imbecillo, non odoro, interdū valentior interdum imbecilior deprehenditur.

Etenim vini, mellisq; puri, si vtriusq;
 vim cōsideraueris, magna est diffe-
 rétia. Nā si duplo plus vini puri quis-
 quam biberit, q̄ linxerit mellis, longe
 plus viriū à melle, modo ventrē non
 turbauerit, cōsequetur, vel hoc argu-
 mento, q̄ plus subinde stercoreis dei-
 ci et. ¶ Aqua multa à ptisanæ sorbi- 24
 tione epota, vehementer replet, &
 inflat, visceraq; in precordiis lædit.
 Ante sorbitionē autē assumpta non
 solū nō adeo ledit, verū etiā interdū
 magnifice prodest. Coctū mel, aspi- 25
 cientibus quidē longe p̄stantius cru-
 do videtur. est enim splēdidū, tenue,
 candidū, & perspicuum. sed quibus
 ab eo viribus differat equidem non
 intello. Neque enim (si bonum fue-
 rit) crudo suauius est, & minus ab eo
 stercoreis descendit, quanquam neu-
 tro horum ad aquæ mulsæ proba-
 tionem indigemus. Aliquando tamē
 cocto melle vtendum maxime si vi-
 tiosum, impurum, nigrum, & haud
 iucundioris mel fuerit. si quidem plu-
 rima huiusmodi turpitudinis vitia
 coctio tollit.

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

DE OXYMELLE.

26 **P**otionem ex oxymelle voca-
to, sæpenumero vtilem inue-
nies in his morbis : siquidem
27 sputum educit, spiritumq; red-
28 dit faciliorem. Atq; hæ sunt eius oc-
casiones. Quod si vehementer fuerit
acidum, modum in sputis quæ non
facile redduntur non seruabit. Etenim
si retenta educeret, gutturq; ipsum le-
ue & lubricum redderet, pulmonem
haud mediocriter iuuaret vtpote qd
molliendi vim obtineret: quæ si cõ-
tingerët, inter maxima nimirũ esset
auxilia numerandum. sed euenit in-
terdum (quum vsque adeo acutũ fue-
rit) vt non solum non possit sputum
educere, verũetiam viscosius ipsum
efficiat atq; submergat. Sane illi po-
29 tissimum sic afficiuntur, qui alioquĩ
pernicioso morbo laborantes, neq;
tusses, neq; ea quæ intus continentur
screare possunt. His itaq; sic se habẽ-
30 tibus, ægri vires perpendere, & si ad-
huc in spe fuerit, tũ dare ipsum oportet.
quũ vero dare decreueris, vt per
quã tepidum sit studendũ est, ac neq;

affatim, sed paulatim exhibendum
 est. Vbi vero non adeo fuerit acidū,
 os & fauces humectat, sputū euocat,
 sitim compescit, præcordiis, visceri-
 bus, ceterisq; id genus partibus ami-
 cum est. Etenim mellis (quas prædi-
 ximus) noxas prohibet. quippe quod
 in melle biliosum est, ita reprimatur.
 flatus præterea illud quidem discutit,
 & vrinam ciet. sed intestini partem
 imam laxat, & ramenta elicit. Atqui
 in acutis morbis inutiliter nonnunq;
 exhibetur. præcipue vero quia non
 solum flatum cohibet, verum rursus
 ipsum reuerti cogit, vires frangit, &
 membrorum extremas partes infri-
 gdat. Atq; hæ sunt (quas equidem 36
 nouerim) aceti mulsi noxæ, haud in-
 dignæ quæ literis prodantur. Huius
 quidem potionis paulum noctu, ac 37
 ieiuno, ante videlicet sorbitionem
 recte propinatur. quamquam nihil
 prohibet ipsam a sorbitione quoq;
 bibere, modo longum interueniat
 spacium. Porro qui in victus ratione 38
 sola potione, posthabitis sorbitioni-
 bus, vtuntur, iis ipsum non semper

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- exhibere conuenit, vel ob hanc maxime causam, q̄ intestina abradit, & exasperat, vtpote tum nihil stercoreis continentia, & quidē vacuis iam venis, atq; fractis ab aqua mulsa viribus .
- 39 Quod si per vniuersum morbi decursum, ab hac portione, eaq; multa, præsidium aliquod expectaueris, paulū aceti infunde, tm̄ videlicet vt gustanti, dūtaxat sensum moueat. sic enim citra noxā, debita auxilia præstabit. Cæterū acuta vis aceti (vt summatim dicā) his magis quibus amara, quā quibus atra bilis exuperat, conferre solet. quippe amara ab ipso dissoluuntur, & agitantur, ac in pituitam degenerant. Atra vero bilis in massam attollitur, & multiplicatur.
- 41 Nam acetum atram bilem parit. Mulieribus autem longe magis quā viridis aduersatur, vtpote q̄ vterū dolore cruciat.

DE A Q V A.

- 42 **A** Qua in acutis morbis potui datur, nec aliud ab ea præsidium petēdum censeo. Neq; enim in peripneumonia tussim sedat. nec est

alia potio, quæ minus sputum producat, si crebro quis eam biberit. Sane si inter oxymel & aquam mulsam, aqua modice bibatur sputum euocat, siquidem potionum qualitatem, facta inundatione transmutat, alioqui neque sitim sedat, sed amarescit bilem etiam parit in his qui suapte natura biliosi sunt. præcordiis infesta est. Quum vero vacuo etiam dum ventriculo ingeritur, ut longe pessima, & summe biliosa redditur, ita vires maxime prostermit. Lienem & iecur (ubi inflammatio infestat) attollit, fluctuat, supernatat, tarde transmittitur, utpote frigida, & cocta difficilis, non ducit aluum, nec ciet urinam, atque ex eo quoque viciosa est, quæ stercoris suapte natura expers est. Quod si refrigeratis aliquando pedibus quis eam, biberit, ex iam propositis noxis omnibus illa multo grauius ipsum afficiet ad quam fuerit perniciosa. Vbi vero in huiusmodi morbis timueris, ne vel caput vehementer grauetur, vel mens tetetur: tum vel aquam, vel vinum aquosum, & album, & haudquaquam odorum exhibere oportet: deinde pau

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

lum aquæ superbibere. Sic enim vi-
ni potentia non tam facile caput &
mentem attinget. Sed in quibus a-
44 fectibus, aqua potui dāda sit, & quā-
do plurima, & quando modica, ac
vbi frigida, & vbi calida, partim iā
diximus, partim vero suo loco dice-
45 mus. Ceterum de potionibus quæ
fiunt ex hordeo, herbis, vua, veleius
corticibus, tritico, cneco, myrris, ma-
lo punico, vel ex aliis quoq; rebus,
quando ipsis vti conueniat, seorsum
à singulis morbis dicemus, ad quem
locum composita quoq; medicamē-
ta seruamus.

DE BALNEIS.

46 **L** Auacri vsus in plerisq; mor-
bis confert, idque in aliis qui-
dem morbis perpetuum est,
in aliis minime. Sed raro vtū-
tur eo homines, q̃ ipsum præparare
nesciunt. quippe in paucis admodū
domibus, vel instrumenta vel mini-
stri apti inueniuntur. & nisi exacta
cura inter lauādū adhibeatur, haud
mediocre proueniet à lauacro ma-
lum. Etenim tegmine indiget æger

cui fumus non accedat: itē aquæ abū-
 dantia, & crebra lotionē, sed quæ nō
 sit impetuosa, nisi res ipsa ita exigere
 videatur. Ac neq; abstergere eū oportet. 47
 q̄ si absterfionis vsus aliquando
 inciderit, calorifico aliquo, eodemq;
 multiplici smegmate, pro ipsius cō-
 suetudine, vtendum est. Perfundere
 vero celeriter multam aquam oportet. 48
 Via ad solium brevis sit, vt & ac-
 cessum, & exitum faciliore prebeat.
 Is vero qui eluitur decentem compo- 49
 situmq; gerat corporis habitum, atq;
 50
 taceat, ac ne ipse quidem quicquam
 faciat, sed alii perfundant & abster-
 gant. deinde temperaturas multas
 51
 pparent, & celeriter pfusiones ipsas
 52
 expediant. Spongia pro strigili vtā- 53
 tur, vehementer exiccatum non vn-
 gant. Caput adhibita spongia ter- 54
 gendum, & quantum maxime fieri
 potest, siccandum est. Extremæ mē- 55
 brorum partes, & caput, ac reliquum 56
 quoq; corpus, a frigoris iniuria tueri
 debet. Neq; lauacro committendus 57
 est is, qui nuper vel sorbitionem vel 58
 potionē sumpsit. ac ne lauacro qui

DE RAT. VIC. IN MOR. ACV.

dem ilico vel sorbere, vel bibere con-
59 uenit. Magnopere tamen laboranti
indulgendum est, si quū bona adhuc
esset valetudine, vel amauit lauacrū,
vel elui consuevit. Quippe qui maio-
re lauacri desyderio tenentur, ii ma-
ius inde præsidium ferunt, adeo q̄ le-
duntur quoq̄, nisi lauentur. ¶ Peri-
60 pneumoniae magis quā ardoribus
auxiliatur lauacrum. namq̄ lateris,
pectoris, & dorsi dolorem mitigat,
sputum maturat, & educit. spiritum
facilem reddit, fatigationē lenit, ar-
ticulos, & ambientem cutem emol-
lit, vrinam ciet, capitis grauitatem
soluit, nares humectat. Tanta ex la-
uacro proueniunt commoda, quibus
nimirum omnibus indigemus. Qd̄
si in apparatu, vel in re vnica vel plu-
ribus quoq̄, tantum abest vt prosit,
vt etiam noceat, peccatum inciderit
(nam quicquid a ministris improbe
præparatum est, id citra noxam esse
non potest) qui per morbos citatio-
61 res sunt aluo quā fuerit oportunū,
aut quibus supra modum aluus astri-
cta, non ducitur, ii lauacro communi

non debent. ac neque ii, quibus imbecillæ sunt vires, aut qui fastidio, aut vomitione affecti sunt, aut qui biliosa ructant, aut quibus sanguis è naribus profluit nisi minus, quam occasio expetit effluat. Nec ignorare debes occasiones. Etenim si occasionis respectu, exiguus est fluor, abluendus est æger, siue vniuersum corpus, siue caput dūtaxat, ita iuuari videatur. Igitur si singula cōmode parata sunt si æger citra noxam lauacrum subire potest, quotidie lauādus est. Quòd si præterea lauacro delectatur, eum si bis quoq; laueris, non lædes. Santius vero est eos lauacro vti, qui integrā ptisanam, q̄ qui solum cremorē eius assumunt, & si his quoq; nōnunquam vsui est. Qui vero potu dūtaxat vtūtur, minime lauacrum subeant: quāquā horum nōnulli ab ipso arcendi interdum non sunt. Coniicere itaque oportet ex his quæ supra demonstraui quibus lauacrum, & in quo vitus genere, auxiliari possit necne, si enim quidpiā eorū, q̄ ad lauacri bonitātē pertinent, deest, quāuis nōnihil

62

63

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.V.

præsidii à lauacro speraueris, lauari
tamen non oportet. Quòd si nihil
horum deest, videaturq; ex notis qui
busdam vsui fore, tū lauari cōuenit.

LIBER QVARTVS CONTINET

ea præcepta, quæ non Hippo-
cratis propria, sed spuria
esse creduntur.

DE ARDORE.



2 Enæ æstiuo tempore
3 exiccate, auellunt ad
sele acré, biliosamq;
saniē. Vnde & vehe-
mēs febris oritur, &
corpus fatigatiōe op-
p̄ssum laborat & do-
let. Accidit autem magna ex parte,
& ob longa itinera, & diutinam si-
tim, quum exiccatae venæ, acres, calī-
dasq; fluxiōes alliciunt. quocirca lin-
4 gua fit scabra, arida, & prænigra: ven-
ter torminibus cruciatur, alui sedimi-
na liquida sunt & pallida, vehemēs
sitis cruciat, somnus nequaquam ac-
cedit, interdum mens quoque turba-

tur. Huic & aquæ, & aquæ mulsæ co- 5
cta, quantum voluerit, potui dabis. 6
¶ Quodd si amarulentum fuerit os, tū
& vomere, & aluum eluere conue-
nit. si vero ne ab his quidem soluitur
ex asinæ cocto lacte purgato. Nihil 7
vel falsum, vel acre exhibendum est. 8
non enim descendit. Sorbitiones do-
nec morbus decretorios dies præte-
rierit, non dato. Quumq; sanguis è 9
naribus fluxerit, sudoresq; decretorii
& legitimi fuerint atque in vrina al-
ba quædam & crassa & leuia subse-
derit, aut si alicubi apparuerit absces. 10
sus soluitur affectio. Quæ si nullo ho-
rum apparente soluta fuerit, vel ite- 11
rum reuertetur, vel coxam, aut crura
dolor infestabit, & crassa quædam ex-
puet, si videlicet bonæ valetudini re-
stitui debeat.

ARDORIS ALIVD GENVS.

A Luus soluta est, vehemens sitis, 12
lingua scabra, arida, falsa, vri-
næ defectus, vigiliæ extreme mē-
brorum partes frigida. **¶** Huiusmo- 13
di ardor non finitur, nisi aut ex nari-

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

bus fluat sanguis, aut ceruici absces-
sus, aut cruribus dolor superueniat,
atq; crassa sputa quis excreet (id quod
astrieta aluo solet accidere) aut coxæ
dolor aut genitalium liuor appareat
14 aut testiculus intédatur: atq; hoc mo-
15 do solutam aluum ardor comitatur,
16 Sorbitiones attractiuas dato. In acu-
tis affectibus sanguiné detrahe, si ve-
hemens videatur morbus & ifirmus
17 ætate floreat, abundetq; viribus. Igi-
tur si angina fuerit, siue, alius quispiã
morbus vt costalis, eligmate etiam
num purgato. Quod si ob multi san-
guinis missionem, vires prostratum
iri timueris, tertio quoq; die clysterẽ
aluo iniice, donec in tuto fuerit eger
18 & fame idigeat. Inflammata præcor-
dia septum transuersum non ab in-
clusis flatibus intentum, vel ob flatuũ
quoq; præsentiam, arida suspiria, quĩ
bus pus non subierit sed vbi flatuum
clausura huiusmodi affectus fiunt, po-
tissimum vero iecoris dolores, lienis
grauitas, ac reliquæ iflāmationes, itẽ
septi trāsuerſi dolores, & morborũ
cōuersiones solui non possunt, si pro-

tinus ab initio medicamētis curatio-
 nē aggrediaris. Nā p̄cipuū in his pro-
 positū est in primis sanguinē detra-
 here. deinde clysterē exhibere, idq; si
 magnus vehemēsq; fuerit morbus. Si
 vero nō ita vehemens fuerit, medica-
 mento curatur, qđ tu te, moderatēq;
 misso prius sanguine adhibendū est.
 Qui statim īter morbi initia īflāma-
 tiones medīcamēto soluere conātur,
 ii à distēta, īflāmataq; pte nihil aufe-
 rūt. affectus vero, vtpote crudus, non
 remittitur, ac ptes sanę morbo resistē-
 tes, colliquescūt: quocirca morbus ī-
 becillū iā corpus vincēs, curationi nō
 obedit. Si repēte q̄s obmutuerit, is ve-
 narū conclusionē molestatur, id sa-
 no homini sine occasiōe, ac sine alia
 vehemēti causa acciderit, dextri bra-
 chii internam venam secare oportet,
 & pro habitus ætatisque ratione,
 sanguinem detrahē, consyderan-
 do exuperantiam atque defectum.
 Porro sic affectis, huiuscemodi quo-
 que casus eueniunt, faciei rubor ocu-
 lorum constantia, manuū incontine-
 tia, dentiū stridor, pulsus maxillarū,

19

20

21

22

DE RA.VIC.IN MOR.AC.V.

extremarum partium frigus & contractio, flatuum in venis conclusio.

- 23 ¶ Superueniente ab atra bile dolore, acrimque ruente fluxione, internæ partes mordicus dolent, venæ vellicatæ aridioresque factæ tenduntur, & inflammatae alliciunt ad sese ea quæ affluunt quam ob rem corrupto sanguine, ita ut spiritus in ipso nequeant naturales meatus pertransire, frigora ob plenitudinem eueniunt: item obtenebrationes, taciturnitas, capitis grauitas, neruorum distentiones, idque præcipue si iam vel ad cor, vel iecur vel venam peruenerit. Hinc igitur comitiales morbi, & attoniti proueniunt si incontinentes sedes inciderint fluxiones, spiritusque egredi nequeunte, arefcant.
- 24 ¶ Quapropter statim ab initio, adhibito fomento, sanguinem detrahare oportet, dum adhuc omnia infestantia, tum status, tum fluxiones suspenduntur, sic enim facilius vincuntur remediis. Deinde reficere, atque habita iudicationis ratione, nisi sursum ferantur, medicamentis purgare. Quod si alius astricta fuerit,

eta fuerit, clysterem iniice, & coctum
asinae lac exhibe, idq; plus quam sede
cies, si vires tolerare possint.

DE ANGINA.

A Ngina fit, quū hyeme aut vere, 26
multa eademque viscosa fluxio
ad iugulares venas descēderit, q̄ qui
dē, vtpote ample, plurimū ad sese spi
ritū cōuellunt. Quū itaq; fluxio quæ
frigida, viscosa quæ est, & spiritus,
& sanguinis meatus obstruxerit, quic
quid sanguinis proximum est, figit,
ipsum vero immobilem, constantemq;
efficit. quippe quæ suapte natura re
frigerandi, obstruēdique facultatem
obtinet. Proinde suffocantur egri, lin
gua liuente, rotunda, & incurua, pro
pter subditas ei venas. Præcisa enim
vua (quam nonnulli columellam vo
cant) vtrinque crassę apparent venæ,
quæ vbi impletæ sunt, linguæ (quæ ob
siccitatem rara, fistulosaq; est) innitū
tur. Hæc deīde vi coacta, ex venis hu
morem suscipit. quam ob rem latitu
do in rotunditatem, coloris venustas
in liuorem, mollities in duritiē per
in

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

mutatur, vt quę facile antea flectebatur, curuari nequeat. Itaq; celeriter iugulat, nisi protinus iuueris, sanguinē ex brachiis detrahendo, deinde venas sub lingua fecare, medicamento quod trahendi vim habeat purgare, calida gargarismata exhibere, caput radere eidemq; atq; ceruici ceratū imponere, lanis inuoluere, molli spōgia ex aqua calida expressa fouere, aquā egelidam, & aquam mulsam (sed ne hāc quidē frigidam) potui dare iusculum quoque tum exhibere oportet, quum iudicato iam morbo, in tuto fuerit ager.

ALIUD ANGINAE GENVS.

27

Q

Vum p æstatem, aut autumnum, calida fluxio á capite, destillauerit, eaq; nitri qualitātē imitetur, fueritq; (vt ab anni tempore) acris & calida: hęc quum huiusmodi fuerit, mordet, vlcerat, spiritu implet, orthopnoeam, & ariditatem vehementem inducit. Partes aut, quas visus cōsequi potest, tenues apparēt. tendines ceruicis posteriores adeo intēduntur, vt ri-

28

29

gidi videantur. vox abrūpitur, spiri-
 tus paruus est, spiratio densa violētā
 q̄. Atq; sic affectis arteria vlceratur, 30
 pulmo ardet. Namq; externū aerem
 attrahere non possunt. Itaq; nisi sua
 spē in exteriores partes huiusmodi
 affectus efferatur, grauissimum ineui-
 tabilēq; periculum cōminatur. idq; p-
 pter anni tempus, & qđ a calidis acri-
 busq; constat humoribus. ¶ Si febris 31
 aliquē inuadit, vetere nondū deiecto
 stercore, aut nuper accepto cibo, is, si
 ue lateris dolor infestet, siue nō, quie-
 ti permittendus est, donec ad imum
 ventrem cibus primum descenderit,
 ac subinde acetum mulsum in potu 32
 umat. Quum vero grauitas ad lum-
 bos vsq; descēderit, tum vel clysterē
 exhibere, vel medicamento purgare
 conuenit mox a purgatione victū in-
 stituere, atq; in primis forbitionem,
 deīde aquā mulsam. postremo cibos
 pisces videlicet elixos exhibere, & vi-
 nū dilutū idq; exiguū, atq; noctu dū
 taxat. īterdiu vero aquā mulsam di-
 lutā. Si flatus foetidi fuerit, balneū cō-
 uenit aut clyster, nisi acetum mulsum

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

epotum obstiterit, donec ad imum
ventrem defenderit. tum enim aluum
ducere, iniecto clystere nihil prohi-
33 bet. Vbi soluta aluo, ardor acciderit,
videaturq; medicamentum posse cō-
ferre, id intra tres dies exhibendum
34 non est, sed quarto. ¶ Quum à vacua-
tione sorbitiones exhibere volueris.
obserua februm accessiones, vt neq;
quum adsunt neque quum venturae
sunt, eas ingeras, sed quum iam finite
sunt, aut cōquieuerunt, & quum ma-
xime ab initio distare videntur. Cæ-
terum pedibus frigore affectis, neq;
sorbitionem, neque aliud quicquam
dato, sed maximū te præsidium attu-
lisse putato, si donec percalfacti fue-
rint expectaueris, deinde sic vtile qd-
piam exhibueris: siquidem refrigera-
ti pedes magna ex parte iam affutu-
ram febris¹ accessionem significant.
Quo tempore si cibum ingesseris,
omnia maxime errore turbabis, vt
qui non parum auxeris morbum. At
quum febris quieuerit, tum econtra-
rio pedes reliquo corpore fiunt cali-
diores. Aucta enim febris pedes ipsos

refrigerat, atque ex thorace incensa,
mittit flammam in caput. Igitur vni
uerso calore cōfertim superiores par
tes petente, euaporanteque in caput,
nihil mirum est, si pedes īfrigidātur.
quippe qui suapte natura vt carnis
expertes sunt, ita neruis abundant, ac
non parum distant ā calidis sedibus.
itaque collecto in pectore calore ipsi
refrigerantur. Sic haud absimili ratio
ne, victa, quiescētēque febre calor in
pedes descendit, atq; hoc tempore, &
caput, & pectus refrigerātur, ac tum
cibus dandus. Cuius rei causam sic ac
cipe. Nam occupante pedes frigore,
ventriculum calidum, & fastidio af
fectum, atq; præcordia intēta esse ne
cesse est. quinetiam corpus ob inter
nam turbationem iactatur, mens su
spenditur, dolores infestant, æger di
strahitur, vomere affectat, quumq; vi
tiosa quædam vomuerit, dolore affli
gitur. Ergo quum in pedes calor de
scenderit, nisi sudare videatur, emis
so prius lotio, sorbitionē dare oport
et, alioqui perniciosam. Quibus per
febres alius assidue soluta est iis vti

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

lius est pedes calfacere, ceromata adhibere, & fasciis inuoluere: nec vnq̃ committe vt reliquo corpore ipsi sint frigidiores. vbi vero calent, calorificis opus non est. sed ne infrigescant cauendum est. deinde vel aqua frigida, vel aqua mulsa, eaque perexigua, 36 potui danda est. Febricitantes non pauci, quibus alius liquida est, & mēs turbata, flocos decerpere, nares fodere, interrogati paulum respōdere, neque sua sponte quicquam aptum dicere solent. Hæc (vt opinor) ad atrabilem pertinent: quibus in hunc modum se habentibus, si ob alium solum tam homo cōsumi videtur, sorbitiones (mea quidem sententia) frigidiores, crassioresque potiones vero reprimentes, & magis vinosæ, aut astringentes exhibendæ sunt. Quibus inter febrium initia, vertigines & capitis pulsationes accidunt, fuerintque vrinae tenues, iis febris impetus apud iudicationem expectanda est. quod si tum delirant, nihil mirandum est. 38 Quibus incipiente morbo vrina crassa est, aut veluti nubeculae in ipsa su

spenduntur, eos purgare conuenit, si
 nihil aliud obstiterit. Qui vero tenu-
 es urinas ab initio mingunt, medica-
 mento purgandi non sunt, sed clyste-
 rem exhibendo, eos curare in hunc
 modum oportet. corpus quieti pmit-
 tere, mox & ungere & æqualiter co-
 ponere, aquam mulsam dilutam po-
 tui dare, ad uesperam ptisanæ cremo-
 rem sorbere, aluum ab initio clyste-
 re ducere. Sed medicamentum eis dā-
 dū non est. si enim aluum citaueris,
 nō ma turabitur urina, sed febris diu
 sine sudore permanebit, & post lon-
 gum quoque spacium finietur. Ne-
 que sorbitiones per tumultum, quā
 scilicet proxima fuerit iudicatio, da-
 re, sed donec inclinetur, & in melius
 tendat febris, eas seruare oportet.
 Omnium præterea febrium iudica-
 tiones considerandæ sunt. nam eo
 tempore (ut iam didicisti) sorbitio-
 nes sunt auferendæ. Si longæ fue-
 rint huiusmodi febres, ægri absces-
 sus habere solent, idque si aurium
 imæ ptes, ceruixque frigescat. Si vero
 nō afficiatur frigore, alia erit febrilium

m iiii

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

mutatio. nam & sanguis fluet è nari-
bus, & ventres eorum turbabuntur.
Quibus molestæ febres sunt, & præ-
cordia tenduntur & in cubili contine-
re in eodem se positu nequeunt, atq;
extremæ membrorum partes infrigi-
dantur, ii multa omnino diligentia,
& accurata obseruatione indigent.
atque sic educandi sunt, vt nihil aliud
quàm acetū mulsum eis exhibeatur.
sorbitiones nequaquā offeras, donec
morbus finiatur & maturetur vrina.
in obscuro cubiculo decumbere de-
bent, & strato perquā molli: diu eun-
dem positum tolerare, & haudquaquā
44 sese iactare, quo præsidio nullū aliud
salubrius est. deinde præcordia ex lini
semine linere, cauendo ne dum illi
nuntur, frigus horrorem citet. ipsum
vero tepidum esse debet, quātum ma-
xime potest, Coquitur autē ex aqua
45 & oleo. Quid autem futurum sit, ex
lotio conicere oportet. vt enim cras-
sum pallidūque melius est, ita peius
est id quod vel candicat vel nigrum
46 est. Varium vero lotium, diuturniorē
fore morbum significat, cuius inequa-

litatē, modo ad peius, modo ad me-
 lius conuerti necesse est. Inconstantes
 febres sinere oportet, donec in ordi- 47
 nem redigantur. deinde & victus ra-
 tionem & aptam curationem eis op-
 ponere, non neglecta naturæ contem- 48
 platione. At quia variæ sunt ægrorū 49
 facies animaduertat medicus ne vllæ
 ipsum occasiones lateant, siue ad con-
 syderationem illæ pertineant, siue ad
 numerum vel parem vel imparem re-
 referantur. Maxime vero impares 50
 dies metuēdi sunt, qui videlicet egros
 in diuersas affectiones distrahere, cō-
 sueuerunt. Obseruandus itaque pri- 51
 mus dies est quo debiliior factus est la-
 borans cōsyderando initium, ex quo
 & vnde acciderit, id enim præcipuum
 esse putatur qđ scire oporteat. Itaq;
 interrogando ipsum, hæc omnia per-
 pendere debes. In primis quidem ca-
 pitis affectionem, an dolore, grauita-
 teq; infestetur, deinde præcordia & la-
 tera: hæc quidem, nullō ne dolore cru-
 cientur, illa vero nū laborēt, aut suspē-
 dātur, aut intorqueātur, aut satietate
 grauentur, an latus doleat, an simul

DE RA. VIC. IN MOR. AC.

cum dolore, tussis, aut tormina, vel
ventris dolor infestet. Quod si horū
quidpiam acciderit, potissimum in
præcordiis, aliis solueda clysteribus
est, & aqua mulsa eaq; cocta calidāq;
potui detur. Præterea dicere oportet,
an exurgentem animus deficiat, an
spiritus facile feratur. Ad hæc alui
quoq; sedimina inspicere, an nigra
admodum colore infecta sint, an syn
cera sint, qualia scilicet sanus deice
re consueuerat. an febris tertio quoq;
die magis irritetur, qppe in his mor
bis accuratæ considerandæ sunt hu
iusmodi tertianæ afflictiones. Quin
etiam alia quædam aspicere oportet.
Nam si dies quartus, in aliquo iā di
etorum, tertio fuerit similis, scire licet
infirmū in periculo versari. Sunt præ
terea alia signa, vt nigra excrementa,
quæ mortem: si vero per omnes dies
qualia in sanitate deiciebātur, appa
reant, bonā valetudinem denūciant.
Si dum glans supponitur alius non
obedit, sed spiritus facile fertur: si
agrū, siue erectus in sede, siue in ipso
quoque cubili iaceat, animus deficit

hec siue mari siue foemine acciderint
futurum delirium expectato. Manus
etiam considerandæ sunt, quæ si tre
munt, sanguis ex naribus fluxurus est.
Deinde nares quoque aspiciantur. nam
si æqualiter per utraq; multus spiri
tus trahitur, neruorum fere distentio
superuenire solet. Id ubi acciderit, in
propinquo mortem esse testatur, quā
prædixisse perpulchrū fuerit. Si hye
mali febricula laboranti, lingua sca
bra sit, animusque deficit, quamquam
quietior febris videtur, nihilominus
tamen imperari debet inedia, ab
aqua quoque, & aqua mulsa, atque
cremore arcendus est. febribus enim
quibus hæc accedunt signa, haud
quaquam fidendum est, utpote a
quibus mortis periculum pendet.
His igitur accurata perpensio con
sideratis, in hunc modum (si pla
cet) prælagire poteris. Quum vero
terrificum quidpiam febribus super
uenerit, fuerintque ipsæ quintanæ,
& alius de repente liquida quædam
excernit, acceditque animi defectio,
& taciturnitas, & neruorum distentio,

53

54

55

56

DE RA. VIC. IN MOR. VC.

& singultus, ab his angor euenire so-
let, ac sudor circa mustacem, frōtem,
& ceruicem ab occipitio. Qui sic affe-
cti sunt, paulo post inflati moriētur.
57 Quibus per febres circa crura orta tu-
bercula, tractu temporis nō maturā-
tur, perdurante etiamnum febre, si
faucibus iampridem extenuatis sus-
focatio accesserit, neq; extincta fuerit
tubercula, iis solet sanguis ē naribus
fluere: qui si plurimus eruperit, mor-
bum soluit: si vero non ita multus, lō-
gum fore morbum significat: & quo-
minus fluxerit eo peior, & diuturnior
erit agritudo. Vbi vero cætera quidē
securissima fuerint, pedū dolores ex-
pectandi sunt. Pede itaq; sic affecto, si
assidue dolens inflammetur neq; leue-
tur dolor, paulo post ad ceruicem, iu-
gulum, humerum, pectus, articulum
(nam & in hoc tubercula expectari
debent) dolores peruenient. Quibus
extinctis, si manus vlcerantur, aut tre-
munt, neruorum distentio & deli-
rium superuenit, in superciliis pustu-
la, ruboresq; nascuntur, genā altera
ad alteram ex latere germinat, dura

inflammatio infestat. oculus vehemē
ter tumet, delirium valde intenditur.
Atqui delirii signa, noctu magis, q̄
interdiu notantur. Atq; huiusmodi
signorū plura, diebus imparibus ma
gis q̄ paribus deprehenduntur, quāq;
vtrolibet eueniant nuro, pernicioſa
censenda sunt. Hos si à principio me
dicamentis purgare decreueris, ante
diem quintam id facere oportet, si vi
delicet murmurauerint intestina, nul
lo vero percepto murmure, à medi
camentis abstinendum est. Quod si
murmurante ventre, excremēta quo
q; fuerint biliosa, exhibito scamonia
modice purga. deinde (quod ad reli
quam curationem pertinet) potiōes,
sorbitionesq; exiguae offerendae sunt,
quo melius valeat infirmus, nisi for
tasse diem decimumquartum excesserit.
Quum febricitans aliquis, die de
cimoquarto obmutuerit, is non solet
celeriter aut solui aut à morbo libera
ri. quum vero eadem die apparuerit,
longius procedit. Si febricitanti quar
to die lingua conturbata quēdam dis
ferit, & alius excernit biliosa, & liqui

58

59

60

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

- 61 da, is fere delirabit. Sed accurata ob-
seruatione consideranda sunt ea quæ
accidunt tum æstate, tum autumnò,
idque in morbis acutis. Nam si san-
guis subito destillauerit, robur, & ve-
narum inflammationem declarat,
& quòd postero die vrina tenues ap-
parebunt, quòd si tum vigeat ætas,
fueritque corpus ob exercitationes
bene corporatum, aut melancholi-
cum, aut manus ob potationem tre-
mulæ, haud absurdum fuerit, aut
delirium, aut neruorum distentione
62 præfagire. Id vero salubrius est si pa-
ribus eueniat diebus, quippe in decre-
toriis perniciosum est, nisi multus san-
guis confertim aut per nares, aut per
anum effusus, exuperantem plenitu-
dinem finiat, aut abscessum, vel dolo-
res, præcordiorum, testiculorum, aut
crurum inducat. Quibus solutis, red-
duntur sputa fluuntque vrinæ crassæ,
63 leues, candidæ. Si febrienti singultus
accidit, laser, daucum tritum ex ace-
to mulso potui detur, item galbanū
ex melle, & cuminum in eligmate.
mox ab iis ptisanæ cremorē sorbeat.

quāquam nulla salus per huiusmodi
affectum speranda est, nisi vel sudor
res decretorii, aut somni æquales su-
peruenerint, aut vrinæ crassæ, acresq;
effluxerint, aut apparuerit abscessus. 64
Ex cocalo, id est, fructu pini, & myr-
rha eligma eis exhibendum est, sed
aceti mulsi perquam exiguum. quòd
si admodum siti crucientur, aquam 65
hordei bibant.

DE PERIPNEVMONICIS

& pleuriticis.

IN peripneumonia & pleuritide 66
q̃ acuta sit febris, considerandum
est. item ambò ne latera, an vnū
duntaxat dolor infestet, an ægre spi-
ritus reddatur, an tussis cruciet, an
sputum educatur, sitque vel rufum
vel liuidum, vel tenue & spumofum
& floridum, aut si alias quasdam dif-
ferentias præter iam declaratas ha-
buerit, eas sic diducere oportet. Si do-
lor ad superiores partes extenditur
vt iugulum mammillam, brachium,
internam brachii venā secare oportet, ab eo videlicet latere qđ dolore 67

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- fuerit affectum, & pro corporis habi-
tu, & anni tempore, & ætate, & colo-
re, sanguinem detrahare, utq; copio-
sior sit purgatio, si dolor fuerit acu-
tus, ad animi defectionem ducere. Po-
stea clysterem exhibere. si vero sub
69 pectore pleuriticum dolor vehemen-
ter cruciat, venter purgandus est. atq;
inter purgandum quidem nihil, à pur-
gatione vero acetum mulsum dare con-
uenit. Porro die quarto purgandum:
sed tribus ab initio diebus clysteres
exhibere, quibus si dolor leuatus non
70 est, tum demum purgare oportet. Cau-
te tamē obseruandum est dum febris
soluatur. septimusque dies prætereat.
deinde si æger in tuto esse videtur, tum
exiguum, tenuemq; cremorem, eumq;
melle conditum in primis exhibere.
deinde si facile reducitur, & bene spi-
rat, & latera dolore vacant, paulatim
crassiore m, ac liberalius (nempe eadē
71 die bis) dare non erit alienum. ¶ Si
vero non facile liberari posse videa-
tur, tum minore portione, exigua for-
bitione, & cremore tenui utatur, idq;
semel dūtaxat, ea videlicet hora qua
melius

melius degit: hanc vero ex vrinis deprehendes. Sorbitio enim in huiusmodi morbis exhibenda non est, donec & vrinæ, & sputa maturefcere videantur. Si medicamento quis purgatus creberrime deiicit, eum parcius, ac magis tenuiter alere oportet. is enim, obstante vacuatione, neque dormire, neque concoquere, ac neque iudicationem sustinere potest, sed postquā cruditas colliquata fuerit, & quæ restiterunt abiecta, tum nihil prohibebit pleniorē ei cibum exhibere. At vero scire licet sputum tum esse maturum, quum puri simile videtur: vrina vero quum id quod residet, sicut cruum subrubrum est. Ceterum nihil prohibet ad alios quoque laterum dolores, tepida fomenta, & ceromata adhibere, atq; crura, & lumbos, calido vnguento vngere, & pinguedinem illinere: præcordiis vero ad māmillas vsq; ex lini semine cataplasma iaponere. Quū ad vigorem iā peruenit peripneumonia, nisi expurgetur, in nullo auxilio sperandū est, quidpe q̄ mala est, præ-

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

tertium si difficulter spirat æger, fuerintq; vrinæ tenues & acres, atq; sudores in capite, ceruicq; oriantur. Eiusmodi enim sudores mali sunt, ob violentis morbi estum, impetum, ac violentiam, nisi vrina multa, & crassa eruperit, & sputa matura procedât. vtrumlibet enim si sua sponte supuerit, soluendi morbi vim obtinet.

ELIGMA AD PERIPNEUMONIAM.

- 73 **C** Albanum & coccalus, id est picnearum nucleus, ex melle attico. Abrotonum ex aceto mulso. Item pleuritico piper, veratrum nigrum coquito, & in principio quum infestat iam dolor dato. Prodest etiam panace ex aceto mulso cocta, deinde percolata, & potui data. Similiter & hepaticis & renum doloribus, ac vbi alius citanda est, aut vrina, ex vino
- 74 & melle. Quæ vbi ad ventrem exhibentur, magna ipsorum quâtitas ex aqua multa diluta in potu sumatur, Sic etiam sedabis dysenteriam, ab

scellum, aliosque quosdam tumores,
nisi vel in febres vel sudores (apparē-
tibus vrinis crassis, albis, dilutis) vel
in tertianas vel varices transierit, aut
in testiculos, aut crura, aut coxam,
dolor tanq̃ ad firmam stabilemque
sedem permutetur. Si ante septimū
diem febricitanti superueniat mor-
bus regius simul cum horrore, solui-
tur febris. si vero sine horrore, atque
extra occasiones siue extra tempora
acciderit, perniciem denunciat. Lum-
borum rigores, ac ob atram bilem
factæ spirituum interceptiones detra-
cto sanguine solvuntur. Sed quum
per tendines vehementer in anterio-
rem partem retrahuntur, ac ceruix,
& facies sudauerit, vtpote vellicatis,
aridisque ob laborem tēdinibus, cau-
dæque vinculis, quæ videlicet crassio-
ra quum sint, spinam continent, vbi
maxima vincula exorta, ad pedes
vsque tendunt, ibique finiuntur. Qui
sic afficitur, si neq; febris neq; som-
nus superuenerit, sed sequatur vrina
coctionem significans, atque sudores
decretorii, is vinū creticum vinosum

75

76

77

DE RAT. VIC. IN MOR. ACV.

epotet, edat polentam coctam, cera-
to vngatur illinaturq; , crura in sca-
pha, prius calida aqua perfusa, ad pe-
des vsque inuoluat. item brachia vs-
que ad digitos. Spinam etiam & lum-
bos á ceruice incipiendo ad coxas,
mollem pellem salua subigens, vt
exteriores, quoque partes contine-
at. Relictis deinde fomentis, vter
aqua calida plenus ac lintheo tectus
adhibeatur. Aluus non admodum
soluenda est. satis enim fuerit glan-
dem supponere, vbi scilicet iam pri-
dem fuerit astricta. Quòd si nihil in-
melius proficere videatur $\tau\alpha\mu\omicron\lambda\alpha$
modi radicem tritem ex vino odora-
to, & daucum, mane ieiuno, ante fo-
menta, potui dato, idque celeriter de-
inde polentam coctam, tepidam, li-
beraliter comedat, bibatque vinum
temperatum quum voluerit, atq; sic
78 fortasse melius valebit. Sin minus,
ad presagium refugere oportet. Mor-
bi soluuntur, aut per os, aut aluum,
aut vesicam, aut aliquã aliam huius-
79 modi particulam. Sudoris vero spe-
cies omnibus communis est. Veratro

purgare oportet eos, quibus a capite
destillatio fertur. Quibus vero vel ab
scessus, vel venę ruptura, vel intempe
rantia, vel alia aliqua vehemens cau
sa, suppurationem fecit iis veratrum
haud quaquam dandum est, quippe
quod tum nihil pręsidii affert. etenim
si ob aliam forte causam, æger quid
piam passurus est, id omnino ad ve
ratrum referetur. Si vero corpus resol
uitur, aut caput dolet, aut obstructę
sunt aures, aut nares, aut sputum nō
redditur, aut genua grauitate infestā
tur, aut corpus pręter consuetudinē
intumescit: quicquid eiusmodi accide
rit, siue ob potationē, venerem, mœ
rorem, curas, siue vigilias: quodcūq;
horum causę rationem habuerit, ad
ipsum curationem dirigere oportet.
Dolores qui ab itinere proueniūt, vel
ī lateribus, aut dorso, aut lumbis, aut
coxis, ac si aliquis inter spirandū do
let, aliqua habita occasione (nam sæ
penumero lumboꝝ, coxarumq; dolo
res ex crapula, & cibis instantibus, p
uenire solent) itaq; qui huiusmodi ac
cidentibus afficiuntur, vrinā difficul

80

81

DE RA.VIC.IN MOR.AC.V.

81 ter reddunt. Horum omnium causa
est iter, ac præterea destillationum
quoq; & raucedinis. Sed quæ ob vi-
ctus rationem eueniunt, horum mul-
ta vnusquisque, vt in victu à consue-
tudine maxime aberrauit, ita aper-
tissime declarabit. Etenim qui pran-
dere non consueuerunt, si pransi fue-
rint, venter eorum intumescit, som-
nolenti redduntur & pleni. Quod si
præterea cœnauerint, venter ipsi tur-
babitur. quibus vtile fuerit à balneo
dormire, expergefactis vero circui-
tione lenta illa quidem, sed crebra, in
ambulare, deinde deiectis a lui one-
ribus, paulum vini meraci assumere.
Si vero alius non fuerit soluta, cali-
do vnguento corpus vngere debent.
mox vinum dilutum, album, aut dul-
ce (si sitiant) bibere, atque sic conquie-
scere. Reliqua vero victus ratio haud
secus, q̃ vbi crapula aliquem læsit, in-
stituenda est. Potiones, dilutæ quidē,
tarde permeant, circūducuntur, & su-
pernatant in præcordiis, nec vrinam
mouent. Qui huiusmodi potione ple-
nus est, nullum opus, quod videlicet

aliquato iam corpore, aut vi, aut ce-
 leritate aggrediendum sit celeriter p-
 ficere valet. Itaq; à cibo donec cum co-
 ctus fuerit quiescere oportet. Mera-
 ciores vero, austerioresque potiones,
 corpori cremorem, & capiti pulsatio-
 nem inducunt. Proinde si affectus su-
 per dormire debet, & calidū aliquod
 iusculum quod q̄ iucundissimum ei
 videatur sorbere. vix enim citra no-
 xam tolerat ieiunium is quem capi-
 tis dolor & crapula īfestat. Qui vero
 semel dūtaxat comedūt, ii imbecilli
 sunt & calidam emittunt vrinam, vt
 pote præter consuetudinem exinanī-
 ti, os ipsis falsum redditur, & amarū,
 & in quo vis opere contremiscunt,
 tempora tēduntur, cœnam cōcoque-
 re non p̄inde possunt, ac si pransi fuif-
 sent, quocirca minus quā consueue-
 runt, bibere debent. Et liquidiorē
 mazā, panis loco assumere. ac ex ole-
 ribus rumicem aut maluam aut be-
 tam, item ptisanam. Atque dum ci-
 bantur, vinum modicum bibere, idq;
 dilutius, à cœna parum ambulare do-
 nec vrina defluat & mingant. Neque

n iiii.

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

- 83 inutiles sunt eis pisces elixi. Caterum
84 ex cibis hi maxime notantur vt insi-
gnes. Allium flatum efficit, pectus cal-
facit, caput grauat, fastidium parit,
dolorem qui antea infestare consue-
uit, irritat, urinā ciet. atq; hæc est eius
utilitas, sed tum maxime conducit,
vbi quis vel potationi, vel ebrietati
85 indulgere proposuerit. Caseus, flatum
inducit & angustiam, cibos accendit,
crudtatem parit, & coctioni resistit.
his vero qui potu se repleuerunt, non
86 alius cibus nocentior est. Legumina,
& cruda & cocta & fricta, & macera-
ta, & viridia, omnia flatum excitant,
quam ob rem (nisi cū aliis cibis) ipsis
vtendum non est. Præterea singule spe-
87 cies sua habent vitia. Cicer siue crudū
siue frictum, flatum laboremq; parit.
88 Lens, non detracto cortice, astringit,
89 tumultumq; efficit. Lupinum vero ab
90 horum viciis vel minimis, quā ma-
xime abest. Laserpitii tum caulis, tum
succus, vt quibusdam maxime, ita in-
91 expertis minime aluum ducit. nomi-
92 natur vero arida cholera. Id vero po-
93 tissimum accidit, vbi cum multo ca-

feo, aut bubularum carnum edulio
 miscentur. Quippe bubulae carnes at
 trabilarios excitant morbos. supera
 ri enim natura non potest, sed ventrem
 non mediocriter ledere natae sunt, ut
 pote coctum difficiles. quamquam facilli
 me descendunt, si coctis ipsis, vetustisq;
 quis utatur. Caprinae carnes magis com
 ducere videretur, nisi omnia bubularum
 carnum vicia haberet. Nam & coctum dif
 ficiles sunt, & flatum magis suscitant
 & ructum bilemque pariunt. Igitur ut
 odoratissima & solida & suavissima
 saluberrima sunt, siue cocta, siue fri
 gida, ita iniucunda odore graues, &
 dura pessima sunt. Nec secus de re
 centibus dicendum est. Praeterea ut
 per aestatem optima sunt, ita per au
 tumnum, ut pessima damnantur. Por
 cinae carnes, siue subcruda, siue am
 busta sunt, malae sunt. Nam & bilem
 pariunt, & turbationem. Suillis, nullae
 aliae carnes meliores sunt, idque si non
 admodum pingues, neque etiam per
 tennes sint, ac neque veteris victimae eta
 tem sint assequuta. At vero reiecta
 pelle, & subfrigida edenda sunt. Arida

94

95

96

97

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- cholera ventrem inflat, strepitum & dolorem, tum laterum, tum lumborum excitat. aluus nihil deiecit, sed
- 98 astringitur. Eum qui sic affectus est obseruare oportet ne vomat, sed aluus ducenda est. Proinde ex aqua calida, atq; quàm pingui clysterem adhibe: mox perunctum in aquam calidam demitte, ita vt decumbere possit, ac paulatim calida aqua perfunde. Si enim sic calfacto aluus subducitur,
- 99 haud dubie soluitur morbus. Hunc somnus quoq; iuuat, ac bibere vinum
- 100 tenue vetus, idque meracius. Dabis etiam oleum, vt & quiescat, & aluus subducatur, atq; soluatur affectus. à
- 101 reliquis vero cibis arceatur. Quodd si dolor nō remittitur, lac asinæ, donec purgetur, potui dandum est. Soluta aluo, si bilis deiciatur, & tormina, vomitiones, suffocationesq; infestāt,
- 102 quiescere oportet mox aquam mulsam bibere & vomere.
- 103

DE AQUA INTER CUTEM.

- 104 **A**Quæ inter cutem duo sunt genera, vnū subcarnosum: id homi

nem, quū aggreditur, ineuitabile est. Altez ex flatibus constat, quod multa, eaq; bona fortuna indiget maxime vero erumnis fomentis, temperantiaq; curatur. Igitur sic affecto aridos, acresque cibos exhibere oportet, ita enim citissime reddet vrinam, & perquam fortis efficietur. Quod si spiritus quoq; difficulter redditur, idque verno tempore, & in aetate vigoris, fuerintq; vires valde, ex brachio sanguinem detrahare, mox calidos panes, ex vino nigro ac oleo submersos edere, atq; vt potionem maxime minuere, ita plurimum exercitari conuenit. Carnes vero suillas easque crassas ex aceto coctas edere vt arduas in ambulationes tolerare valeat. Qui ventrem inferiorem calidum habent, atque excrementa acria & inequalia deiciunt, ii ob eliquationem sic afficiuntur. quod si valeant vires, albo veratro diuertenda sunt: sin minus, frumentacei tritici cremor crassus, frigidusque, & lenticula, & faba, & panes subcinericii, & pisces exhibendi sunt. febricitanti quidem elixi non febris

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- citanti vero, assi. atq; huic vinum nigrum, illi vero aquam aut à mespilis, aut myrtis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut labruscæ flore dare oportet. ¶ Si vero non febricitantē tormina cruciant, in primis quidem
- 106 paulum lactis bubuli calidi dandum est, deinde augenda eius quātitas est. Item lini semen & triticea polenta. Ægyptia quoq; faba decorticata, madidaq; , amara parte abiecta , potui detur. Edat vero oua assa semiconcreta, similā, milium, chondrū ex lacte coctum. Hæc, facta prius decoctione refrigerentur, ac sic deinde comedantur. Quod si aliæ quædā vel escæ vel potiones iis similētur, ipsæ quoq; exhibeantur. Id vero maxime perti-
- 107 net ad victus rationem, vt obserues caueasq;, tum in acutis tum diuturnis ægritudinibus, accessiones, inclinationesq; febrium, vt quo tempore cibus exhibendus sit deprehēdas. item quando plurimum ab impetus vehementia abesse videntur. Ac consyde-
- 108 rare quoq; oportet capitis dolores, aut ab exercitatione, aut cursu, aut

itinere, aut venatu, aut alia quadam
 intempestiua ambulatione, aut ve-
 nere proueniētes. item decoloratos,
 raucos, splenicos, exangues, suspirio-
 sos, sicca tussi laborantes, sitientes, fla-
 tuosos, venarum clausuras, intenta
 prae cordia, dorsum & latera, itē tor-
 pētes, obscure videntes, aurium tin-
 nitu vexatos, vrinam non continen-
 tes, regio morbo affectos, cruda per
 aluum deicientes, sanguinem ē na-
 ribus, aut sede profundentes, & infla-
 tos, & quos fatigatio vehemēter in-
 festat. Eos itaq; (si dictas affectiones
 vincere nequeunt) haudquaquā me-
 dicamento purgabis. nam & pericu-
 lo agrum expones, & nihil iuueris,
 & spontaneas etiam iudicationes, li-
 berationesq; īpedies. ¶ Si sanguinis
 detractio cuiuspiam conducere videat, 109
 tur, aluus in primis astringenda est,
 postea vero sanguis mittendus est. fa-
 mem quoq; instituire & vinū aufer-
 re oportet. deinde decēti victus ratio-
 ne, & fomētis, & persusionibus reli-
 quā curationē p̄fice. Si vero astricta 110
 fuerit aluus, mollē adhibe clysterem.

DE RAT. VIC. IN MOR. ACV.

- 111 **¶** Quòd si medicamento opus esse animaduverteris, exhibito veratro, per superiores partes tuto expurga, sed per inferiores horum neminem.
- 112 Ac mirifice prodest, urinam ciere, sudores excitare, in ambulare, leniter perfricare, ne videlicet habitum redas densiorem, id quod alii, ipso pro no in cubili iacente, facere debent.
- 113 Si supra septum transuersum pectus afficiatur, æger, vt magna ex parte sedere, ita nequaquam decubere debet, vt (quoad vires permiscerint) sedens calido fomento perfricetur. At inum ventrem sub septo tráuerso, infestante dolore infirmus neq; moueatur, neq; fricetur, sed quietus iacere debet.
- 114 **¶** Quæ ab imo ventre per vrinas, sudoresq; resoluuntur, si per se modice labuntur: debiles quidem affectus discutiunt, vehementes autẽ nõ tã facile. quippe qui ita laborant, aut pereunt, aut sine malis alijs sanari non possunt. nam confirmari solent eiusmodi affectus,

AD AQVAM INTER CVTEM.

CAntarides tres, abiectis pedibus, & capite, teruntur in aquæ cyatis tribus, atque ieiuno potui dantur. Quôd si dolor potantem affecerit, calido fomento perfudatur. deinde vnctus panem edat ex oleo.

SANGVINEM
SVPPRIMEN.
TIA.

FIci succum lana susceptum, in- 115
tus ad venam adhibe. aut inuoluto coagulo nares obstrue. aut chalcitim adhibens, digito cōprime extrinsecus compressis vtrinque cartilaginibus, aut ventrē cocto asinino lacte solue. Item derafo capiti refrigerantia impone, si videlicet calido id tempore contingat. Sesamoides sesquidrachmæ pondere tritum, ex aceto mulso potui datum, per superiores partes expurgat. Admisceatur quoque veratris: vt tertiā faciat portionis partē, atque sic minus suffocat.

FINIS.

MED
 GA
 DICI
 pretel



lutione
 nitione
 Liceo
 pellan
 ne, sed
 canum
 vel vi re
 expositione
 riphum
 quenda
 Coma
 & ipse
 lant, &
 & At
 ROS e

MEDICINALIS. 105

GALENI ARS ME-

DICINALIS, INTER-

prete Nicolao Leonicensi.



Res sunt oēs doctrinae quae ordini inherēt. Prima quidē ex notionē finis, quae per resolutionē fit. Secūda ex cōpositiōe cōstat eorum quae ex resolutione fuerit inuēta. Tertia ex diffinitionis dissolutiōe, cui nūc incubimus. Licet autē huiusmodi doctrinā appellare, nō tamen diffinitionis dissolutiōne, sed & explicationē ut nōnulli, vocarunt, vel resolutionē, vel diuisionē, vel (ut nōnulli alii) explanationē, vel expositionē, ut alii. Conati sunt & Herophiliorū quidā talē facere doctrinā, quēadmodū Heraclides Erythricus. Conati sunt & eā quae per cōpositionē, & ipsi Herophilii, & quidē Erasiparticulati, & ī pluribus cōstrati sectatores, & Atheneus Ataleus Neminē tamen ante nos ea quae oritur à notionē finis ferre

o

A R S

plisse comperimus, ex qua oēs artes
via quadam, atq; ordine constituun-
tur: sed illam quidem alio pertracta-
uimus loco. Hic vero diffinitiuā fa-
ciemus doctrinā quæ quantū ab ea
quæ ex resolutione cōsistit, & dignita-
te, & ipso docendi ordine, linguatur,
tantū & ad totius compendium, &
ad singulorum memoriam præstare
inuenietur. Sufficiēter enim facillime
memoriæ cōmendātur ex diffinitio-
nis dissolutione vniuersa. Quoniam
totius artis capita in se optima diffi-
nitio cōplectitur, quā quidam substā-
tialē vocant, ex aduerso distinguē-
tes aliis, quæ notionales appellantur.
Illæ siquidem ab his quæ accidunt re-
bus diffinitis, hæ vero ab ipsa essen-
tia constituuntur. Elaborata autē est
à nobis particulatim & in pluribus
conscripta tractatibus totius medici-
næ cōtēplatio, quibus vti quis possit
ad triplicē doctrinā. Nūc vero diffini-
tiuā aggrediemur, hoc vnū præfati,
quod solū capita, & quædā veluti cō-
clusiones eorum, quæ alibi latius sunt
demonstrata, nunc à nobis dicentur.

Quid est medicina. Cap. ii.

Medicina est sciētia salubrium,
& insalubrium, & neutrorum.
nihil vero differt & si qs agro-
rum dixerit. Nomē vero scientiæ cō-
munius, nō autem propriæ accipere
oportet. Salubre autē, & insalubre,
& neutrum, vnūquodq; tripliciter di-
citur. hoc quidē vt corpus, hoc autem
vt causa, hoc vero vt signum. Etenim
corpus, qđ sanitatē natura suscipere
aptū est, & causam, quæ eandē effice-
re, vel cōseruare, & signum, quod po-
test indicare: hæc omnia Græci salu-
bria appellare consueuerunt. Eadem
ratione & susceptiua morborū cor-
pora, & eisdem efficientes, cōseruā-
tesq; causas, & signa indicantia, insa-
lubria vocāt. Nec aliter corpora neu-
tra, causas signa ve dixerunt. Et secū-
dum primam quidem rationem, at
que præcipuam causarum salubrium
est medicina scientia. propter eas au-
tem, & aliarum secundo quidem lo-
co insalubrium, & tertio neutrarū.
Et post has eodem modo corporū,
primo quidem, & hic salubrium,

secundo loco insalubriū, tertio neu-
trorum. Itidem de signis dicendum.
In actionibus autem, prima quidem
est corporum cognitio quæ habetur
ex signis: post hæc earum quæ in ipsis
inuentio causarum.

¶ Quot modis dicitur ef-
fectuum, indicati-
uum & susce-
ptiuum.

Cap. iii.

Sed quoniam & effectuum, & in-
dicativum, & susceptiuum dupli-
citer vnumquodque dicitur, hoc
quidem simpliciter, hoc vero vt nūc,
nosse oportet amborum esse medi-
cinæ scientiam. Ipsum vero simplici-
ter duobus dicitur modis, & quod
semper & quod plurimum: de quo-
rum utroq; medicina pertractat. Neu-
tra vero & causa, & corpus, & signū,
& quod simpliciter dicitur & quod
vt nunc, tripliciter vnumquodque ap-
pellatur: hoc quidem quia nutrius cō-
trariorū est particeps, hoc vero quia
vtriusque, hoc vero quia aliquando

huius, aliquando illius. Horum autē
 ipsorum secundum, rursus duobus di-
 citur modis, aut quia vtrunq; cōtra-
 riorum ex æquo participat, aut quia
 aiquādo plus alterum. est vero & in
 tota diffinitioe, si verba animaduer-
 timus, ambiguitas quēdam, quam &
 ipsam dissoluere oportet. Cum enim
 dicitur medicinam esse scientiam &
 salubrium, & insalubrium, & neutro-
 rum, significatur & q̄ omnium par-
 ticularium, & q̄ quorundā, & qualiū.
 Sed omnium quidem infinitū quod-
 dam est, atq; impossibile, quorundā
 diminutum, atque artificio carens.
 qualium vero artificiosum pariter,
 atque sufficiens ad omnia artis par-
 ticularia, quod etiam dicimus in me-
 dicinæ diffinitione comprehendī. Pri-
 mum igitur de corporibus dicere ag-
 grediemur, qualia nam sint, & salu-
 bria, & insalubria, & neutra post hęc
 de signis, & causis differemus.

De corpore salubri.

Cap. iiii.

Salubre simpliciter corpus ē quod
 ab ipso naturæ ortu bonā habet

o iii

211 A R S
temperaturam in simplicibus, & pri-
mis particulis, atque in his quæ ex il-
lis componuntur instrumentis, est cō-
moderatum. Salubre vero nunc, est
corpus quod in præsentī est sanū. Est
vero & hoc eo tempore quo sanum
existit, bonam habens temperaturā,
& commodationem, non tamen
optimam, at sibi propriam. Ipsius ve-
ro salubris simpliciter corporis, tale
quidem est semper id quod est opti-
ma temperantia præditum, ac maxi-
me est commodatum. Vt multum
autem quod à constitutione optima
non valde admodum deficit.

De corpore insalubri. Cap. v.
Insalubre vero simpliciter est cor-
pus quod ab ipso ortu nature, vel
in consimilibus partibus malam
habet temperaturā, vel in instrumen-
tariis incommodationem, vel utrū-
que vitium. Insalubre vero nūc est cor-
pus quod eo tempore, quo tale dici-
tur, agrotat. neque obscurum est, qd
& hoc ipsum, eo quo dicitur tempo-
re agrotans, vel in consimilibus ma-

lam habet temperaturam, vel in instrumentariis incommodationem, vel utrunq; Est vero & semper insalubre, quod ex ipso naturæ ortu vel pessimam habet temperaturā in simplicibus, & primis particulis omnibus, vel aliquibus, vel his quæ obtinent principatum, vel in instrumentariis, incommodatum existit. Similiter autem in his, vel omnibus, vel aliquibus, vel illis quæ obtinent principatum. Ut multum vero insalubre est corpus quod ab huius quidem vicio recedit, nondum tamen mediocritatem attingit.

De corpore neutro. Cap. vi.

Quoniam vero & neutrū corpus tripliciter dicebatur, vnū quidem quod neutrius erat extremæ dispositionis particeps, aliud autē quoniam vtriusq;, aliud quoniam aliquando huius, aliquando vero illius. Iuxta primum significatum neutrum erit corpus, quod exquisitè medium est, & saluberrimi, & insaluberrimi corporis: & huius hoc quidem simpliciter tale, quod ab ipso

o. iiii

AR S
ortu naturæ ita est constitutum, hoc
vero ut nunc, quod in præsentitem-
pore mediū exquisitè existit saluber-
rimi, atque insaluberrimi corporis.
Ipsius autem simpliciter, semper qui-
dem tale est id, quod in omnibus æta-
tibus tale perdurat. Ut multum autē
quod nonnullas recipit muta tiones.
Iuxta vero secundum significatū neu-
trum erit corpus quod ab ipso ortu
naturæ contrariarum simul est parti-
ceps dispositionū, aut scilicet in vna
parte, aut in duabus differentibus. in
vna quidem si secundum alteram op-
positionem effectiuarum qualitatum
bonam habuerit temperaturam, vel
etiam secundum vtranq; , sed in for-
matione, & magnitudine, & nume-
ro partium, vel situ delinquat, aut cō-
trā in his quidem recte se habeat, vel
omnibus, vel quibusdam. peccet autē
intemperatura, in differentibus ve-
ro partibus, & iuxta omnes opposi-
tiones potest quidq; simul particeps
esse contrariorum. Et semper quidem
tale quod per omnes ætates in eodē
habitu perseverat. Ut multum vero

quod aliqua ex parte euariet. Ita vero & nunc neutrum erit corpus iuxta secundum significatum, quia vel parte in vna hæc quidē ipsi salubria existunt. illa vero insalubria, vel in differentibus ita afficitur partibus. Iuxta vero tertium significatum neutrum erit corpus, quod aliquando quidem salubre, aliquando vero insalubre, existit, vt nonnullis accidit, qui in pueritia salubritate corporis vigent, quum vero ad iuuentutē peruenerint, insalubres euadūt, aut contrā. In vno autē tēpore quod ita est neutrum consistere nequit: latius vero si accipiatur, contingit. Nouimus autem quod nūc, dupliciter dicitur. Salubre igitur, & insalubre, & neutrum corpus quot modis dicatur, & quale vnūquodq; sit, sufficienter explicauimus. De signis vero deinceps dicendum.

De signis salubribus. Cap. vii.

Sunt autē & ex his salubria quidem quæcunq; præsentem indicant sanitatem, & futuram prænunciant, & præteritam memoriæ subiiciunt: insalubria vero quæ & præ

A R S

sentem indicant ægritudinem, & futuram prænunciant, atq; præteritam memoriæ subiiciunt. Eadem ratione neutra dicuntur, quæ neutram dispositionem ostendunt, prænunciant, & memoriæ subiiciunt, & quæ nihil omnino de dispositionibus indicant, vel nihilo magis salubrem, q̃ insalubrem dispositionem ostendunt, & partim quidem salubrem, partim vero insalubrem indicant dispositionem, & quæ aliquando quidem salubrem, aliquando vero insalubrem, & hæc quoque secundum tria tempora, veluti salubria, & insalubria appellantur. Vocantur autem nonnunquam à vetustioribus medicis hæc omnia signa prænunciatiua, quavis præsentium, ac præteritorum indicatiua. Vſus vero nō parvus ex prænunciatiuis, atque indicatiuis: minor autem ex his quæ memoriæ subiiciunt. Cum vero sint salubria corpora, hæc quidem simpliciter, hæc vero vt nunc, quæ & bene valentia dicuntur, salubrium simpliciter corporum duplicem diximus esse differentiam: quoniam nonnulla quidem sem

MEDICINALIS. 110

per, nonnulla vero vt multum essent talia. & semper quidem quæ optimā constitutionem sortita sunt, vt multum vero, quæ non magnopere ab illa recedunt.

De signis optimæ constitutionis.

Cap. viii.

HOrum autem dignotiones sumēdæ sunt ab his, quæ secundum essentia rationem ipsis insunt, & ab his quæ ex necessitate consequuntur operationibus, casibusq; qui proprie accidentia vocantur. Ab essentia quidem ipsa eorum quæ optimā habent constitutionem, commoderatione consimilium quidem, in caliditate, frigidityte, humiditate & siccitate. Instrumentorum vero, in quantitate, ac numero eorum ex quibus componuntur, ac præterea formatione, situ partium singularum, ac totius instrumenti. Ex his vero quæ ex necessitate consequuntur consimilia, quantum quidem attinet ad tactum à mediocritate, quæ in mollitie, ac duritie consistit. Quatum vero ad aspectum, à colore optimo, & leuitatis, atq; hi

110 211 ARS MEDICINAE
spiditatis mediocritate. In operationibus, à perfectione, quā & ipsorum virtutē appellamus. Ab his vero quæ instrumentarias partes consequuntur, à commodatione, & pulchritudine omnium totius corporis instrumentorum: ac præterea earum quæ ipsis insunt virtute operationū. Optimæ igitur constitutionis corporum signa indicatiua sunt hæc. Eorum autē quæ ab ipsa deficiunt, & adhuc tamen salubria existunt, nonnulla quidem in consimilium temperatura vicium ali quod paruum, habent, nonnulla vero in instrumentariorum cōmoderatione, & hoc quoq; perexiguum. Accidit autem hoc vel in omnibus, vel in aliquibus, aut in vtrisque. Viciorum vero genera eadem sunt his quæ virtutem perficiunt. Temperatura quidē in consimilibus. Numerus autem, & formatio, & magnitudo, & situs, in instrumentariis. Vtrisque vero cōmunis unitas, quam & ipsorum continuitatem appellamus. In his autē ipsis generibus sunt corporum insalubrium vicia secundum vtrunq; insalubritatis

MEDICINALIS. III

modum. Terminus autem qui utrūque distinguit, est operationum læsio sensibilis. Quæ vero ab optima corporum constitutione breue aliquid deficiunt, re vera quidem & ipsa in aliquo sunt offensa, non tamen id sensu comprehenditur. Distinguuntur vero ex eo, quod magis minusve in operationibus existit, ac quia causis quæ ægritudinem pariunt, non æque resistunt. Quæ autem simpliciter insalubria sunt corpora, distinguuntur ob id, quod facile à causis quæ morbos committendi vim habent, superantur, & quoniam in vigore operationum plurimum deficiunt. In medio autem amborum collocantur ea quæ neutra simpliciter appellatur, & cum latitudine quadam. Quo fit ut tota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habent non parvam, diuidatur. Erit autem prima quidem salubrium corporum, secunda neutrorum, tertia insalubrium. Post quæ deinceps sequuntur quæ iam ægrotant corpora, quæ sensibilibus operationum læsionibus distinguuntur. Quæ igitur

tur dolore infestantur, & quorū motus sunt viciosi aut omnino interierunt, manifestam habent determinationem. Quæ vero imbecilles ædunt operationes, in magnis quidē distantis facile discernuntur, in parvis vero ambigua sunt: atque idcirco in eo genere noxę collocatur, quę neutrius contrariorum participat dispositio, quā & ipsam neutram diximus appellari, ita tamen vt horum omnium sensus sit iudex, non ipsa natura rerum inspiciatur, ne periculū sit in dogma perpetuæ passibilitatis incidere, & quidem signa sanorum corporū. Sed quæ insalubria, salubriāq; & neutra existunt quantitate distantia differēt duobus inuicem contrariis terminis a nobis statutis, optima videlicet cōstitutione corporis, & nuper facta ægritudine, ac deinceps considerantibus vtri eorum vicinora sunt ea quæ ad examē corpora veniunt. Quæ cū proximiora sunt optimæ cōstitutioni, salubria: quæ vero ab hac longius distant, atq; ad ea quæ iam ægrotant magis accedunt, insalubria. quæ autē

intermedia, atq; æqualiter ab vtrifq;
distare videntur, neutra. Optime igitur
cōstitutionis corporis indicia ex-
plicauimus. Eorum vero quę ab ipsa
deficiunt, totidem sunt numero gene-
re, quę in magis, & minus secari pos-
sunt. Cum autem in tres latitudines
diuisa sint, corporis insalubris simpli-
citer indicia trademus. ex his enim
& reliquę duę latitudines innotescēt.
Generaliter igitur prius à nobis in eo
quem de optima cōstitutione sermo-
nem habuimus, specialiter autē nunc
dicetur, si prius partes diuiser imus.

Quot sunt differentię partium.

Cap. ix.

Sunt vero earum quatuor vniuer-
se differentię: quoniam nonnullę
earum principia existunt, aliquę
vero ab ipsis originem habēt, aliquę
nec aliarum gubernationi præsunt,
neque aliunde gubernātur quum in-
sitas habeant à natura potentias, à
quibus reguntur: quædam vero sunt
quæ insitas simul, & aliunde emanati-
tes habent. Principia igitur sunt, ce-

rebrum, cor, hepar, testiculi. Ab illis vero ortum habent, atq; eisdem subministrant, nerui quidem, & spinalis medulla cerebro: cordi vero arterie, hepatis, venę: ipsa vero seminaria vasa testiculis. Quę autem à se ipsis gubernantur, sunt, cartilago, os, copula seu ligamētum, membrana, adenes, adeps, caro simplex. Reliquę vero partes, cum vna cū istis habeant ex se ipsis regimen, arteriis, nervis, & venis insuper egerunt. Capillorum autem, atque vngulum neque regimen vllum est, sed generatio tantūmodo. Hę igitur sunt partiū differentiæ.

De signis cerebri. Cap. x.

Indicia autem singularum temperaturę sumpto à cerebro initio, deinceps dicemus. Sunt vero quinque insita genera quę ipsius naturam ostendunt. Primum quidem totius capitis dispositio. Secundum vero sensibilibus operationum virtus, & viciū. Et tertium actiuarū. Quartum earum quę tenent principatum. Et quintum naturalium. Aliud vero genus præter hæc omnia, ea quę extrinsecus

secus aduenit alteratio. Et quidem totius capitis dispositio ex magnitudine, & figura sumitur, atque capillis.

De paruitate & magnitudine capitis. Cap. xi.

P Aruum igitur caput viciosa constitutionis cerebri proprium est indicium. Magnum vero non necessario indicat bonam cerebri compositionem. Sed si quidem ob insitæ virtutis robur, quæ multam, atque optimam materiam afformauerit, eueniat: optimum est signum. at si ob materiæ tantum multitudinem: haudquaquam bonum. Distinguenda vero sunt hæc, & ex figura ipsa & ex his quæ ab eo habent ortum. A figura quidem ipsa, si concinna. semper enim hoc bonum est signum. Ex his autem quæ ab eo ortum habet, si valida est ceruix, & si aliis ossibus optime cõstet, atque omnis præterea nervosa substantia boni sit habitus, ac robur habeat intentum. Propria autem capitis figura est, veluti si excogitares sphaeram exquisitè rotundā, ex cera constructā, paulatim vtrinque

p

depressam. In hac enim necesse est,
vt posteriores, prioresue partes plus
gibbæ fiant, q̃ sphaeræ cōueniat. Quæ
vero vtrinque cōsistunt, magis rectæ.
Quòd si ea quæ secundū occiput emi-
nentia minuatur, simul intueri oportet
neruos, atque cervicem, vnà cum
ossibus aliis. Nam si secundum natu-
ram constiterint materiæ defectu, nō
virtutis imbecillitate contingit. Illis
vero non recte se habentibus, princi-
pium est debile, sed magna ex parte
defectus qui occipiti eueniunt conse-
quitur eorum quæ antediximus im-
becillitas, rarissimeque aliter euenire
consuevit. Caput etiam quod secun-
dum occiput in acutiem tendit, ani-
maduertere oportet, hisdem adhibi-
tis distinguēdi rationibus, quibus an-
tea in capite grandiori facto vteba-
mur. Vt plurimum vero, & hic opti-
mum est signum figura cōcinna eius
partis, quæ cerebro adhæret, quam
nonnulli medici posterius cerebrum
appellare consueuerunt, quemadmo-
dū & posterius existit ea sutura quæ
Græcæ litteræ Λ formam habet præ-

finitam. Est vero huiusmodi pars spinalis medullæ principium, & eius ratione neruorum omnium qui actionibus obseruiunt. Ipsa autē pars posterior per seipsam paucos admodū sensitiuos obtinet neruos plurimos vero actiuos, sicuti & anterior, sensitiuos quidem plurimos, paucos admodum actiuos. Quare vbi bene fuerit affecta vtraque pars, robustas habebunt eas quæ ab ipsis. deriuationes. Exdem quoque distinctiones adhibendæ sunt ad partes capitis anteriores ad frontem attinentes, quæ etiam ad posteriores, earūdeque, & paruitatem, & magnitudinem inspicere oportet, atque itidē figuram, & sensus ibi collocatos, visum, gustum atque odoratum. Hæc enim se inuicem indicant, atque attestantur, & quæ à principiis oriuntur, principii virtutem, vel viciū, & principium eorū quæ ab ipso nascuntur.

De operationibus obtinentibus principium.

Cap. xii.

p ii

Earum autem operationum quæ obtinent principatum, virtus, ac vicium sunt ipsius principii seorsum tantummodo indicia. Voco autem operationes principatum obtinentes, quæ à solo principio proueniunt. Ingenium quidem igitur, subtilē cerebri substantiam indicat: tarditas vero intellectus crassam: discendi vero facilitas, formarum facile susceptiuam: memoria autem, stabilē, ac firmam: sicuti & discendi difficultas, formarum non facile susceptiuā: & obliuio, fluidam. Mobilitas quoque in opinionibus, calidam: stabilitas autem frigidam. Adhuc autem duo indiciorum genera mihi videor prætermisisse, de quibus sum ab initio me dicturum pollicitus, quorum alterū ad operationes attinet naturales, alterum vero ad ea quæ extrinsecus occurrant. Erit autem in vtrisque sermo communis.

Signa bonæ temperaturæ cerebri.

Cap. xiii.

Siquidem cerebrum sortiatur bonam quatuor primarū qualitātū

temperaturam, omnia quæ diximus
 habebit moderata, & excrementa quæ
 vel per palatum, vel aures, vel nares,
 vel oculos expurgantur, hæc quoque
 modice se habebunt, atque ab his que
 extrinsecus occurrant minime læde-
 tur, quæ scilicet vel calefaciunt, vel fri-
 gefaciunt, vel humectant, vel exiccant.
 Talibus igitur capilli capitis: cū ad-
 huc sunt infantes subruffi, cum vero
 pueri, subflauī, cū iam adoleuerint fla-
 ui fiunt, mediiq; sunt inter eos qui om-
 nino sunt crispī, & simplices. nō tamē
 facile caluitium patiuntur. Quæ vero
 dicuntur ac posterius dicēda indicia
 sunt, accipere oportet, vt in bonam
 habentibus temperiem habitationi-
 bus. Quæ autem ad capillos attinēt,
 non ad locorum tantum, sed ad hu-
 morum quoq; temperaturā qui cere-
 bri tēperaturæ proportionē respon-
 dent, sunt referēda. Si vero calidius sit
 quā oporteat, in altera vero opposi-
 tione bonam habeat temperaturā,
 siquidē in caliditate excesserit, omnia
 quæ dicentur, validiora erūt indicia,
 sed si paruus fuerit excessus imbecil-

lia. Communis autem hæc ratio statuatur in omnibus partibus, quarum intemperaturis vniuersis indicia sumus tradituri.

Signa calidi cerebri. Cap. xiiii.

DEinceps igitur signa cerebri caliditatis, præter ea quæ nuper diximus, sunt quod ea quæ circa caput omnia rubicunda, & calida magis, & quæ in oculis venæ magis sensui patent. Capilli quoque, in his statim in lucē æditis habent in capite ortum. & quum plurimum in caliditate à mediocri temperatura recesserint, nigri, & robusti, & crispi fiunt. Cum vero non multum, subfauui quidem ab initio fiunt, deinde nigricant, ac progredientibus ætatibus caluitium patiuntur, atq; eo magis qui plus modico sunt calidiores. Excrementa vero quæ per palatum, & nares: & oculos, & aures, pauca, & concocta ipsis existunt quū integram habuerint sanitatem. cum vero eis caput repletur (continuo enī ac tum præsertim, cum nullam victus seruauerint rationem, tale quid eis

accidit)plura quidem in ipsis excrementa, atq; inconcocta generantur, implēturque:atque aggrauantur eorum capita à calidis cibis,& potibus odoribus,atq; hisce omnibus quæ extrinsecus occurrant,in quorum numero est,& qui nobis circūfunditur aere sed præterea magis, si non solum naturæ calida, sed etiam humida talia corpora extiterint. Breuib; autem somnis huiusmodi temperaturæ contentæ sunt,neq; admodū profundis. Signa frigidi cerebri. Cap.xv.

F Rigidioris vero,quā oporteat, cerebri indicia sunt plura ī propriis meatibus excrementa, & capilli recti,& ruffi,& stabiles, & qui longo post natiuitatem tēpore nascuntur tenues,atq; ab initio male nutriti,& facile à causis frigidis offenduntur,atq; hoc ipso offensionis tempore distillatiōibus, & grauedinibus capiūtur,neq; si tetigeris, ptes ad caput attinētes admodū calidæ sentiūtur,neq; si inspexeris,rubicūdæ apparēt,& oculorū venæ oīno visum effugiūt,& somnolēti quodāmodo sunt.

AR S
Signa siccī cerebri.

Cap. xvi.

Siccioris autē cerebri indicia sunt pauca & superfluitates effluentes, & sensuum perspicacitas. Sunt autē ad vigilias prompti, & capillos habent robustos, & qui celerrime eis statim innascuntur. Crispi autē potius sunt, quā recti. Cito autem calui fiunt.

Humidi cerebri indicia.

Cap. xvii.

Humidioris vero cerebri indicia, capilli plani, & nequaquam calui fiunt. sensus autem turbulenti, & excrementorum multitudo. somni multi, atq; profundi. Et hæc quidē simplices sunt intemperaturæ.

Signa calidi, & siccī cerebri.

Cap. xviii.

Compositæ autem, primum calida, & sicca, secundum quam, & superfluitatibus carēt, & sensibus vigent, & plurimum vigilant, & cito calui fiunt, & prima quidem capillorum generatio celerrima est, ac plurimo abundans alimento. Capillos vero habent nigros, & crispōs, & tan

gētibus caput, calidi sentiūtur, & sūt
rubicūdi vsque ad ætatē cōsistentiæ.

Signa calidi, & humidi cerebri.

Cap. xix.



I vero humiditas adiū
gatur caliditati, parum
vtriusq; qualitatibus supe
rantibus mediocritatē,
color bonus, & q̄ circa oculos calidior
ra, venæ magnæ, & plura excremen
ta, & mediocriter cocta, & capilli re
cti, subflauī, & non facile calui fiunt.
Implentur vero atque aggrauantur
eorum capita à calidis. At si humectē
tur, protinus multo magis excremē
torum habent multitudinē. Et si plu
rimū caliditas, atque humiditas cre
uerit, his caput est ægritudinibus ob
noxium, atque excrementis habun
dans, & quod facile à calefaciētibus,
atque humectātibus offendatur. Au
ster vero semper eis aduersatur, atq;
optime in aquilone se habent, non
tamen diu vigilare possunt: & cum se
ad somnum conuerterint, simul graui
somno tentantur, & vigilāt, & soma
nia habent imaginationibus plena,

visus eis turbulēti, neq̃ satis sensibus
vigent. Quòd si plurimum in calidi-
tate cerebrum à mediocritate reces-
ferit, paululum autem humidius ex-
titerit, calidæ tēperaturæ indicia præ-
se feret, cum quibus leuia quædā hu-
miditatis signa coniungētur, veluti si
longe quidem humidius, paululum
vero calidius, vehementia quidē erūt,
ac manifesta humiditatis indicia, de-
bilia autem caliditatis. Communis
vero hæc ratio in omnibus compo-
sitis intemperaturis existit.

Signa frigidi, &
siccī cerebri.

Cap. xx.

F Rigidæ vero, & siccæ cerebri in-
temperaturæ, frigidum & mini-
me coloratū sui ratōe caput red-
dunt. Semper enim memoria rape-
tenda quæ à nobis ab initio est di-
stinctio posita, vt præterea aduerta-
mus quantum ex humorum tempe-
ratura alterentur quæ circa ipsum cō-
sistunt. Protinus autem huiuscemodi
temperaturæ venis carentes habent
oculos, & à causis frigidis facile ledū.

tur. Quare & inæquali fanitate fruuntur, quoniam nonnunquam læuissima habent capita, & excrementorum moderatos effusus, nonnunquam vero, & grauedinibus, & distillationibus minima ex causa capiuntur.

De sensibus. Cap. xxi.

Sensus autem eorum in iuuentute quidem omnes viget, atque omni vicio caret, sed progrediente ætate cito marrescunt. Et ut summam dicatur, omnes celerrimam circa caput senectutem ostendunt. Quare & cito cani fiunt. Capilli vero ipsis quidem genitis vix exeunt, & male nutriuntur, & rufi sunt. in progressu autem ætatis, superate magis frigiditate caliditatem, quam siccitate humiditatem, multum non caluescunt. Ecce contra vero si contigerit siccitatem quidem plurimum dominari humiditati, frigiditatem vero calidi, atque parum calui fiunt hi.

Signa cerebri frigidi, & humidi. Cap. xxii.

Humida vero, & frigida cerebri temperatura faciunt homines graui sono tetari, & ad sonum

ARS
facile conuerti, sensibus quoque mini-
me vigentes, atque excrementis redun-
dantes: & qui caput frigiditati, ac re-
pletioni habent obnoxium, ac distil-
lationibus, & grauedinibus facile te-
tantur, neque tamen hic alui fiunt.
Hæc igitur indicia sunt cerebri tem-
peraturæ, à quibus si progrediaris ad
vnumquodq; sensorium dignotiones
transferre licebit.

De oculis. Cap. xxiii.
Sed sufficiet de oculis facere me-
tionem. Quicumq; tangentibus
quidem manifeste calidi exi-
stunt, & facile à crebro motu cie-
tur, & venas latas habent, hi calidi om-
nes sunt. Frigidi vero, his contrarii. Et
humidi quidem molles simul, & mul-
ta humiditate pleni. Sicci vero duri
simul, & aridi. A similibus autem suæ
temperaturæ causis facile offendun-
tur, iuuantur autem a modico cōtra-
riorum vſu. Sed hoc quidem cōmune
in omni cuiuscunq; partis temperatu-
re dignotione oportet meminisse.

De magnitudine oculorum.
Cap. xxiiii.

Magnitudo oculorum quidem ubi cōcinnitas, & operationum virtus, multitudinem bene temperatę substantię ostendit, ex qua sunt conformati: quę si desint multam quidem substantiam, non tamen bene temperatam ostendunt.

De paruitate oculorum.

Cap. xxv.

Paruitas vero oculorum, adiuncta quidem concinnitate, ac virtutum operatione, paucā quidem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex qua sunt cōformati. Si vero sociam habuerint inconcinnitatē quādam, atque operationū vicium: tunc paucam simul ac viciosam materiā ostendunt.

De colore oculorum. Cap. xxvi.

Quæ vero ad colores attinent, ita distinguere oportet. Glaucci quidem oculi, qui pura humiditate, ac non multa præfulgēt, tales fiunt ob splendidi luminis abundantiam. Econtra vero nigri, & qui intermediam naturā seruant, causas

quoque intermedias habent.

De glaucedine, & nigredine oculorum. *Cap. xxvii.*

Glaucus igitur oculus fit, vel propter magnitudinem, vel propter splendorem humoris, qui à Græcis crystalloides nominatur. vel propter situm prominētem, aut propter tenuis & aquei humoris, qui in pupilla existit, paucitatem, & puritatem atque omnibus quidem in vnum conuenientibus, fit glaucissimus oculus. Quod si aliqua adsit, aliqua vero non, tunc maior, minorve glaucedo contrahitur. Niger vero oculus fit, aut ob parvitatem crystalloidis, aut propter profundum, situm, vel quoniam splendidus ac fulgidus exquisitè non est: vel quoniam tenuis humor, vel superabundat, vel purus non existit: vel propter vnam aliquam ex his, quas ante diximus causas, aut propter omnes fieri consuevit. In ipsis autem magis, & minus (vt antea diximus) reperitur. Tenuis igitur humor quo magis ad aquæ naturam accedit, & superabundat, humidiores oculos ostendit: quemadmo

dū si crassior, ac minor fiat, sicciorē. Crysalloides autem, si quidem durior existat, sicciorē efficit oculum: si vero mollior, humidiorē. sic & si plus modico tenuem humorem excesserit, sicciorē: si aut defecerit, contrariū.

De cordis temperaturis.

Cap. xxviii.

DE cordis autem temperaturis deinceps dicendū est. Si prius hęc in memoriam reuocauerimus, quod vnāquāq; partem seipsa, vel calidiorē, vel frigidiorē, vel sicciorē, vel humidiorē dicimus factam, non alicui rei alteri comparantes. Vt cunque enī extiterit cor natura frigidius, multo sane calidiorē temperaturam possidebit calidissimo cerebro.

Signa cordis calidi.

Cap. xxix.

Calidioris igitur cordis, vt admodum qui ei proprius est, atq; cōueniēs, indicia quādam sunt inseparabilia, & propria, magnitudo respirationis, & pulsus velocitas, & frequentia, & audacia, & ad actiones natura

AR S
prompta. quod si multum in calidita
te excesserit, tunc furibunda quædam
iracundia, & temeritas adsunt. Est au
tem his thorax hispidus, & præfer
tim pectus, & quæcunque illis partes
proximiores. Magna vero ex parte ca
lidi cordis temperatura, vniuersum
corpus calidum reddit, nisi hepar ve
hemētius obstiterit. Dicemus autem
paulo inferius totius corporis idicia.
Est quidem & latitudo thoracis cali
ditatis indicium, nisi & hic quoque
cerebrum plurimum obstiterit, quoni
am ei magna spinalis medulla respō
det: tantæ vero erunt vertebræ, quan
ta & spinalis medulla, quare & spina
vniuersa. Configitur vero thorax ad
eam spinæ partem quæ methaphre
non, id est, dorsum dicitur, tanquam
ad carinam navis: quare necessario
eius longitudo æquabitur dorso, lati
tudo vero erit pro vertebrarum ra
tione, quando ad proportionem ea
rum crassitudinis fuerit constitutus.
cum vero cordis caliditas superans
perflauerit, ac dilatauerit, in primo
sui ortu thoracem, erit eiusdem cali
ditati

ditati proportionē respondens. Quare cum caput paruum, thorax autem latus extiterit, maximum hoc tibi fuerit cordis caliditatis indicium. Cū vero magno existente capite, paruus fuerit, propriissimum hoc erit cordis frigidioris signum. Si vero capiti fuerit proportionē respondens, tunc aliis signis de corde distingues, ex ipsius thoracis amplitudine nihil assumens.

Signa cordis frigidi.

Cap. xxx.

IN frigidiore vero corde pulsus minores existunt, q̄ modo naturæ conueniat: non tamen necessario tardiores, vel rariores. Respiratio autē, si quidem tāto thorax minor extiterit, quanto cor frigidius pulsibus erit proportionalis. Si vero maior fuerit, q̄ pro frigiditatis uehementia: non minorem tantum, sed etiam tardiozem, & rariozem naturam ostēdit. Tales autem timidi sunt & sine audacia, & segnes, & nudum pilis habent pectus. De eius vero paruitate distinguēdū vt diximus prius.

Eodem modo & de totius corporis calidi tate.

Signa cordis sicci. Cap. xxxi.

COr autem siccus pulsum efficit duriores, & iram non promptam quidem, sed feram, & quae non facile sedari queat: magna quoque ex parte vniuersum corpus sicci⁹ existit, nisi hepar obstiterit.

Signa cordis humidi. Ca. xxxii.

COrdis vero humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quidem procliuēs, sed talem quae facile sedari possit: & vniuersum corpus humidius existit, nisi hepar obstiterit. Secundum vero coniugationem qualitatum primarum viciose cordis temperatura ita se habent.

Signa cordis calidi & sicci.

Cap. xxxiii.

Calidi, & sicci cordis, pulsus duri sunt, & magni, & veloces, & frequentes, & respirationes magnae, & veloces, & frequentes, & multo magis ad velocitatem, ac frequentiam vergunt, thorace cordi non aucto proportionaliter. Hi vero praecunctis peccus habent maxime hirsutum, & ilia.

MEDICINALIS. 722

Ad actiones autem prompti sunt, & iracundi, & subiti, & mores tyrannicos habent ad furorem faciles, nō facile vero placabiles. De totius autem corporis tēperatura, & thoracis amplitudine, his quę ante diximus pportionaliter est distinguendum.

Signa cordis calidi, & humidi.

S I vero caliditas vnā cū humiditate dominabitur, minus quidem his quos antea diximus, hi sunt hirsuti ad actiones vero nihilo minus prōpti, nō tamen ferior est aīus, sed ad irā pcliuis tātūmodo pulsus vero magni, ac molles, & veloces & frequētes existūt. Et respiratio, cū thorax cordi fuerit pportionalis, eādē pulsibus formam seruabit. Si vero minor extiterit. tātō illis velocior erit & frequentior, q̄to & thorax minor extiterit. Si aut multa facta fuerit euerfio itēperatura, ac si, hoc p̄sertim i humiditate cōtigerit, p̄ter ea q̄ diximus cōtingēt ēt ex putredine morbi his, quę in ipsis fuerint humoribus corruptis, ac putrefactis. Expirationes autē

q ii

211 ARS MEDICINAE
maiores sunt, ac velociore in-
spira-
tionibus, & submissio arteriæ in pul-
sibus velox.

Signa cordis humidi, & frigidi.

Cap. xxxv.

Humidioris vero, & frigidioris
cordis pulsus quidē molles, mori-
bus autem nequaquam audaces, sed
timidi, & segnes existūt. Tales etiam
glabrum pectus habent, minimēque
iram retinent, sicuti & ad iram non
admodum sunt prompti. Quæ vero
ad thoracem, & vniuersum attinent
corpus, distinguere oportet, sicuti ea
quæ ante diximus.

Signa cordis frigidi, & sicci.

Cap. xxxvi.

Frigidius vero cor, & siccus, pul-
sus quidem duriores reddit, &
paruos: respirationem autem, si
quidem thorax paruitatē cor-
dis frigiditati pportionalem habue-
rit, moderatam, si vero maior extite-
rit, raram ac tardam. Hi vero præ om-
nibus minime ad irascendum prom-
pti. Cum autem coacti fuerint irasci
quibusdam, retinent iram. Habent

autem maxime omnium nudum pili pectus. De paruitate autem thoracis, ac præterea totius corporis frigiditate similiter distinguendum. Vñ illud commune in hisce omnibus memoria repetētibus, q̄ quęcunq; de moribus, siue nūc, siue quouis alio sermone explicata sunt ad temperaturę cognitionem, non de optimis moribus ac viciosis, qui ex philosophia hominibus adueniunt, sed de insitis, ac naturalibus nos exposuisse.

Signa calidi hepatis.

Cap. xxxvii.

Hepatis calidioris indicia, venarum latitudo, ruffa bilis abundantior, in consistenti vero ætate etiam atra, calidior ipsis sanguis, atq; eadem ratione corpus vniuersum, nisi obstiterit cor. His venter & ilia hirsuta.

Signa hepatis frigi. Cap. xxxviii.

Rigidioris vero, angustia venarum, pituita abundantior, sanguis frigidior, & totius corporis habitus, nisi à corde calefiat, venter illis glaber est, atq; ilia.

q iii

Signa hepatis sicci. Cap. xxxix.

Siccioris autem, sanguis quidē crassior, & minus abundans, venæ duriores, & totius corporis habitus siccior.

Signa humidi hepatis. Cap. xli.

Humidioris autem, sanguis quidem abundantior, atque humidior, venæ autem molliores, ita vero & vniuersum corpus, nisi partes ad cor attinentes obstiterint.

Signa calidi, & sicci hepatis.

Cap. xli.

Calidioris vero simul, ac siccioris hepatis indicia, illa plurimū hispida, sanguis crassior simul, ac siccior, ruffa bilis plurima est, consistente autem ætate & atra, venarum autem latitudo, & durities. Sic vero & vniuersum corpus se habet. Nam quæ ex corde caliditas originem habet, potest obtundere eā quæ ab hepate nascitur frigiditatem, sicuti & frigiditas caliditatem. Siccitatem vero non potest humidius cor ad contrarium habitum transferre. Media vero inter has, quæ dictæ sunt, ea quæ ab hepate

humiditas oritur. Magis enim à cor-
dis siccitate supatur, q̃ siccitas ab hu-
miditate: minus autem caliditate, ad
huc vero multo minus frigiditate.
Hec enim inter omnes qualitates quę
ab hepate eueniūt, facillime vincitur.
Liquet autem q̃ cum in vnum conue-
nerint vtriusq; principii temperatu-
ræ, totum exquisite secundum illas af-
ficitur corpus. paulo vero inferius ip-
sius dicentur indicia.

Signa hepatis calidi, & humi. C. xlii.

Humidius autē, ac simul calidius
hepar, minus quidē q̃ calidius,
& siccus illa reddit hispida. Plu-
rimum vero sanguinis, & venas am-
plas, habitumq; calidiorem, atq; hu-
midiolem facit, nisi obstiterit cor. Si
vero amplius in ambabus qualitati-
bus à naturę modo recedat, à morbis
qui ex putredine, ac viciosis humori-
bus fiunt, facillime capitur. Adhuc au-
tem magis si plurimum augeatur hu-
miditas, caliditas vero non ita. Si autē
cōtrā, parum quidem humiditas cre-
scat, plurimū vero caliditas, minime
viciosis humoribus laborant.

q̃ iiii

Signa hepatis humidi, & frigidi.

Cap. xliii.

Humidius autem, & frigidius hepar habet ilia glabra, sanguinem vero ad pituitæ naturam accedentem generat, cum venarum angustia: sic & reliquum afficit corpus, nisi à corde ad contrariam naturam transferatur.

Signa hepatis frigidi, & siccæ.

Cap. xliiii.

Frigidius autem, & siccius hepar cum paucio sanguine, & venarum angustia efficit corpus, atque frigidius, & ilia glabra, nisi & hic cor dominetur.

Signa calidæ, frigidæ, humidæ,

& siccæ temperaturæ testiculorum.

Cap. xlv.

Temperaturæ vero testiculorum, calida quidem ad venerem proclivis est, & masculorum generatrix, & fecunda, celerrimèque genitalis partes obsepit pilis, simul autem & circumiacentes attingit partes. Frigidior vero contraria efficit. Et humida quidem multo & humido semine

MEDICINALIS. 125

abundat. Sicca paucum, & modice crassum generat semen.

Signa calidæ, & sicce temperaturæ testiculorum. Cap. xlvī.

Calidior vero, ac siccior, & crassum semen habet, & foecundissima est, quæ celeriter ab initio protinus ad coitum excitat animal. Sed & his genitales partes citissime hispidæ fiunt, atque omnes quæ circumstant supra quidem usque ad umbilicum, infra vero usque ad media femora. Petulca igitur est, & ad libidinē prona huiusmodi temperatura, statim vero satiatur, & si cogatur, offenditur.

Signa calidæ, & humidæ temperaturæ testiculorū. Cap. xlvii.

Si autem caliditas humiditati coniungatur, hirsutis quidē tales minus, plus vero semine abundant, non tamen plus cæteris appetunt, sed minori detrimento præter modū venereis indulgēt. quæ si satis exercuerint, & caliditas, & humiditas non sine detrimento à venereis abstinent.

Signa frigidæ & humidæ temperaturæ testiculorū. Cap. xlviii.

SI vero frigidiorē, & humidiorē
temperaturam testiculi habuerit,
partes circūpositæ glabræ sunt, &
tarde rem venereā exercere incipiūt,
neq; proni ad actū huiuscemodi sunt.
Aquosum vero, & tenue ipsis est se-
men, & infœcūdum & fœminarū ge-
neratiuū, vel oīno non generans.

Signa frigidæ, & siccæ tēperaturæ
testiculorum. Cap. xlix.

Rigidior vero, & siccior tempera-
tura similis quidem in reliquis est
antedictæ. Crassius vero in ipsa se-
men existit, atq; omnino paucum.

De habitu totius corporis.

Cap. l.

TOtius autem corporis habitus
diximus, & superius quomodo
hepatis, & cordis naturam sequatur,
ei autem magis assimulantur, q̄ vnā
aliquā ex primis qualitatibus poten-
tiorē habuit, quas & effectiuas ap-
pellant. Totius vero corporis habitus
in illis maxime dicitur partibus quæ
primæ oculis subiiciuntur. sunt vero
hæ, muscoli, qui omnia ambiunt os-
sa, carnes quædam compositæ ex pri-

ma & simplici carne, & filis quibus innascuntur. propria enim musculorum substantia his duobus constat. quæ vero ad ipsos, vasa pertingunt, veluti riui quidam sunt: qui non substantiam complent, sed eis subministrant, vt in vita permaneant. Dicuntur igitur, & horum temperaturę indicia, in bene temperata habitatiõe. nam quę male temperatę sunt cutem permutant ex se ipsis formantes, & quædam ex indiciis corrumpunt: ita & in bene temperata regione, si quis se tempore æstatis nudum soli exposuerit, permutabit indicia quæ ex calore, & duritię, & mollitię sumuntur. si vero quęadmodum bonam temperiem obtinet locus, ita & ipse bene temperato victu vsus fuerit, vt qui neque se singulis diebus in sole torrefaciat, neque sicuti plerique more puellarum continue in vmbra degat, hic certa atque exquisita temperaturę indicia præ se feret. tanquam igitur de hoc futuro sermone nunc ad ipsum accedemus.

Signa moderatę tempera

turę.

Cap. li.

Moderatæ temperaturæ indicia
 secundum totum animalis ha-
 bitum. Color quidē ex rubro,
 & albo cōmixtus, capilli vero flauī,
 & vt plurimū mediocriter crispī. Car-
 nositatis autem mediocritas in quali-
 tate, & quantitate. Medium est enim
 exquisitè huiusmodi corpus in ter oēs
 excessus, vt qui ad ipsum dicantur, &
 cognoscātur. nam & crassum corpus
 ad hoc cōparatum dicitur crassum,
 & tenue ad hoc eodem modo, & car-
 nosum, & macilentum, & pingue, &
 durum, & molle, & hispidum, & gla-
 brum. nullius igitur horum mediocri-
 tas est. Sed qualis Polycleti regula ad
 summum totius peruenit mediocri-
 tas, adeo vt neque tangentibus molle
 videtur neque durum, neq; calidum,
 neque frigidum: insipientibus vero,
 neque hirsutum, neq; glabrum, neque
 crassum, neq; tenue, aut aliquē alium
 habens excessum, vel defectum.

De corpore calidiore. Cap. lii.

Quæcunq; autem in caliditate
 à medio recedunt, non tamē
 in humiditate, & siccitate,

hæc quantum ad carnosum genus at-
tinēt (de hoc enim præsens est sermo)
videntur quidem tangētibus calidio-
ra tantum quātum & eorum tempe-
ratura calidior. Tāto vero magis hir-
suta sunt, quanto & calidiora, & mi-
nus pingnedinis habent, colorē autē
rubrū, & capillos nigros habent.

Signa frigide tēperature. Cap. liii.

Rigidioris autem tēperature in-
dicia sunt pilorum carentia, pin-
guedo, & frigiditas quæ tangen-
tibus obuiat. Color autem vnā cum
capillis ruffus. Et vbi frigiditas excels-
ferit, liuidus quodāmodo existit, quē
nōnulli medici colorem plumbeum
appellant.

Signa sicce tēperature. Cap. liiii.

Siccior autem temperatura tan-
to gracilior est, & durior bona
temperatura, quanto maior est
siccitas. In reliquis autem eodē
modo se habet.

Signa humidæ temperaturæ.

Cap. lv.

ET humidior etiam in reliquis qui-
dem eodem modo se habet, me-

ARS
lius autem carnosā, & mollior: & qui-
dem secundum coniugationem qua-
litatum primarū factæ intēperaturæ
cōpositam habent indiciorū formā.

Signa calidæ, & siccæ temperatu-
ræ. Cap. lvi.

CAlidior simul, ac siccior est hirsu-
ta magis, ac calida, & dura exi-
stet & pinguedine caret tenuisq;
est, & capillos nigros habet. Si vero
multum in calidi tate excedat, color
quoq; niger illi adest.

Signa calidæ & humidæ tempera-
turæ. Cap. lvii.

CAlidior autem, & humidior tē-
peratura mollior, & calidior, &
carnosior tanto est bona tempe-
ratura, quantum & vtriusq; qualitati-
bus aucta fuerit. q; si plurimum augea-
tur, cito à putredinis corripitur mor-
bis: quoniam & humorū vicio prom-
pte laborat. Si vero parum quidem
humidior sit, multo vero calidior,
molliores quidem parum huiusmo-
di sunt his, qui bonam habent tem-
peraturam, & magis carnosī, non pa-
rum vero hirsutiores, & tangentibus

non parum calidiores nigri vero eis capilli, & caro pinguedine cadit. Si vero paulo quidē calidior multo humidior, mollis his caro est, & multa: & color cōmixtus est ex albo, & rubro, & tangentibus paulo calidiores. Et vt summam dicatur, in omnibus temperaturæ coniugationibus semper super excedentis qualitatis indicia eminebunt.

Signa frigida & humida temperaturæ. Cap. lviii.

Frigidior autem, atque humidior temperatura, si parum quidem utraq; augeatur pilis nuda est, & alba, & mollis, & crassa, & pinguis. Si uero magis excefferit, reliqua quidē sunt secundū proportionem augmenti qualitātū, color autē unā cum capillis rufus, quemadmodum si plurimū utraq; augeatur, liuidus. Si uero qualitātū augmentū fuerit inæquale eius q̄ super excefferit, indicia eminebunt.

Signa frigida, & sicca temperaturæ. Cap. lix.

Si autē frigiditas vna cum sicci a te equaliter augeatur, natura du-

rum ac tenue, & glabrum corpus habent, & tangentibus frigidū, pinguedo tamen ipsis, & si graciles sint, per carnes dispersa. Capilli autem, & color frigiditatis modum, ac proportionem sequuntur. Vbi vero calida, & sicca temperatura in tēpore decrementi, in frigidum, & siccum labitur habitum, tunc hi graciles fiunt, & duri, atque atra bilis in eis dominatur: & ob id nigri simul, et hirsuti euadūt. vbi igitur altera qualitas plurimum dominatur, altera vero parum à mediocritate recedit, superabunt eius quā dominatur, exilia autem erunt altera qualitatis indicia. in omnibus vero de quibus supra diximus, & postea dicemus, cōmune est temperaturę indicium, si membrum facile frigeat, vel frigiditatis, vel raritatis. Si vero non facile, vel caliditatis, vel densitatis. Si vero à desiccantibus offendatur, & aridum & siccum, & non facile mobile fiat, siccitatis: quemadmodum & si ab humectantibus grauitur se habeat humiditatis. Inspicere autē oportet si eandē omnes musculi seruant

uant temperaturam, vel minime eandem, atq; in omnibus animaduerte re subiectoꝝ ossium quantitatē. Nō nūquam enim gracile videtur membrum cū tamen non sit gracile, quoad musculos attinet, sed propter ossium tenuitatem tale videtur, sic & crassius quibusdam plerunque apparet, non ob ossium amplitudinem, sed ob multitudinem carnis, quæ vel aucta, vel comminuta, vel durior, aut mollior effecta, siccus, aut humidus membrum ostendit. Pauca igitur, ac dura, siccus multa autem, & mollis, humidus. Sic & intermedia spacia similium corporum, vt plus, vel minus humidæ substantiæ in se ipsis continent, vel crassius, vel tenuius, vel humidus, vel siccus membrum ostendunt. Humidus quidem vbi subtilior & plurima est humiditas, siccus vero vbi crassior, simul, & minor. Ipse enim solidæ corporis partes quæ vere solidæ sunt, ac primæ, nullo modo possunt effici humidiores: at satis ē, si quis eos celerius exiccari prohibeat. Intercepta autem in ipsis spacia, hac

211 AR 5
vel illa humiditate complere possibi-
le. Hæc vero est proprium partium si-
miliarium alimentum, quod ex ap-
positione fit, & non per vasa attrahi-
tur. Communis autem hæc ratio &
omnium partium existit. Et iterum
insalubrium, atque insalubrium cau-
sarum doctrina repetetur: nunc autē
ea quæ ordine sequuntur attingamus.
Signa sicci ventriculi. Cap. lx.

Ventriculi indicia, eius quidē
qui natura sicciior existit, si
celeriter sitibundi fiant, &
paucus eis sufficiat potus, &
plurimo autem aggraentur, fluctua-
tionibus infestentur, aut superfluitet
id quod abundat, & cibis delectan-
tur sicciioribus.

Signa humidi ventriculi. Cap. lxi.

Humidioris autem, si neque siti-
bundi fiant, & superabundās hu-
midum facile tolerant, & cibis
gaudeant humidioribus.

Signa calidi ventriculi. Cap. lxii.

Calidior vero natura ventriculus,
melius quidem concoquit, quàm
appetat: & multo magis quæcū-

que dura sunt, & non facile alterationem suscipiunt. nam quæ facile alterantur in ipso corrumpuntur, gaudet que calidis potibus, ac cibis: neque a frigidis ullam percipit noxam. si modice ipsis utatur.

Signa frigidi ventriculi. Cap. lxiij.

Frigidus vero natura ventriculus, ad appetendum quidem plurimum viget, ad concoquendum autem minime, tales præsertim cibos qui frigidi sunt, & non facile alterationem suscipiunt. Cito itaque in ipso acescunt, atque ideo aridis eruptionibus talis ventriculus plurimum abundat. & gaudet quidem frigidis, sed ab eorum usu immodico offenditur, ita & ea quæ extrinsecus frigida occurrant, nequit tolerare, quemadmodum neque calidus, calida. Mala vero temperaturæ quæ morbi ratione ventriculum occupant, hoc differunt ab his quæ naturales existunt, quoniam contraria, non autem similia appetunt, quemadmodum naturales.

De malis temperaturis in ventriculo coniugatis. Cap. lxiij.

MAlæ autem temperaturę in ventriculo cōiugatæ, ex cōpositione simplicium cognoscuntur. Oportet autem eas quæ iam sunt dictæ diligenter aduertere, easdem ab his quæ dicuntur, distinguentes. Non solum enim ventriculus sitibundos, & minime sitientes facit, & frigidi, calide potus appetentes, sed ea quoq; viscera quæ in thorace sunt, vt cor, & pulmo, sed qui ob horum sitiunt caliditatem plus inspirant, & longius expirant, atq; æstum in thorace sentiunt, non sicuti qui ventriculi ratione in illis caliditatem patiuntur, & cum potauerint non statim sedatur sitis, & magis cum frigidum hauserint, quam cum calidum nimis. Refrigerat autem eosdem, & frigidi aeris inspiratio, quæ nihil eos iuuat qui ventriculi ratione sunt sitibundi, ita & hi qui contrario modo se habent à frigida inspiratione sensibilem sentiunt affectum.

Signa pulmonis frigidi. Cap. lxxv.

ET hoc maximum sit frigidi pulmonis indicium. Vt vero frigidū

inspirantes manifeste dolorem sentiunt & frigiditatem, ita & caliditas est ipsis amica, sed & pituitæ excrementa cum sreatu, & tussi expuunt.

Signa pulmonis sicci. Cap. lxxvi.

Pulmonis aut siccitates excrementis vacat, & pituita & vocē clarā efficiunt quēadmodū humiditates obscurā reddūt, ac raucā: & cum vehemētius, aut acuratius loqui studuerint, tūc intercidūt excrementa.

De voce. Cap. lxxvii.

Non tamen ipsa vocis magnitudo à caliditate, sicuti neq; paruitas à frigiditate inest, sed altera quidē asperæ arteriæ latitudinē sequitur, & vehemētiorē efflatū, paruitas vero à cōtrariis aduenit causis. Quare neq; semper, neq; primū, sed ex accidēti, & solas naturales téperaturas nō autē aduentitias vocis magnitudo, aut paruitas sequitur. Quoniā etenim talia instrumēta temperaturæ ratione sunt facta, ad hæc consequitur huiusmodi vox. Idcirco contingit ex voce de naturali téperatura ratiocinari.

De leni, & aspera voce. Cap. lxxviii.

NAm & lenis vox, arteriæ lenitas
tem consequitur, sicuti & aspe-
ritatem. Lenitas igitur, arteriæ
moderatam sequitur temperaturam
asperitas vero siccitatem. Asperitas
etenim fit ab inæqualitate duri cor-
poris: arteriam vero duram simila-
rium partium ex quibus constat sic-
citas: inæqualem vero dispersæ in eis-
dem humiditatis defectus.

De voce acuta. Cap. lxxix.

Eodem modo, neq; acuta natu-
ra vox sine angustia faucium,
neq; grauis sine latitudine fie-
ri potest. Angustia igitur ab in-
sita, atque innata nascitur frigiditate
latitudo autem a caliditate. Differen-
tiis igitur naturalium vocum heque
ex affectu aliquo fiunt, sunt propor-
tionales, quæ & ipsæ indicia sunt cau-
sarum à quibus oriuntur, de quibus in
libris de voce sufficienter distinxim. Re-
liquæ vero partes animalis interio-
res exilia habent temperaturæ indi-
cia. Tentandum tamen ea ex iuuan-
tibus, atque nocentibus agnoscere:
ac præterea naturalium potentiarum

operationes. Dictum vero est in tertio de causis accidentium, quod cuiusque potētiae virtus, & viciū tēperatura principalis existat. Teperaturarū itaq; indicia iā explanauimus.

Signa naturæ instrumentariæ.

Cap. lxx.

Circa magnitudinē vero, vel formationem, vel numerum, vel situm: quæcūq; quidē sensibus subiiciūtur errata, cognitu facillima sunt: quæ autem sensu percipi nequeunt, quædam cognitionem habent difficilē, quædam vero facilem. Capitis igitur magnitudo, ac figura, & cerebri, simul, in propatulo sunt, & de his antea diximus: sic & quæ thoracis sunt, & quæcūq; ad scapulas, & humeros, vel brachia, vel cubitos, v' extremas manus, vel coxas, vel fœmora, vel tibia, vel pedes attinēt nō est difficile agnoscere, siue secundū formationē, siue secundū magnitudinem, ex his aliquid nō recte se habeat, siue secundum numerū, vel partiū, ex qbus cōstant cōposituram, singularum etiam operationis detrimēta facile patent.

r iiii

Quæ autē intra corpus sunt nō omnia possunt agnosci.

De ventriculo. Cap. lxxi.

Cuiusdam enim ventriculū aded paruum ac rotundum, ac pronū secundum ilia situm habentē inspe- xi, vt manifeste ex circumscriptione propria, & videntibus, & tangenti- bus appareret.

De vesica. Cap. lxxii.



Scilicet & cuiusdam vesicam cōtingit intueri, ita ex- positam, ac parua, vt si quādo vrinā tardius ex- cerneret, tumor quidē circumscriptus manifeste cerneretur, nō tamē aliud ex interioribus quid, quā mihi vnquā manifestum prēbuit indiciū. Tentare autem oportet quā maxime fieri potest virtutē ipsorum ac viciū. & si nō certissima sciētia, ar- tificiosa saltē cōiectura cōprehēdere, veluti, exempli gratia, in hepate.

De hepate. Cap. lxxiii

Vidienim aliquos: & quidem quā plures quibus venæ erant angu- stæ, & totum corpus colore priuatū.

quòd si plusculum cibi assumpsissent
qui p̄sertim flatibus excitandis aptus
esset, & crassus, ac tenax: nonnulli qui
dem veluti pondus quoddam insidēs
atq; suspensum in profundo dextræ
illorum partis sentiebant: nonnulli ve-
ro quandam cum dolore tentionem.
In his quidā verisimile est hepar esse
paruū, atq; angustos meatus habere.
De homine pituitoso, vomente bilē.

Cap. lxxiiii.

Alterum vidi cuius totus habitus
pituitā præ se ferebat, quotidie
tamen bilē rufam euomebat. Censui
igitur inspicienda alui excrementa,
in quibus minimū bilis apparebat.
Quare coniectura quadam compre-
hendi eum meatū qui biliosum egur-
gitat humorem quo minimam eius-
dē partē ad imū ventriculi locum, quē
Græci pylorō idest ostiarium vocāt,
effundere, vt in quibusdam apparet
animalibus ex quibus id constat, quòd
plurimum ad eorum quæ latent sen-
sum, confert cognitionem, ea quæ ex
sectionis inspectione habetur peri-
tia, & operationum, atq; vtilitatum

inuentio. Quicunq; igitur facultatem
 dignoscendi huiusmodi corpora
 quæ ita lapsa sunt conseq; cupit: oportet
 ipsum in sectionibus, ac in operationem, atque vtilitatum inuentionibus
 exercitari. Scripsimus vero de omnibus
 seorsum in tractatibus aliis, de quibus
 in fine libri omnino proposuimus
 facere mentionem: vt discendi cupidi
 intelligant quæcunq; discere optauerint,
 ex quonā possint haurire tractatu, sed tñ de hisce satis.

Quomodo cognoscantur corpora ægrotantia.

Cap. lxxv.

QUæcunq; vero vt nūc īsalubria
 sunt, hoc ē q̄ iam ægritudine
 patiūtur, dignoscere, & hæc ipsa
 oportet. Quæ quidē subiiciuntur
 sensui ex eorum quæ ipsis insunt, secundum
 naturam permutatione, in magnitudine,
 colore, figura, & numero, & situ,
 & ea quæ est secundum duri-
 tiem, & mollitiem, & frigiditatem,
 & caliditatem differentia. Quæ autem
 visum effugiunt (vt summatim

dicam) ex operationum læsionibus,
aut his quæ excernuntur, aut dolori-
bus, aut tumoribus præter naturam,
aut horum quibusdam, vel omnibus.

Signa cerebri patientis.

Cap. lxxvi.

P Articulatim autem quæ quidem
sunt in cerebro agræ dispositio-
nes, aut dementiæ speciebus, aut sen-
suum, vel imaginationum læsionibus,
aut actuum qui secundum electione
fiunt, aut ex his quæ excernuntur, per
palatum, vel nares, vel aures, aut ho-
rum, qui ei dolores eueniunt diffe-
rentiis.

Signa cordis patientis.

Cap. lxxvii.

Q Vē vero ī corde fiunt, ex diffi-
cilis āhelitus spēbus, & tremu-
lis motibus q̄ ipsi cōtingūt,
ex pulsibus quoq; eius, atquæ arteria-
rum, ab excandescēdi celeritate, aut
tarditate, à febribus, & refrigeratio-
nibus & in colore differentiis, ac eis
qui ipsi adueniunt doloribus.

Signa hepatis patientis.

Cap. lxxviii.

QUæ autem in hepate, ex defectu humorum, atq; abundantia, & ad id quod præter naturam euerfione, & colore malo, ac præterea ex permutatione nature in his quæ ad alimenti deductionem, aut superfluitatum attinet excretionem: sed & ex grauitatibus, & tumoribus & doloribus, nõ modo his qui in eo ortum habent, verum & illis qui cõpatiendi ratione proueniunt, quemadmodum in aliqua, vel spiritus grauis, vel tussis specie.

Signa ventriculi patientis.

Cap. lxxix.

Sic & ventriculi affectus agnoscitur vbi in concoctione, & appetitu humidi, vel sicci alimēti, vel superfluitatum excretionem delinquitur. Ita etiam, ex singultibus, eructationibus, nauseis, vomitibus, & ipsis eorum quæ euomuntur speciebus.

Signa thoracis patientis.

Cap. lxxx.

Ita & thoracis agnoscuntur affectus & spirandi difficultatibus, tussibus, & doloribus q in ipso fiunt,

& ex eorum quæ expuuntur differen-
tia. Sic & asperæ arteriæ ægritudines,
difficiles anhelitus, & dolor in loco,
& quæ expuuntur, & vocis offensio-
nes ostendūt. Secundum vero eandē
proportionē, & in aliis omnibus ac-
cidit partibus. nam ex tumore, dolo-
re, & operationum læsione, & excre-
mentorum differentia, sumentur in-
dicia. Excrescentiæ autem non natu-
rales, in inflāmationibus, durisq; ac
laxis tumoribus, & erysipelatis, sunt
explorandæ. Dolor autem quæcunq;
obsederit locum, aut continuitatis so-
lutionem, aut subitam alterationem
ostendit. Soluitur autem continuitas
incisione, exesione, fractione, & ten-
sione. Alteratur vero substantia à ca-
liditate, frigiditate, humiditate, sicci-
tate. Læditur autem operatio triplici-
ter, aut quia vix, aut quia viciose, aut
quia nullo modo fit.

De differentia eorum quæ excer-
nuntur. Cap. lxxxii.

QUæcunq; autem excernuntur,
nonnulla quidem sunt veluti
partes patientium locorum:

211 ARS
nonnulla vero tanq̃ excremēta. Quæ
vero in ipsis naturaliter continentur,
singula propriam facient indicatio-
nem. Dictum est autem plenius de hi-
sce omnibus in tractatu de membris
passis, quem nullus ante nos, aut in
artem redegit, aut ad absolutā per-
fectionem deduxit: quēadmodum &
in omnibus aliis euenit, quibus initiū
quidem aliquod ab antiquis est da-
tum, non tamen absolutum est opus.
Ægrotantium itaq; corporum ex tra-
ctatu illo indicia sunt sumenda. eorū
aut qui in ægritudinem lapsi sunt,
& qui sanitati restituendi, præsens do-
ctrina complectitur.

Signa futuræ ægritudinis.

Cap. lxxxii.

Eorum igitur indicia quibus ægri-
tudinis periculum imminet, me-
diam formam habent inter ea quæ
sanis, & quæ ægrotantibus eueniunt.
si quidem sanis omnia secundum na-
turam insunt, præter naturam vero
ægrotantibus. In confinio autem ho-
rum ea quæ sunt corporum neutro-

rum indicia, quorum nonnulla quidem sunt ex eorum genere quæ secundum naturam, sed vel qualitatibus, vel quantitativibus, vel temporibus permutata: quædam autem ex his quæ præter naturam, at minora his quæ ægritudinibus adsunt. Atque idcirco hæc quidem corporum dispositiones, quæ in ægritudinem casura monstrantur, sunt ex neutrorum genere, atque una ea quæ ipsa indicant signa. Primo enim hæc sanitatem ostendunt, secundo autem ægritudinem: & fiunt eadem signa secundum ad aliquid habitudinem, neutra, & insalubria. quæ quidem præsentem dispositionem ostendunt, neutra: quæ vero futuram præmonstrant, insalubria. Eadem vero ratione, & quæcunque ægrotantibus signa salutaria apparent, dicentur quidem salubria, quia futuram sanitatem ostendunt. dicentur etiam ægra quatenus, præsentem ostendunt ægritudinem. Neque in ambiguo est, quæ sunt utrorumque indicativa, neutra dicentur, secundum unum quoddam neutri vocabuli significatum. Neque ve-

211 / ARS
ro mirari oportet eadem signa tres
in diuersis habitudinibus seruare ra-
tiones, quę & salubria, & egra, & neu-
tra dicuntur. Secundū vero alterum
significatū, quęcunq; his qui à morbo
refrūtur, ū sunt signa neutra appella-
mus. neq; in alio significato accipiunt
ea quę senibus insunt, hæc quidem
omnia pluribus, & conceptibus, &
rationibus subiiciuntur. Quęcunque
vero his qui integra sanitate fruun-
tur, inter salubria tantummodo com-
putantur. Et quęcunq; egrotantibus
insunt, neque futuram prænunciāt sa-
nitatem, soli & hæc ægro, tum conce-
ptui subiiciuntur. Sed de his quidem
postea dicetur: nunc quę futuram præ-
monstrant ægritudinē prius exequa-
mur. Cum vero sit eorum differentia
duplex, prius ea pertractemus q̄ quā-
titatibus, qualitatibus, temporibus,
non autem propriis speciebus ab eo,
quod secundum naturam, euariant,
veluti ciborum appetentia, intenta,
vel dissoluta, aut quę non seruet tem-
pus consuetum, aut quę ad edulia nō
uisitata feratur, aut excretiōes cibi su-
perfluitatum

perfluitatum quæ aut pauciores, aut
plures, aut humidiores, aut duriores
existât. Sic humorum excremento-
rum, vel defectus, vel superabundan-
tia præter consuetudinem naturalē,
aut in colore, aut in cōsistentia varie-
tas aliqua, aut in tempore excretio-
nis, & vigiliæ plures, ac somnus, aut
non cōsueti tempore. Eodem modo
potus pluri, aut paucioris, calidi, aut
frigidi, insolens appetitus, sicuti & cir-
ca rerum veneriarum vsum immo-
dica, aut intēpestiua cōcupiscentia, &
plures, aut pauciores sudores his qui
sint opportuni, & ad motus torpor,
aut si moueri tētauerint grauitas, aut
vehemēs exolutio, menstruorum oc-
cultatio, vel immodica, aut diminuta
euacuatio. Sic & quæ per ora venarū
(Græci hemorroidas appellāt) fit san-
guinis effusio, sed non eadem quæ pri-
us in cibo, potuq; voluptas, sunt futu-
ræ indicia egritudinis, hebetudōque
animi non naturalis, aut obliuio quæ-
dam inconsueta, aut somni qui pluri-
bus imaginationibus abundant, quā
prius auditus, & odoratus visus, ve-

211 ARS MEDICINAE
hebetiores, aut turbulenteriores. Et vt
simpliciter dicam quæcunq; secundū
naturam inerant, hæc quidem aug-
mentata, hæc vero comminuta, hæc
vero temporibus quibusdā, aut qua-
litatibus immutata. Siquidē & ipsius
corporis moles, aut maior, aut mi-
nor, aut magis alba, aut magis rubra
quemadmodum liuidior aut nigrior
ructusq; ac sternutamenta, & flatus
plures, aut pauciores his qui secundū
naturam: sic & quæcunq; per nares,
vel palatum, vel aures, per quos mea-
tus cerebrum expurgatur, vel tempo-
ribus, vel quantitativibus, vel qualitati-
bus immutata. Hæc igitur omnia ex
genere eorū sunt, q̄ secundū naturam,
morsus quoq; vētris, vel in ore ventri-
culi, vel in aliquo intestino, aut cū al-
uiis subducitur, aut cū vomitus exci-
tatur, aut cū mingitur, siue aliq; alius
dolor moderatus ex genere qdē exi-
stet eorū quæ p̄ter naturam: non ta-
men qui ita se habent, agrotare dicū-
tur, sicuti neque qui capite grauantur
aut dolent, aut vigilant cum non-
dum in consuetis impediuntur ope-

rationibus. Hic enim in huiuscemodi dispositionibus terminus est. Atque idcirco in eo quod ad aliquid, eandem dispositionem ægram atque neutram appellabimus. Nam pro vigore potentiaæ quæ vel facile sustinet, vel vincitur, vnaquæque ex his, quas antea diximus, vel morbus est, vel neutra dispositio, sic & quæcunque in sensibus, non in eo quod magis, aut minus inuicem differunt, sed toto genere sunt præternaturam. Et hæc sunt signa morborum, donec modica fuerint, & nondum hominem à consuetis operibus sufficiunt amouere. talia vero sunt in gustu quidem, cum vel salæ, vel amaræ, aut alicuius alterius qualitatis sapor nobis indicatur, siue in omnibus quæ bibuntur, aut manducantur, aut præter quòd aliquid assumatur, saliuæ ipsa talis sentiatur. In odoratu autem quando alicuius vnius qualitatis sensum habemus, nullo odore præfente, aut quum plura differentia naribus admouemus, oia veluti similia sètimus. Sæpius vero

nihil sentimus, aut aliqd foetens, etiā
 si nihil adsit quod foeteat. Quantum
 vero ad auditum soni, & strepitus ad
 id quod præter naturam pertinent.
 Quemadmodum in visu, quæcunque
 ante oculos apparere creduntur nigra
 & atra, & cerulea, & ruffa, & rubra,
 & nonnulla rotunda, nonnulla autem
 oblonga, quædam gracilia, quædam
 crassa oculis prætendi videntur. In sen-
 su autem tactus quum inæqualitas ali-
 qua, vel spissitudo, vel grauitas, vel tē-
 tio, vel torpida, vel vlcerosa disposi-
 tio in toto corporis habitu sentitur,
 sic & in singulis partibus, vel tentio,
 vel compressio, vel morsus, vel graui-
 tas, quando modicæ fuerint, ac mini-
 me firmæ, neutram quidem disposi-
 tionem adesse demonstrant, futuram
 vero egritudinem prænunciant.

Signa corporum ægrotantium.

Cap. lxxxiii.

AT quæ iam in ægrotantibus si-
 gna videntur, ex quibus nonnul-
 la salutem, nonnulla mortem porten-
 dunt: prima quidem salubria, altera
 vero genere quidem ægra, secundum

speciem autem pernicioſa dicuntur. Sumuntur autem (vt vniuerſaliter dicamus) ex operationum virtute, ac viciis, ſecundum partem vero ex particularium operationibus, quarum genera antea diximus. Primum quidē eorum quæ principia exiſtunt, ſecundum vero illorum quæ à principiis ortum habent, & tertium eorum quæ ex ſeipſis gubernantur, à principiis autem quædam deriuationes habēt. quartum ſiquidem genus eorum quæ tunc diximus, ex ſe quidem ad aliqd prænoſcendum inutile eſt. ſecundum accidens autem, & ex his aliquando præcognitiones erunt, quemadmodum, & ex excrementis: ex his quidē compatiendi ratione: ex excrementis autem quoniam coctiuiſ, & incoctiuiſ: ſigna continent. Quare fieri non poteſt quin omnino ſignificent, aut naturam materiei, aut materiam naturæ, aut neutrum neutro dominari. Salubria quidem ſigna dicuntur, natura ſuperante: inſalubria vero ſuperata, neutra autem quæ pugnas habent æquales. Sed q̄ quidē manifeſtā

indicant coctionē ex salubribus sunt:
sicut quæ cruditas, ægra: quæ vero
neq; coctionē, neq; cruditatē ostēdūt,
ex neutrorū sunt natura. Sūt vero &
neutra quæcunq; nunc, qdē hoc nunc
vero contrarium significant, veluti dī
giti denigrati. Talia sunt etiam criti-
ca, id est decretoria accidētia, de qui-
bus omnibus in libris de crisi dictum
est: sicuti etiam de his quæ ad vnam
quanc; attinent operationem, in his
libris in quibus de causis, accidētium
agitur. Quare omnem horum singu-
lorum materiā ex eisdem libris collī-
gere oportet. Ego vero, plixitati par-
cens, hic sermoni de signis finem fa-
ciam, transgrediar autem ad illum
qui de causis.

De causis salubribus, in salubribus, ac
neutris. Cap. lxxxiiii.

Q Voniā vero & harum hę qui-
dem salubres, hę autem insa-
lubres, hę vero neutre, primū
de causis salubribus erit sermo. Quia
vero, & harum nonnullę quidem cō-
servatrices, nonnullę vero effectrices
sunt autem & tempore, & dignitas

te priores conseruatrices) incipien-
dum est à cōseruatricibus. Quum igitur non vnum tantum sit sanum corpus, sed plura, vt supra diffiniuimus, in eorum singulis propria erit causa conseruatricis. Siquidem omnis causa in eo quod ad aliqd existit. Hic igitur denuo sumendū initium ab optima corporis constitutione, ac quæ ei salubria sint consyderandum. Eorum autem inuentionem ipsius rei natura insinuat. Si enim impatibile, atque inalterabile esset corpus, semper optima constitutio perduraret, neque artis præsidio indigeret. Quoniam vero alteratur, corrumpitur, & vertitur, neque eundem seruat prioris status tenorem, ea ratione auxilium desyderat.

Quod modis nostrum corpus alteretur.

Cap. lxxxv.

Secundum quot igitur alteratur modos, tot auxilioꝝ, hoc est cārū cōseruatriciū genera hēbit, quas ex his q̄ dicta sūt liquet eē ex correctiuarū genere. Sed quia pau-

s iiii

ARS
latim correctiones faciūt, anteq̃ om
nis ingruat noxa: non præserruantes
à futuro malo, sed præserruantes
à futuro malo, sed præserruantes
seruatrices, medici appellant. Altera
tur igitur corpus à nonnullis quidem
necessario, à quibusdam vero nō ne
cessario. Dico autem necessario, quæ
nulla est euitandi ratio: non necessa
rio autem reliqua. nam aerem quidē
nos ambientē semper attingere, co
medereq̃, ac biberē, & vigilare, & dor
mire est necessarium. Ensis autem,
& exitialibus feris obuiare, nō neces
sarium. Quare circa primum causa
rum genus versatur ars corporis con
seruatricis, circa secundum autem mi
nime. Quot igitur numero sint ea q̃
ex necessitate corpus alterant, distin
guentes, proprium in singulis eorum,
causarum salubrium genus innenie
mus. Inest igitur vnū quidē ex ambi
entis aeris adhæsu: alterum vero ex
motu, & quiete, & totius corporis, &
partium singularum. tertium ex som
no, & vigilia: quartum ex his quæ as
sumuntur: quintum ex his quæ excer
nuntur, & retinentur: sextum ex ani

me affectibus. ex his enim necesse est aliquo modo affici corpus. Ab aere quidem ambiente, quia aut calefit, aut frigefit, aut exiccatur, aut humectatur, vel secundum horum patitur coniugationem, aut in tota alteratur substantia. Ex motu vero, & quiete, cum vraq; modū excesserint, aut calefactū, aut refrigeratum, aut humectatum, aut exiccatum, vel aliquid secundum horum patiens coniugationem. Sic & ex somno & vigilia ipsum pati est necessarium secundum eandem rationem, & ex animæ affectibus. Ex his quæ assumuntur, aut excernuntur aut retinētur, hæc siquidē omnia partim quidem euidenter, partim vero per alias causas medias alterant corpus, & sanitatem corrumpunt, & de horum singulis seorsum scripsimus in tractatu qui de salubribus inscribitur. Omnia igitur nunc dicta generæ materiæ quædam sunt salubriū causarum. At vsu opportuno adhibito causæ fiunt conseruatrices, atq; salubres: sed vbi à modo deliquerint, insalubres reddūtur. Vnde et liquet ex his

ARS
non alias preter has, aut salubres, aut
insalubres a nobis existimari oportet
ret easdem potius, quandoque quidem
salubres, quandoque vero insalubres, in
eo quod ad aliquid esse. Nam ubi mo-
tum corpus desiderat, exercitatio quæ-
dam salubris, ocium autem insalubre.
quum vero eget quiete, ocium quidem
salubre, exercitatio autem insalubris.
Eodem modo de cibis, & potibus, &
de aliis omnibus statuendum. Horum
enim singula quando (ut necessitas
corporis exigit) cum mensura, ac qua-
litate opportuna adhibentur, salubria
fiunt. at cum citra omnem necessitatem,
ac præter modum afferuntur, insalu-
bria. Atque hæ duæ sunt circa salubre
& insalubre intentiones, rei scilicet quæ
adhibetur qualitas, ac quantitas. Ne-
que enim est rationi consentaneum,
etiam temporis occasionem, quæ in
his quæ dicta sunt continetur, veluti ter-
tium aliquod ab eisdem diuersum, intro-
ducere. Si enim tali, & tanta re allata
egeat corpus, nemini dubium quin etiam
in tempore opportuno afferatur occa-
sio. Siquidem temporis inde ortum

habet, quoniā fluxibile, ac facile mutabile est mortale corpus, ac p̄ transformationis modo aliis alio tempore eget auxiliis. Quare nō est tertiū aliud quod p̄ter ea q̄ dicta sunt, tēpus. Sapius autem eo tanq̄ tertio quodam ob eā quā diximus causam ad docēdum v̄ri consueuimus. Quoniā vero in his ipsis intētionibus, & alie causæ salubres, & id quod p̄positum est genus cōtinetur, rursus easdem repetamus. Optimæ igitur corporis cōstitutioni cū circūfusus aēr fuerit in tēperie positus earū rerū de quibns nup̄ diximus quietis scilicet ac motus, somni vigiliæ, & eorū quæ assumuntur, atque excernuntur, quātitas moderata conueniet. Cū vero aēr ā tēperie recesserit, tātū ā mediocritate euariare oportet quātus fuerit ab optima tēperātia recessus. Hi vero sunt mediocritatis termini, in aēre q̄dem ambiēte, vt neq̄ horreat p̄pter frigus, neq̄ sudet p̄pter æstū. In exercitijs autē, cum primum lassari cōperit corpus, cōfestim quiescere. In cibis autem coctionis perfectio, & excrementorum modus, in

quali, quantôq; conueniens, æqualis
vero in his quodāmodo est coctioni
appetitus. quare neq; præside egent,
qui singulorum quæ assumuntur quā-
tatem metiatur. Optima siquidem
natura, quātum appetit, tantum etiā
cōcoquit. Sic & somno modum ipsa
natura præfinit, his qui optimam cor-
poris confritionē sunt sortiti: & tūc
à somno excitantur, cum corpus am-
pliori quiete non eget. Cumq; talem
victus rationem adhibuerint, nullum
est in eorum excrementis delictum,
quæ vel per ventrem, vel per vrinæ
meatus, vel per totum corpus egerun-
tur. Nam priora quidē ex modo eo-
rum quæ assumuntur temperantur,
totum vero corpus salubriter perflari
facit exercitii vsus moderatus. Lique-
t autē ab ipsis cauere oportere, omnes
animi immodicos affectus, videlicet,
iræ, tristitiæ, furoris, timoris, inuidiæ.
Hæc enim alterant, atque à naturali
statu corpus auertunt.

De venereis. Cap. lxxxvi.

Venereorum vero, iuxta Epicuri
sententiam, nullus est vsus salu-

bris. Re vera autem cōfert, si tantum interualli. in eorum vſu adhibeatur, vt neque resolutio aliqua ſentiatur, & ipſe ſe ipſo homo quodammodo leuior factus, ac melius ſpirare videatur. Tempus vero ad vtendum opportunum, cum in exceſſum omniū mediocritate corpus fuerit conſtitutum: cum ſcilicet neq; ſupra modum plenum, neq; vacuum extiterit aut in calore, aut frigore, aut ſiccitatē, aut humiditate exceſſerit corpus. q̄ ſi aberrare contigerit: paruus ſit error. Melius autem illi calefacto, magis, quam inſrigidato: & pleno, quam vacuo: & humecto potius corpore, q̄ exiccato vti venereis. Horum autem ſingulorum quæ dicta ſunt, qualitas in optima corporis conſtitutione eſt eligenda. exercitii quidem in quo totius corporis partes æqua proportionē mouentur, ita vt non aliæ quidem ultra modum fatigentur, aliæ vero citra. cibi autem & potus optimam habeant temperiem. Sunt nim rature conuenientiores quæ optima fuerint prædita temperatura. Eadem in reli

quis etiam est ratio adhibenda. At si quod ab optima constitutione defecerit corpus, non autem vehementer, & hæ quæ ipsius sanitatem causæ conseruant, proportionē mutabuntur. Sed cum multa sint huiuscemodi corpora, per singula genera seorsum dicendum. Quod igitur in temperatura euariat, instrumentariarum autem partium seruat commodationem, duplicem habet salubrium causarum formam: alteram quidem earum quæ ipsius conseruant temperaturam, alteram vero eam, quæ ad optimam transferunt. Quæ itaq; ipsius temperaturam conseruant, tantum à causis optime temperatæ naturæ distabunt quātum & totius corporis temperatura ab illis euariabit. Calidiora siquidē corpora calidioris victus rationem exposcunt. Frigidiora autem frigidioris, & sicciora siccioris, & humidiora humidioris, ac secundū coniugationem calidiora, ac sicciora calidioris, ac siccioris, eadem in reliquis etiam coniugationibus proportionē seruata. Recte siquidem causarū vte

tur materia, qui naturales earum potentias agnouerit, veluti quod motus, defectus alimenti, vigiliae, excretio, & omnes animi affectus corpus exiccant, atque his contraria existunt, humectant. Ita vero & calefacientia, & refrigerantia vitae instituta, & ciborum, ac potuum, atque ut simpliciter dicam, omnium quae corpori afferuntur, materias quis noscens, atque potentias, salubribus utetur causis, similia similibus afferendo. si quidem eius propositum fuerit in eodem in quo acceperit, corporis seruare temperaturam. Quod si permutare, atque ad melius traducere statuerit, alterum est hic salubrium causarum genus, his quidem quas nuper diximus contrarium: equaliter vero declinans ad alteram partem, à bene temperatis, & mediis, quae optimis conuenire naturis dicebamus. Calidior siquidem, ac siccior temperatura, à calidioris, ac siccioris victus ratione ad exactissimum bonae temperaturae habitum minime transfertur. At talium erit usus necessarius, quantum eis, quae bene temperata exi-

stunt, frigidiora sint, atque humidiora, quantum & natura naturam in caliditate, & siccitate superabat. nam tale causarum genus naturales corrigit intemperantias, alterum vero de quo supra diximus temperaturam conseruat. Est autem vtriusque vicissim apud medicos vsus necessarius. nam cum plurimum suppetit ocii, corrigere oportet, ac sensim ad meliora transferre. Neque enim natura patitur eas quae subito fiunt alterationes: hominem autem necessariis occupationibus districtum, in eodem praestat habitu conseruare. Quo pacto igitur & hoc ipsum primum causarum genus conseruatiuum appellamus: nam forte magis alteratiuum, & curatiuum & naturalium defectuum correctiuum vocare conueniat. Quoniam ad vniuersum sanitatis genus referentes non ad eas quae secundum speciem differentias quaecunque sanos conseruant, conseruatiua omnia vocamus: siue praeter id quod sanitatem conseruant ad melius totam traducant temperaturam, si pristinum tantummodo habitum

bitum teneantur: at quæ deteriore
statum efficiunt, insalubria. Quæcū
que igitur similem habent in omni
bus corporis partibus intemperiem,
eadem egent procuratione: quæ vero
dissimilem, dissimili. Nā fieri potest
vt ventriculus frigidior sit q̄ oportet,
at, caput vero calidius, atq; vtrunque
propriis egeat auxiliis, ac ratione ea
dem singulæ aliæ partes cum fuerint
aut præter modum humidiores, aut
sicciore, aut calidiores, aut frigidio
res, siue intemperiei victum exigunt
accommodatum. Neq; igitur modo
eodem omnes tales corporis partes
exercebimus, neq; equaliter humecta
bimus, aut exiccabimus aut tale aliud
quippiā agemus. Plenius vero de his
diximus volumine illo, quod de sal
ubribus inscribitur.

De causis salubribus partium instru
mentarium. Cap. lxxxvii.

Instrumentariarum autem par
tium causæ salubres, quæadmo
dum & hic ab optima constitu
tione delinquitur, ita & iuicem
distabūt. Aliæ enī sunt salubres erro

ribus qui in formatione consistunt, alia his q in magnitudine, vel numero, vel positu. In formatiōe igitur plures contingunt errores, nam & figura pattis, & si qua in ea cavitās est, secundum naturam, vel meatus, vel orificium, vel asperitas, vel lenitas, quando a naturali mediocritate recesserit. Si quidem parum hoc patiantur: salubrium corporum retinent appellationem. si vero amplius insalubriū. Quod si tantus fuerit recessus, vt operationi afferat detrimentum, iā egrotare dicentur. Secundum quantitatem autem excessus, atque defectus ad eadem ducit differentias. In numero vero, siue vna, siue plures quæcunque ex similaribus partibus fuerint, aut deficiant, aut superabundent. Ex hoc genere etiam sunt quæcunque in nobis substantiæ præter naturam consistūt. Reliquum est aliud genus, quod ad situm cuiuslibet simplicis attinet partem, in quo & ipso quattuor sunt omnes differentiæ. prima quidem quæ optima existit: secunda vero quæ parum euariet, atq; ideo salubre adhuc

efficit corpus: & tertia quæ insalubre quando amplius à modo recesserit: & quarta quæ iam egrum recessu plurimo reddit. Quæcunque igitur partes in figura delinquant, veluti quæ blæxæ, varæ, & obliquæ appellantur: hæ quum nuper natus adhuc tenellus est, formatione, atque alligatione, ad naturalem traducuntur habitū. quòd si iam aucto infante ad duritiam peruenerint, emendari non possunt. Sic errores quidem qui ad cavitatem attingunt, cum adhuc augeri perseuerant, correctionē admittūt. cū aut iā ad vltimū puenerint, nullus est remedio locus. Cavitates igitur, quiete, atq; alligatione parue redduntur. magne vero partiū operatione, & spūs retetione. sic & quæcunq; foramina orāq;. Et quidē q̄ naturalē magnitudinem partes expurant, quiete, & accōmoda alligatiōe minores redduntur, augētur aut & naturali motu & frictione moderata, quibuscūq; aliis plus sanguinis attrahere natura aptis. Deficientes vero partes quæcunq; ex sanguine ortū habuerint, corrigi q̄dem nō est

impossibile. quæ autem ex semine, p
 pemodum impossibile existit: licet ta
 men aliquando loco eorum alia face
 re quæ vsum haud dissimilem præ
 stent. Earum vero omniū natura opi
 flex est, medicus autem minister. Quæ
 vero numero excedunt, his ablatio
 causa salubris existit. inspicere vero
 oportet in quibus id fieri possit. Nam
 si impossibile appareat, transponere
 tentandum est. Eadem est & eorum
 quæ in situ vicia sunt emendatio. ne
 que in obscuro est quòd duo sapius,
 aut tria vitia eādē partem possunt
 occupare, sicuti in eo qui ventriculū
 paruum simulatque rotūdum, atque
 aduersus septum habuit incumben
 tem. In ipso etenim, magnitudo, for
 matio, ac situs erant deprauati, tem
 peratura quoque frigidior existerat,
 hic nullo artificio ad naturalem ha
 bitum transferri poterat: at ne aded
 infestaretur erat remedio locus. nam
 quoniam repleto ventriculo difficul
 tate spirandi premebatur, minus ci
 bi, at magis alimento opportuni, &
 qui non difficulter subduceretur, ter

die assumebat. Alteri vero cui obstru-
ctio in hepate ob vasorum angustia
sapius contingebat, extenuas victus
pro remedio inuentus est.

De solutione continuitatis.

Cap. lxxxviii.

R Eliquum igitur id morbi genus
est, quod & similaribus & instru-
mentariis partibus commune existit.
solutio scilicet continuitatis quā quis-
piam forte his vnquam adesse nega-
ret qui integra sanitate fruuntur, quo-
niam semper sit passio quem sane lae-
tet eandem in omnibus generibus fo-
re dubitationem. Nisi enim operatio-
nis laesio sensibilis, sanitatem ab aegri-
tudine separet, sed qualitatem tantū
modo dispositionis introspiciamus,
perpetuae passibilitatis dogma neces-
sario recipiemus, cum nullus sit q om-
nes operationes optimas habeat. Sed
de hoc quidem, vt quod ad logicam
potius pertineat contemplationem,
seorsum consideretur. Salubres ve-
ro causas, vt his quos nemo dubitat
egrotare, deinceps percurramus à ma-
la temperatura exordium facientes.

t iii

Hic vero prius distinguamus quæ omnes ferè medici prætermittunt, alias quidem esse salubres causas eius in temperaturæ quæ iam facta est, alias autem illius quæ & adhuc fit, sicuti etiam alias eius, quæ futura est. Huius itaque postremæ, hæ quidem in præseruatiua artis parte continentur hæ vero in salubri. Primæ autem inter omnes incuratiua tantummodo, sed eius, quam mediam inter vtranque locauimus, in præseruatiua, & curatiua. Iam enim factam, atque existentem ægritudinem curare oportet: sed quæ nondum quidem adest, at futura est, prohibendum est ne fiat ab ea quæ est in corpore dispositio. Eius autem quæ adhuc fit, quod quidem factum est curare opus est: quod autem futurum, prohibere ne fiat Prohibebitur autem sublata ea dispositione, quam sequi natura apta est. Talis vero dispositio causa antecedens appellatur. Facta autem ægritudo curabitur soluta ea dispositione à qua primum, ea quæ secundum naturam læditur operatio, quam qui

dam & ipsam morbi essentiam dicimus esse.

De communissima intentione curatiua.

Cap. lxxxix.

Curatio vero vnam præcipuam, ac communissimam habet intentionem, ad id quod est dispositio-
ni auferendæ contrarium. Ex hoc si-
quidem genere sunt causæ illæ omnes,
quæ sanitatem efficiunt. Secundum
partem vero, ex vnicuique dispositio-
ni contrariis. Calido igitur affectui,
causa frigida cōtraria existit, frigido
autem calida: eademque in ceteris pro-
portione. Etenim si omne imodera-
tū est præter naturā, moderatum ve-
ro secundū naturam: necesse est om-
nino, vt imoderatū ab imoderato cō-
trario ad mediocritatē redigatur. At
manifestū est quòd secundum poten-
tiam, non aut imaginationem: & ca-
lesciens, & refrigerās, & quæcunque alia
huiusmodi oportet assumere. Vo-
co aut scdm potētiā qd re ipsa vere ta-
le existit, quale esse dicitur. Secundū
imaginationē autē, quod ex prōpto

t iiii

quidem sensu tale esse imaginamur, cum tamen vere tale non sit. Sed quæ sint hæc ratione distinguenda, diximus in his libris, in quibus de simplicium medicaminum potestatibus agitur. Ad inuentionem autem salubrium causarum, quæcunque quidem, ut ad eam quæ iam facta est ægritudinem, causæ salubres existunt, via illa doctrinæ utendum, qua id quod imaginamur, ab eo quod talem habet potestatem, separetur. Quæcunque vero, ut ad eam quæ adhuc fit, & hac eadem via, neque illa præterea, ex qua ægritudinem causæ inueniuntur. Esto enim si ita contigerit in humoribus putrescentibus accendi febrem. Indicatio in huiusmodi est euacuatio, atque alteratio, hæc quidem quæ putredinem finiat manente adhuc substantia, euacuatio vero quæ totam ex corpore substantiam educat. Sed dicta quidem alterationis species concoctio existit, quam ubi inuenerimus à quibusnam causis fieri contingat, tunc utique eorum quæ hoc pacto salubria sunt scientiā tenebimus.

Euacuationes autem fiunt, & per sanguinis emissionem, & clysteris vsum, & per urinæ vias, atq; eam quæ per cutem fit trāspirationem, ac præterea per eam quæ fit ad partes oppositas attractionem, atq; ad alias propinquas deriuationem. Nā & ad hoc idem genus pertinet citare menstrua atque ora venarum, quæ Græci hæmorroidas appellant, aperire, ac per palatum, naresque expurgare. Cum igitur & hic materias inuenerimus, quibus in qualitate, & quantitate, & modo vsus adhibitis, euacuatio fit, in ipsa artis parte salubria inuenientur, atque eorum omnium inuentio traditur in eo volumine, quod de arte curatiua inscribitur. Eadem ratione in aliis tribus intemperaturis, si vnum commune præceptum obseruabimus vt vnamquaq; prius quæ efficit causam rescindamus: deinde ita ad illam, quæ ab eadem causa facta est, ægritudinem accedamus, causarum salubrium inuentionem faciemus. Secundū vero compositas intemperaturas ex simplicibus cōpositio cōmonstrabit

A R S

salubria praecepta, cum hic quoque stu-
derimus pro magnitudine intem-
peraturae eidem conueniens inueni-
re remedium. Veluti si ita contigerit
quod in decem quidem numeris ad
caliditatem maiorem ea quae naturae
conueniat, decidat corpus, septem vero
ad siccitatem maiorem: tunc salubre cam
in huiusmodi affectibus esse oportet
bit, decem quidem numeris frigidiorē
septem vero humidiorē. Si igitur ipsi
particulae patienti admoueat talis re-
mediū: tātō erit frigidius, atque humi-
dus, quantum exigit partis affectus
iudicatio. Quod si particula affecta
in penitioribus locis sita sit, machina-
ri oportet insuper tale inuenire salu-
bre remedium, cuius vis nequaquam
in itinere antea saluatur. Si itaque cali-
dus esse oportuerit, eo quod est mo-
deratum, non solum tantam habeat
caliditatem, quātam exigit morbus:
sed ultra eandem mensuram tantum
adiiciatur, quantum ex situ, ut pertin-
gere possit ad locum patientem, sit ne-
cessarium. Si vero frigidius: non sim-
pliciter tantum frigiditatem oportet

augere, sed & materia quoque prius est animaduertenda. Si enim crassa sit, non admodum poterit ad profunda penetrare: at potius cōtrarium præstabit effectum, spissando superficiem, atq; dēlando. At si tenuioribus partibus constet poterit sane plurimam subire pfundū. Idem in humectantibus, atq; exiccātibus accidit, in quibus crassitudo atq; subtilitas partiu substantiæ est inspiciēda. A situ qdem loci, vt nuper diximus iuenit indicatio salubre remedium. A formatione autem, & situ simul, quando effluxus sensibiles, atque ad alium locum foraminibus patentes habuerit, aut his omnino caruerint. Quos enī effluxus ad principales deferri partes cognouerimus, auertemus: atque ad illas impellemus quæ nullum habent principatum. Illud vero manifestum, earum quod quæ intemperatam efficiunt causarum, curatio fit p euacuationem. Nam ipsæ intēperaturæ sola alteratione sanantur.

Curatio solutionis continuitatis in parte carnosā. Cap. xc.

A R S

Continuitatis autem solutionis, curatio intentionem quidē habet vnionem, quæ in partibus quidem instrumentariis impossibilis est, in similibus vero non semper possibilis. At quandoque, sicuti in carnosissimis sanitas conglutinatione perficitur, nil vero differt, neque si coalitum appellaueris. Ipsam vero antecedit, quando vulnus maius extiterit partiū applicatio distantium, quæ ex formationis genere existit. Vt autem hæc ipsa firma, ac stabilis fiat, & alligatio cogens in vnum quæ distant, & fibulæ, & futuræ vtilis sunt. Coalescere autem facit ea, quæ inuicem distant, ac pristinam restituit vnitatem ipsa natura. Nostrum vero opus est, vt diximus, applicare extrema distantium partium, atq; ita vt in vnum coacta sunt, conseruare, & tertio loco cauere ne quid labris vlceris intercidat, & quarto ipsam partis substantiā conseruare salubrem: sed quo pacto & primum, & secundum impleamus officium, dictum est. Tertium vero in cogendo in vnū partes distantes exe-

MEDICINALIS. 151

quemur, si nihil extrinsecus incidere permittamus, quoniam sepius usu euenit, ut pilus, aut oleum, aut aliqua alia humiditas interueniens earumque copulanda sunt, partium, unitatem impediat. In eo autem quod sequitur tempore per suffluxiones tertia intentio retinetur. Ipsam vero suffluxionem ex eiusdem, & contrarii loci diuisione, & figura opportuna comparandum. Partis autem substantiam salubrem cum mediocriter excantibus conseruabimus. Hæc quidem est solutæ continuitatis curatio, cum ipsa sola seorsum in carnosa parte constiterit. Quod si alicui alteri morbo coniungatur, plures sunt indicationum intentiones: quas in compositorum vel complicatorum, siue ut cuique appellare libuerit, doctrina trademus. In præsentem autem sermonem ad reliquas unitatis solutiones accedendum.

De solutione continuitatis in osse.

Cap. xci.

FRactio igitur est continuitatis in osse solutio: quæ quantum ad in-

A R S

tentionem primam insanabilis existit: quoad secundam vero quodammodo sanabilis fit. Prima igitur intentio est coalitus partium, qui ob ossis duritiem fieri non potest. Secunda, alligatio quæ fit collo supernato partes fractas alligante. Calli autem generatio qua quidem ex materia, & à natura fit, est & ad alia communis. Qua vero formam ossi vicinam habet, ex eiusdem fit alimento. Molle vero, & puerile os coalescere potest. Sed perraro fit talis affectus, quin cū altero societur. Magna enim ex parte muscoli adiacētes vnā corporibus aliis fractis ossibus partiuntur. Quare & curationis intentio oritur duplex, quarum altera quidem circa ossa, altera vero circa corpora adiacētia versatur. Sed hæc quidem in carnosarū partium complicatis dicetur affectibus, nunc vero de fractionibus dicendum. Quoniam enim harum sanitas callositate procuratur, vt callus generetur, proprii ossis alimenti superfluitatem naturæ suggerere oportet: hæc vero superfluitatem in qualitate, ac

MEDICINALIS. 152

quātitate seruare modū ē necessariū.
vnde & ratio victus ē adhibēda: quæ
tātū ac talē influere ossibus sanguinē
præparet, qualis, & quātus generādo
callo fit opportunus. Qm̄ vero p̄ fra-
cti ossis cauernas idē effunditur san-
guis eiusdē qualitātē, & multitudinē
aiaduertere oportet: atq; ita vel siccio-
rē, vel humidiorē victū instituere. S d
hæc oīa in libris, in qbus de curandi
rōne tractatur, pleni⁹ sunt explicata.

De punctura nerui, & chordæ.

Cap. xcii.

Nerui vero, & chordæ punctura,
propter sensus vehemētiā, & quo-
niā hæc pars principio continuatur,
prōpta ē ad neruorū cōuulsionē exci-
tandā: ac tum præsertim, cū nihil ex-
trorsum expirat obcæcato cutis vul-
nere. Aperiendū est igitur, atq; exiccan-
dū substantia tenui, q̄ vsq; ad ima ner-
ui offensi possit penetrare. De his ve-
ro exacte dicimus ī libris de arte amā-
di cōscriptis. In simplicibus qdē huius
generis affectibus, salubriū causarū for-
ma talis existit. In cōpositis vero cō-
plicatur vlceribus, prima qdē cavitās,

quam non alterum affectum, sed vl-
 ceris differentiā esse arbitrantur. Est
 autem non differentia huiusmodi
 res, sed alterum aliquod totius ægri-
 tudinis genus, in quo ipsius substan-
 tiæ iactura facta est. Et quidem cura-
 tio in duplici morbo, duplicem exi-
 git intentionem. Nam continuitatis
 solutio vnitate: substantiæ autem ia-
 ctura, generatione indiget. Paulo ve-
 ro supra generationis intētionem ex-
 positę sunt. Quod autem primū qui-
 dem hūc affectum oporteat sanare,
 demū vnitatē restituere tentare ipsa
 rerū natura cōmonstrat. Cū itaq; re-
 pletū quidem fuerit cauū, vlcus vero
 ad æqualitatē perductū, alterā inten-
 tionem aboleri cōtingit. Nam media
 existente inter labia vlceris ea carne
 quæ nuper est genita partes quidem
 distantes vniri est impossibile, vnde
 fit vt alia sit intentio perquirenda.
 Intentionē autē consequemur, ex eo
 quod est secundū naturam ipsi parti
 comparando, erat autem eidem cute
 obduci naturale. Quare hoc ipsum à
 nobis procurandum, aut si hec intē-
 tio

MEDIC
 tio effectum
 aliquid cu
 nature v
 autem h
 similitud
 cem par
 emtent
 adingera
 solides a
 do quide
 medicam
 vndem
 quibus
 plurim
 tio, vel
 vel mal
 prius en
 ter, ear
 prius exp
 cessu
 neu
 do h
 cum
 rici
 his q
 De
 fua

orio effectum sortiri non potest simile
 aliquid cuti, carnem scilicet quę cutis
 naturę vicina sit, instaurandum. Est
 autem huiusmodi q̄ & sicca, & callida
 similitudinem prę se fert. Ad cicatri-
 cem igitur obducendam necessaria
 erunt exiccantia, ac sine mordacitate
 adstringentia medicamina. Ita & si
 sordities aliqua fuerit adnata inten-
 tio quidem erit abstergerendi, & erit
 medicamen salubre abstersiuum. Eo-
 rundem vero materiam in libris, in
 quibus de medicaminibus agitur, scri-
 psimus. Et quidem si aliqua inflama-
 tio, vel attritio, aut tumor prædurus,
 vel mollis, & laxus cum vlcere fuerit,
 prius eorum curationi intēdere oportet,
 eas sequendo vias, ac rōnes quas
 prius exposuimus. Sic & si aliquid vl-
 ceri illabitur, ad illabentium curatio-
 nem intendendū. Eodem pariter mo-
 do si aliqua intemperies vlceratū lo-
 cum obsederit, ad eiusdem intempe-
 rie remedii antea veniēdum. Sed de
 his quidem satis.

De speciebus morborum secundū
 formationem., Cap. xciii.

Nunc vero trāseundum est ad formationis genus, quod in plures secatur differētias. At ab eo quod euidētissimum existit, exordium est sermonis faciendū, quod ex figurę permutatione cōtingit. In his igitur qui adhuc crescunt, possibile est plurium partium figurā emendare: in his autē qui iam aucti sunt, in minime. Intentio tamē quoad fieri potest, curationem adhibere ad contrarium euerfionis, adducendo. Si vero frāctione aliqua non recte cōformata, alicuius mēbri figura fuerit vitia ta, cui substātia callosa īnāsci prāuenerit, si quidem hęc adhuc recens extiterit, perfringere oportet, ac rursus recte afformare, deinde callum superinducere.

De obstructione.

Cap. xciiii.

Est vero & obstructio ex eodē genere ægritudinum, quæ quidē ex lentis, & crassis humoribus fit, vnam & ipsa habens intentionem morbo cōtrarium. dico autem apertionem. Cause vero salubres sunt abstergetia, atq; incidentia medicamina. Quæ vero fit a stercore duro, quod intersepit

intestinum, primum quidē habebit
duritie remediū ex humidis, pingui
busq; clysteribus, demum ex acribus
euacuationē exposcet. Quę aut à lapi
de sit in vesica, in presenti quidē trās
positionē requirit, integre vero sani
tatis causa incisionē, & extractionē.
Humiditas aut quę præter naturā con
tinetur, sanatio in oīmoda euacua
tione cōsistit, quēadmodum etiam in
suppuratis. Immodica autē repletio
imodica euacuatione curatur, vt cū
sanguis intra venas redundat. Sic &
quibuscunq; in ventriculo, vel intesti
nis, vel arteria aspera vel pulmone,
pus, aut sanguis continetur, integra
euacuatio est necessaria: superflui aut
cibi, aut potus adhuc recentis assump
tio euacuatiōe corrigitur. Quęcūq;
igitur in pulmone, vel pectore conti
nentur, cū tussi educuntur, aut à medi
caminibus extenuantibus. Quęcunq;
vero in hepate, vel venis, vel arteriis,
vel renibus, aut per vrinā, aut per ven
triculū. Sed per vrinā quidē, ab his q̄
vehemēter extenuant. per vētrē vero,
ad his quę attrahēdi, aut apiendi ora

vim hñt. Quęcunq; vero in superiori
 ventre comprehenduntur, per vomitum:
 quę autem in inferiori, per subductionem.
 Sed quęcūq; sub cute per sectionem,
 vel ignem, aut per medicamina adurentia. Sic vero aliquādo
 quęcunq; in aliqua naturali cavitate,
 vt in thora ce. Et vt summatim dicā,
 quicquid præter naturam ī aliquibus
 partibus continetur, sanationis intentio
 est ablatio: quę si fieri non possit,
 transpositio. Quę vero non sunt ex
 genere præter naturam, at quantitate
 dānantur, in his intentio est abeuctio.
 At inuētio eorum quę ad ipsorum
 sanationem perducunt, partim
 quidem ex affectu, sed præcipue
 ex ipsis affectis particulis sumitur.

De asperitate & leuitate.

Cap. xcv.

Quęcunque partes vero ob id
 quod exasperatæ naturalem
 amiserint habitum, his leuitas
 naturalis est restituenda, ossa qui
 dem leuigando, arteriam autem, &
 linguam leniendo, humidis quę ni
 hil mordeant, & lentorem habeant.

sed quibuscunq; leuitas inest non naturalis asperitas est reuocanda medicaminibus, quæ sufficiēter abstergāt, & parum adstringant. Quæcunq; vero, vel obstructiōes, vel angustie meatuum, alias sequuntur ægritudines, ab illarum curatione prius est incipiendum. Ostensum siquidem est in libro de differentiis morborum, quod & inflammationibus & duris, laxisque tumoribus, & siccitatibus, aliquando in modicis, ac præterea vitiosis partium continentium figuris, ea quæ nuper diximus, sæpius adueniunt: siue cuti & quibusdam tumoribus eorum quæ sunt in ambitu corporum. Quod si nonnulla ex proxime dictis inuicem complicentur, varias habebunt indicationes. Sufficiet autem in vno exemplo habuisse sermonem, quoniā de omnibus in libris de arte curandi plenius sumus exequuti. Supponatur cuiuspiam particulæ multitudinem sanguinis influi, adeo vt intenduntur in ea venæ, non maiores tantum, sed etiam parvæ, quæ prius sensum effugiebant, nunc vero iam plenæ visu

ARS
comprehenduntur, sicuti plærunque
in oculis ob tunicæ albedinem mani
festissime patet: par siquidem ē quòd
& alia vasa quæ latent sensum, iam
plena distendantur, nondum & ipsa
ob paruitatem visui manifesta: & iā
periculum imminet, ne quod ex va
sis exudat, ad spacia vacua, quæ in
medio sunt, effundantur, aut ne iam
paucum aliquod sit effusum. Huius
quidem affectus sanatio intentionē
habebit euacuationem, aut (vt mani
festiori vocabulo vtamur) abuacua
tionem: siquidem morbus erat im
moderata partis repletio. Necessariū
igitur est, vt aut superfluitas retroce
dens euacuetur, aut per ipsam patie
tem particulam. Retrocedet autem,
vel impulsa, vel attracta, vel transmis
sa, vel horum vno aliquo modorum
vel omnibus. Per locum vero patien
tem euacuabitur, partim quidē mani
feste, & sensibiliter, partim vero in va
pores resoluta. Si igitur vniuersum
corpus plus æquo plenum fuerit, per
patientem locum minime euacuan
dum. Nam si sacrficationibus, aut se

tionibus sensibilibus euacuabimus. plus ratione excitati doloris attrahemus. Si vero calefacientibus dispergere tentabimus, plus erit id quod vi caloris ad partem attrahetur, quam dispersum. Quod si in eo elaborabimus, ut quod influxit retrocedat, corpus plenum non admittet. Ad hæc igitur ambo totum corpus euacuare oportet, aut omnino ad contraria loca retrahere quod patienti particulæ influit: quo pfecto opere, prius à pte repellendū, mox dispergendū. Quanto enim p minora fit, tãto expeditior ē euacuatio. A patiēte vero loco adstringendo, ac refrigerando, repellemus: sed & exinanita loca attrahūt ad se ipsa quęcūq; reperiuntur. Hoc siquidem ostensum est in eo volumine, in quo de potentils naturalibus agitur, & vasa præterea vigore ex medicaminibus adstringētibus addito, a se ad alia remittent. Si igitur hac via superfluum oē retrocesserit bene se res habet. At si aliqd fuerit in pte retētuū, cōiecturādū erit id lētū ac crassum existere: atq; ea ratione iam coactum, atq; ad

strictum, vt cum difficultate solui pos-
sit. Fieri autem potest, etiā si non eius
naturæ sit, vt ad spatia quę in medio,
sit effusum: in quo casu tunc ad id ve-
niendum esse tempus suadet, vt hoc
ipsum quod reliquum est per patien-
tem locum euacuemus, imponendo
supra iacentibus partibus ea, quę in-
fluentem humorem repellendi vim
habent. Maxime vero euacuabis, si
in spatiis intermediis aliquid conti-
neri coniectura assequeris, & scarifi-
cationum auxilio, & medicaminum
quę vim habeant dispergendi. Sed
quoniam hæc omnia vires calidas ha-
bent, eiusdem vero tēperaturæ opus
est mordere quando modum exces-
serit, cauenda ex eis sunt vehemen-
tissime calida, ac tum præsertim, cum
patiens locus inter summa fuerit. ne-
que enim paruus excitabitur dolor,
si præter proprium affectum insuper
mordeatur, omnisq; præterea dolor
fluctiones commouet. Quodd igitur
mediocrem caliditatem obtinet, in
his sensum doloris non inuehit: atq;
eo amplius omni dolore vacat, si hu-

midum extiterit. Et quidem quicquid per summa hæret, potens est id medicamen dispergere: quod etiã validas non habuerit ad dispergendũ vires.

Quodd si summæ quidem partes omni noxa caruerint, id vero quod euacuari oporteat in penitioribus partibus fuerit: intendendus, atq; augẽdus dispergẽtis medicaminis calor, cum dubitandum sit ne priusq; profundas attigerit partes, interim vires amittat: neq; tamen ex eo superiores partes aliquem dolorem sentient, cum omni vacent affectu. Quare nunc hæc duo simul inuitant ad calidiorum pariter, atq; acrium medicaminũ vsum, & summæ partes quæ tolerãt, & profundę quę egent. Hęc igitur ex patiente particula indicatio assumebatur.

Deinceps vero, si quid ad sanitatem deficiat, consideremus. neque enim paruum aliquid deesse videtur. Affectę partes in quibus fluctionis superfluitas retinetur, nonnullę quidem rare, & laxę, & molles natura existunt: nonnullę autem densę, & pressę, ac durę. Priores igitur facile euacuãtur,

ARS

reliquæ autem acrioribus euacuantibus, ac præterea tenuiores partes habentibus, egent: atque eo etiam magis, quanto profundiorē situm habuerint. Hæc igitur tibi rursus sit indicatio, altera à particulæ patientis substantia: alia vera à formatione simul ac situ. Supponatur enim, si ita contigerit, in hepate esse proxime dictum affectum, in angustiis vasorum finibus intrusis humoribus, qui vel lenti, ac tenaces, vel crassi existant, vel superabundent. Nonne in promptu est, primum quidem crassitiem, unà cum lentore, & tenacitate, cibis, ac potibus extenuantibus, ad subtiliorum partium substantiam transferri oportere: Secundo autem loco non per angustos, atque inuisibiles, sed latiores meatus quicquid infestum existit, esse euacuandum? Sunt enim in hepate venæ non minus amplitudine, quam numero excedentes: terminantur autem hæ quidem in gibbis ad venam cauam, hæ vero in cauis ad portam. Vnde haud difficile tibi futurum ubi cumque pressi, ac stipati humores fuerint

MEDICINALIS. 158

eosdem expedite euacuare, trahēdo quidem ad ventrem cum his quæ attractendi vim habent medicaminibus, quicumque ex ipsis in venis ad caua hepatis pertinentibus acervati, ad vrinę vero meatus promouendo per cauam venam quicumque in venis ad eam pertinentibus sunt. Sed præter supradictas alia est indicatio ab hepate ipso, veluti a venarū principio. nam cum non tantum seipsum regere natura aptum sit, vt pleręque animalis partes. sed venis præterea virtutem largiatur, periculum imminet, ne si eius vigor madefacientibus, ac relaxantibus, cataplasmatibus fuerit resolutus: & ipsum primū, ad suū opus atque omnes subinde venę eius ratione imbecilles efficiantur. Quare in eius curationibus aliqua ex astringentibus medicaminibus miscere oportet. Sed quoniam in profundo admodum loco situm est, dubitandum erit ne astringentis medicaminis vis debilitetur: nisi ab aliqua altera subtiliū partium substantia, qualis aromaticum est, traducatur. Melius vero

ARS

fuerit, si & ipsum adstringens medicamentum vnum protinus ex aromatum genere fuerit: nam si duas habuerit natura insitas qualitates: ac potestates valentius operabitur. Et quidem euacuetur quod præter naturam in membrum confluit. Seruet autem humorum modum naturæ conuenientem. Quare & illa animaduersio à nobis est adhibenda, ne quid ab humoris confluentis qualitate, eiusdem membri temperies sit alterata, si pituitæ naturam tenuerit ad frigiditatem, si vero bilis ad caliditatem, ut hæc ipsam curantes intemperiem sanitati restituamus. Curabimus autem contrariam ex aduerso afferentes qualitatem: quæ admodum in intemperaturarum curationibus diximus, quantum vnum quodque calidius, aut frigidius factum est, tantum refrigerantes, aut calefacientes. Quare ut hic rursus agnoscenda est ipsius secundum naturam temperies. Nam quo pacto sciemus quantum in frigiditate, ac caliditate à naturæ modo recesserit, aut quando à frigefaciendo supersedebimus, si nos la-

tuerit ea quæ est secundum naturam caliditas: Ita vero & si frigidius effectum calefaciemus, ignorantes frigiditatis naturalis modum: neq; opportune calefacere, neq; in tempore à calefaciendo desistere poterimus.

De morbo secundum numerum.

Cap. xcvi.

SEd quoniã de his satis diximus, transire iam tempus ad ea in quibus numerus non est secundum naturam. Cum vero duplex sit eorũ differentia quibus quidem aliqua particula deficit his, intentio est alteram efficere subministrando naturæ, eo quo diximus paulo ante, modo. At quibus superabundat, hanc resecare oportet, aut ferro, aut igne, aut medicamine, quod vrendi vim habet. Hęc igitur omnia sanare possibile est: at non æque omnia generari possunt, vt in libro de semine diximus. Quædam vero sunt, quæ & si generari nõ possunt, licet tamẽ pro ipsis alterum efficere: quemadmodum in osse ex toto sublato, alteram substantiam in eius sede reponere, à carne, atque osse

differentem. est enim quæ in eius gignitur loco quædam veluti caro callosa vel callus carnosus, & processu temporis magis, ac magis ad calli duritiæ transfertur, cū ab initio carnis potius imitetur naturam. Quacūq; præ sublata, cum neq; eandem secundum speciem substantiam, neq; similem efficere possumus, tertia nobis intentio quædam decorem inuenire, quemadmodum in mutilationibus.

De morbo secundum magnitudinem. Cap. xcvi.

Communicat autē hoc genus totum cum eo quod ad magnitudinem pertinet. Nam quodcūq; ex eo est secundum naturam, illi propinquū existit. Id vero tantum seiunctum est, ac separatum, quod inter ea quæ sunt e genere non naturali cōnumeratur: in quo quidem prima intentio est ablatio. si vero hæc impossibilis existat, secunda est transpositio, quemadmodum in suffusionibus. Quæcūq; vero non integris partibus, sed partium tantummodo particulis deficiūt, aut excedunt naturæ modum: resectio

quidem, vel generatio in his quæ deficiunt, ablatio vero, & abolitio in his quæ superabundant. Quare neq; in ipsis altera inuentio, neq; medicaminum forma genere diuersa.

De morbo secundum situm.

Cap. xcviij.

Sed iam veniendum est ad reliquum salubrium causarum genus quod ea corpora emendat, quæ in situ sunt vitiosa: veluti luxationes, & intestinum in scorto. Fit autem hoc ex violenta tentione, atque impulsu. Hoc vero ex dilatato, ac rupto continente. Quare & duplex sanandi modus: alter quidem ad oppositam partem ei a qua facta est permutatio, intendendo, atque impellendo: alter vero id quod continet firmitus solidiusque reddendo. Quibus vero viis, ac rationibus singula inueniri possunt, in libris de arte curandi explicauimus.

De causis præseruatiuis.

Cap. xcix.

Consequens est, vt ea omnia exequamur, quæcunq; in superiori

A R S

sermone dicere distulimus. Vocant
autem eadem præseruatiua. Est au-
tem horum triplex secundum genus
differentia. Prima quidem hominis
qui integra fruitur sanitate: secun-
da vero eius qui non integre valet:
tertia eius qui ægrotat. Primum igitur
genus ad salubrem attinet ar-
tem, atq; in duas, vt antea diximus,
diuiditur partes: secundum vero ad
præseruatiuam spectat: tertium ad cu-
ratiuam. Hoc autē vniuersum genus
circa humores præcipue negociatur,
quos neque lentos esse oportet, neq;
crassos, neq; aquosos, neq; plurimos,
neq; vehementer calidos, ac frigidos,
neq; mordaces, neq; putredini obno-
xios, neq; veneni nature affines. Nam
vbi aucti fuerint, generant morbos.
Augentur vero nōnunquam eadem
ex causa quæ ab initio generauit. Il-
lud autem plærunq; accidit, vt sua al-
teratione inficiāt eos qui sunt in cor-
pore humores. Intentio vero, & ho-
rum sanationis duplex existit, altera-
tio, atq; euacuatio. Alterantur igitur,
vel ab ipso corpore concocti, aut ab
aliquibus

aliquibus aliis facultatibus quæ vim
 medicaculam habent: è quorum nu-
 mero etiam sunt ea quæ exitialium fe-
 rarum venenis aduersantur, ac præte-
 rea pharmacha quæ venena appellā-
 tur transmutant. Euacuantur autem
 satis calidis medicaminibus, & pur-
 gationibus, & clysteribus, & sudori-
 bus, & vomitibus. Hæ quidem igitur
 sunt cōmunes euacuationes. Propriæ
 autem ex locis in quibus coaceruan-
 tur, assumuntur, vt in libris de salubri-
 bus ostendimus: tertio præsertim, ac
 quarto, in quibus de lassitudinibus
 egimus, ac reliquis dispositionibus q̄
 lassitudini natura proxime sunt. Pro-
 ptius enim euacuantur per ventrem
 quęcunq; in primis venis continentur
 superfluitates. quæ autem in his quæ
 in hepate sunt, per vrinæ meatus. at
 quæ in toto corpore, per sudorem. si-
 cuti quæ in capite, vel per palatū, vel
 per nares, vel per vtrunq; quæ vero
 sunt in spatiis pectoris laxioribus, p
 guttur simul cum tussi. quæ in renibus
 sunt, vel vesica per vrinam. At trahē-
 di ex omni loco ad oppositas partes

communis indicatio est, ad quam maxime distantia. deriuatio vero ad vicina. Quæcunque vero huiusmodi curât dispositionem causas salubres appellamus: sicuti insalubres eas quæ adaugent, & neutras quæ neque ob sunt, neque iuuant. Posset vero quispiam, neque omnino causas appellare, quemadmodum maior pars philosopharum, qui rerum quidem differentiam inuenire contemnunt: plurimum vero temporis in nominibus conterunt, contra quos in aliis vberius disseruimus. At pars quidem artis præseruatiua talis est.

De parte artis quæ conualescentes reficit, & senibus congruit.

Cap. c.

Quæ autem reficit, atque restau-
rat, in conualescentibus, ac senibus locum habet. Quæ vero sit horum dispositio, & a quibus præcipue causis, ad naturalem redu-
citur habitum, in libris in quibus de medendi arte tractauimus, abunde explicauimus, sed nunc per capita dicitur. Dispositio quidem igitur talis est

optimus quidem, sed exiguus est sanguis, atque vnà cum ipso spiritus animalis, atque vitalis. Ipse vero particulae solidae ficciores, & idcirco eorum vires sunt imbecilliores, atque earundem ratione corpus vniuersum frigidius. Causae vero salubres quae hanc emendant dispositionem, ut vno comprehendam capite, sunt quaecunque praesentaneum, atque securum exhibent alimentum. Secundum partem autem, in motibus moderatis, & cibis, potibusque, ac somnis consistunt. Sunt vero motus materiae, vehiculae, ambulationes, frictiones & balneae, & ubi non parum se ex his processibus se senserint, paulatim se ad consueta opera transferant. Cibos autem assumant, in principio quidem humidos, & concoqui faciles neque frigidos, ac cum progressi fuerint, eos et qui plurimum praestant alimentum. Potus vero opportunus est vinum, etatem quidem habens mediocrem, in substantia autem purum, atque plucidum: quod scilicet vel subflauum, vel subalbum existat, atque suauiter oles. gustum vero, neque aqueum omnino, neque cum

aliqua insigni qualitate, aut dulcedi-
 ne, aut acritudine, aut amaritudine
 sentiatur. Vt autē proxime diximus,
 de hisce omnibus in libris de arte cu-
 randi cōscriptis, plenius disseruimus.
 Nunc enim neq; omnia particulatim
 recensere est nostri propositi institu-
 tum, sed solum capitum mentionem
 facere intendimus, eorum quę in aliis
 voluminibus latius explicauimus.
 Quorum omnium si prius, & nume-
 rum & qualitatem exposuero, finem
 libro imponam. Diximus itaq; prius,
 quod alter est liber in quo de constitu-
 tione artis medicinę disseruimus: an-
 tecedunt autem eum alii duo de con-
 stitutione artium, sed hi quidem vnā
 cum hoc cui nūc extremam manum
 adiecimus, seorsum sūt ab aliis libris
 in qbus plenior doctrina explicetur.
 Illi vero talem inter se ordinē habēt.
 De elementis quidem secundum Hip-
 pocratem liber vnus. Post hūc autem
 tres de temperaturis, ex quibus quidē
 duo sunt de temperaturis animalū,
 tertius vero de his quę simpliciū me-
 dicaminum sunt. Quam ob rem &

tractatum illū in quo de simplicium
medicaminum potestatibus agitur,
nemo recte intelligentia assequi po-
test: nisi prius tertii libri de tempera-
turis integram cognitionē fuerit ade-
ptus. Est & alius liber parvus qui ordi-
ne sequitur duos priores alios de tem-
peraturis. inscribitur autē de inæquali
temperatura. Similiter autem, & hūc
alii duo parui, alter quidem de opti-
ma corporis constitutione, alter de
bono habitu. Alius vero tractatus est
qui tres complectitur libros de poten-
tiis naturalibus quē si quis legere ve-
lit, post librum de temperaturis, siue
post librum de elementis, vtrunque
erit consentaneum. Post hunc in plu-
ribus aliis libris de operationibus ani-
malibus disseruimus. sed quoniam ad
earum demonstrationes non parum
conferunt quæ per sectiones ostendū-
tur, in illis exercitari oportet. Est au-
tem maxime inter alios utilis ille tra-
ctatus qui de sectionum aggressibus
inscribitur. Alii autem sunt post eum
plures, duo quidem de discordia se-
ctionis, vnus vero de sectione mor-

tuorū: post quos sequuntur hi in quibus agitur de sectione viuorum. In aliis vero quibusdā particulatim ob eos scripsimus qui introducuntur de ossibus: sectio quoque musculorum, & neruorum, & arteriarum, & venarum, & quaedam alia huiuscemodi ex eodem numero existunt. & liber etiam in quo quæritur nunquid in arteriis continetur sanguis naturaliter. Qui vero earundem partium operationes demonstrant, duo quidem sunt de motu musculorum: tres autem de pectoris, & pulmonis motu: post quos sequitur liber de causis respirationis, post hunc liber de voce. De principatu autem animæ, & de omnibus aliis quæ de naturalibus, vel animalibus operationibus in quæstionem trahuntur, in longo volumine scripsimus, qui de dogmatibus Sorcratis, & Platonis inscribitur. At eiusdem generis contemplationem pertinet liber, de semine seorsum cōscriptus, & amplius, de sectione secundum Hippocratem: quos omnes ordine sequitur tractatio de vtilitate partium.

Ad dignoscēdas autem ægritudines,
 utilis est liber in quo de membrorū
 passionibus agitur. itidem & ille in
 quo de pulsibus scribitur, in quo &
 præcognitiones edocemus. Librum
 vero de pulsibus præcedunt alii duo,
 alter qui de usu respirationis, & qui
 de usu pulsuum. Is vero de pulsibus
 in quatuor diuiditur partes, primam
 quæ eorum differentias, secundā quæ
 dignotiones, tertiam quæ eorum cau
 sas, quartam quæ illam quæ per eos
 dem fit, continet præcognitionem.
 Ex eodem genere est ille qui his qui
 introducuntur, de pulsibus scriptus
 est. At vero in animo est alium scri
 bere librum, veluti quoddam omni
 um istorum, compendium, quem in
 scribam, vel artem de pulsibus, vel
 compendium. Ad hanc quoq; iuuant
 contemplationem, quæ à me expo
 nuntur, & simul iudicantur in libro
 Archigenis de pulsibus. Ad præco
 gnitionem autem plurimum confert
 liber de crisi bus, idest decretis nature,
 quæ præcedit alter de decretoriis die
 bus. Sed liber et qui de difficili hanc

A R S

litu inscribitur, & ad dignoscendum
 præsentem affectum, & ad præscien-
 da bona, vel mala quæ ægrotati sunt
 euentura, conducit. Hi igitur omnes,
 atq; vnâ cum ipsis tractatus quidam
 vno tantum libro cõprehensi cogno-
 tu vtilis sunt, sicuti illis qui de præin-
 cipientibus causis inscribitur, & de
 medicinali experientia, & de exte-
 quante victu, & qui de uenarum se-
 ctione ad Erasistratum, & qui de tu-
 moribus præter naturâ, & qui de mul-
 titudine, atque alii præterea similes.
 Præ cæteris autem ad curandi scien-
 tiam maxime necessarius existit qui
 de morborum differentiis agit, & de
 accidentibus, & tertius præter illos in
 quo morborum causas, explicauimus:
 post quos sunt tres alii qui acciden-
 tium causas explanant. sunt etiam de
 medicamentorum simplicium viri-
 bus libri, de quibus supra meminimus,
 & qui de medicamentorum compo-
 sitione: quos sequuntur libri de arte cu-
 randi, his qui de salubribus inscribun-
 tur, seorsum à nobis cõscriptis. Quod
 vero ante hosce omnes prius exerci-

tari oporteat, in libris de demonstra-
tione. Si quis hanc artem cum ratio-
ne sit tractaturus, monstratum est à no-
bis in libro qui de optima inscribitur
hæresi. De aliis autem libris, & com-
mentationibus à nobis scriptis, tran-
sfigere nunc minime necessarium, cum
de hisce omnibus alibi simus tracta-
turi in vno fortassis, aut duobus libris
qui ita inscribentur, Galenus de volu-
minibus ab eo inscriptis.

FINIS.

HIPPOCRATIS COI DE
MEDICO, MEDICIVÆ
OFFICIO, LIBER.



ITERA quidem me-
dici moderatio est, pro-
stasiaue, mandatumq;
quo pacto medicū mu-
nus parari, tractari, &
exerceri conueniat. Medici quidem
moderationem, prostasiamue hanc
esse ducimus, prospicere, quatenus
suapte natura possit, corpore sano,
validove, colore optimo, habitioREQ;

HIPP. DE MEDICO

vti esse studeat: siquidem vulgo cense-
tur, qui male sui corporis curā habe-
at, ceteros non bene curaturum. Præ-
terea corporis mundicia, vestiū non
suspectis ad omnia odoris vta-
tur, quod languentibus gratissimum
est. deinde prudenti, pudenti, & inte-
gro animo, moribusq; esto. Non solū
taceat quæ tacenda sunt, mores autē
probi & optimi sint: sed etiam quan-
tum ad vitam pertinet, moderatam,
benēq; dispositam habeat, quod plu-
rimum ad auctoritatem comparan-
dam facit: mores autē probi & opti-
mi sunt, quod omnibus colendū &
amandum reddit. Petulantia nāq; &
garrulitas despicitur, & si admodum
vui, vtilis ve videatur, & sit: faculta-
tes autem, opes ve respectato, cōside-
rato ve, quæ apud habentes raro æsti-
mantur, amantur ve. Schemasi vero,
formis ve, siue figuris, gestibus ve cō-
positis languentes addito: prudentiā
quidem vultus præ se ferat lenem, mi-
tem ve, non asperam, acerbam, ama-
ram ve: nam hoc non probi, sed im-
probi & audacis, hominisq; perosi,

MEDICINE OFFICIO 166

spernentisq; esse videtur. Qui autem
 in risum solutus est, & nimis letus est,
 molestus languentibus est. Quam ob
 rem medium seruat, parq; & aqua
 bilis in omni consuetudine esto: nam
 languentibus paritate quadam, & iu
 stitia in multis succurrendum est nec
 parua est conciliatio, beneuolentia ve
 languentium erga medicos, si quidem
 totos sese illis dedunt. Præterea medi
 cus omnibus horis, fœminis, virgini
 culis, rebusq; non parui momenti oc
 cursat, quibus oïbus manus, oculosq;
 abstinentes habeto, sicq; & corpus &
 animum paratū, dispositum habeto:
 mandata vero, præcepta ve, quæ ad
 medicam artē pertinent, per quæ eius
 artifex dicendus est, hæc sunt, vti cum
 discere, medicāq; artem exercere cœ
 perit, studeat, discat, sciant ve, quæ ad
 munus medicū pertineant. Primum
 habitationis locum agro cōmodum
 deligat, quo nullus malus ventus mo
 lestet, solisq; lumē, splendor ve per or
 tum non deferat. Lumē enim procul
 & perpetuo tenore lucens, & his q cu
 rant necessariū est, & his qui curan

HIPP. DE MEDICO

aur molestum. Lucemq; eam omni-
no sectetur, quæ nihil oculis officiat,
no ceatue. Lumē autem, vti sectemur,
mandatur quodd contra faciē visum
que non sit, nam aciem oculorum de-
bilitat, perturbatque: minima siqui-
dem causa debilitatos oculos per-
turbat, lumine itaque sic vtatur. Se-
dilia postea æque alta habeto, vt qui
in illis sedeant, sibi æqualiter conue-
niant respondeantue, nihilque æne-
um habeto præter instrumenta ad
rem medicam necessaria. Siquidem
hic luxus molestus, & ambitiosus mi-
hi videtur his apparatus, vasibusue
vti. Puram autem, limpidam, bonā,
potui commodam his qui curantur
aquam præbeto. Linteis autem pan-
nis quibus tergantur, mudenturue,
puris, mundis, mollibus, vtitor: caus-
sa autem oculorum ad oculosue te-
nuibus, mollibus linteolis, spongiis
autem ad vulnera: hæc enim per sese
probe auxiliantur. Cuncta autē in-
strumēta vsui necessaria parata sun-
to magnitudine, pondere, tenuitate,
subtilitateue cōmoda. quæ vero por-

MEDICINE OFFICIO 167

riguntur cuncta vti conferant, operā
 dato, potissimū autem quæ parti ali
 cui laboranti admouentur: quæ sunt
 vincula, medicamēta, circaq; vulnera
 liteola, lineamenta ve, emplastra, lini
 menta ve. Hæc enim plurimū tēporis
 in partibus, & locis affectis cōmoran
 tur: siquidem post hæc, horum remo
 tio, refrigeratio, perpurgatio, aqua
 rum ablutio, parui cuiusdam tempo
 ris sunt. Si quidq; præterea aliud plus,
 minus ve alicubi peragendum sit, cō
 siderato. Hæc enim si fiant vel non
 fiant, cum vsus est, magnam habent
 differentiam: colligatio quidem, deli
 gatio ve, peculiaris & propria est me
 dicæ artis qua deligatus iuuatur. Hæc
 autem duo potissimum profunt, qui
 bus crebro vtendū est premere, strin
 gere ve, cum & vbi oportet laxiusq;
 superligare. quo autem ad anni tem
 pora, quādo supertegere, optimeque
 conuoluere, & quando non oporteat
 diligenter considerato, ne quauis ho
 rum obliuione lædatur, debilitetur ve
 languēs, vel quod affectum est, quod
 cum vsus fuit, factum non est. Super

HIPP. DE MEDICO

ligationes autem, deligationes ve pul-
chras, spectandasq; cōtemnito. Mole-
stum enim hoc est & ostentatorium,
iactabundū ve, sapiusq; curatū lædit:
languens enim vtilitatē non ornatū
captat. Manuum autem opere chirur-
giæ ve est, quæ secanda vel vrēda sunt
celeriter, vel tardē pro vsus necessita-
te peragere: quæ æque laudantur. Nā
horum vtrorūq; vsus est, quoniam in
quibus opus est vnica secatione, ma-
nuum opera celeriter peragatur, diui-
sio, separatio ve, siue secatio prodest.
Siquidem quod sectos iuuat vel mo-
lestat perneciter, celeriter ve tollitur:
quare hæc ne differto, hoc enim per-
nici, celeri ve secatione, veniet. Cum
autē plures incisiones fieri necesse est,
tarda manuū opera vtitor: celer enī
in his continuū & multum laborem
dolorē ve facit. Quod si aliquatenus
intermittat, languentibus aliquam re-
quiem dat: quod & de instrumētis di-
catur, scalpris, gladiolis ve latis, exa-
cutis vtitor: sed hoc non in omnibus
æque mandamus. Quædam enim cor-
poris partes sunt, quæ celerē sangui-

anis fluctione faciunt & habent, quod non facile comprimitur, cōpescitur ve, quēadmodum sunt varices, quædāq; aliæ venæ, quæ non late secandæ aperiendæ ve sunt, nunquā enim defluere cessarent, sanguinem tamen ex his mittere confert quandoq; sed in locis non periculosis, & in quibus sanguis tenuis non est scalpris latioribus utitur: sic enim latius defluet, & copiosius, minime autem aliter: turpe quidem est valde cum ex manuū opera, chirurgia ve quod quis velit, non evenit. Cucurbitularum vero modi duo sunt vtilis & in usu, nam cum destillatio reuma ve, pcul à superiore carnis parte colligitur, circulus huius parvus sit, nec ventriosa, sed oblonga sit, manibus uti melius tractetur, nec grauis efficiatur. Talis enim si sit, saniem ex carne ad supiora recta melius trahet, maiore vero dolore, labore ve per carnem sparso: alteram similem facito, circulum autem maiore huic circūducito: sic enim ex pluribus partibus quod molestat ad locum quem oportet, eam adducere inuenies. Non

HIP. DE MEDICO

enim oportere putatur magnum cucurbitulæ circulum esse, cum ex pluribus locis humores caro non traxit, quæ si grauis sit, de superiore ad inferiora detrudet, cum cōtrā expediat, sæpiusque morbos relinquit: siquidem cum destillationes, reumata ve subter & procul à superioribus locis colliguntur & consistunt, lati magni ve circuli multa de reliqua carne trahunt, & conuellunt: quod facit, vti humiditas illic deducta ad collectam in loco inferiore saniem addatur, quæque vexant, relinquuntur. quæ vero nihil molestant, demantur & auferantur. Quanam cucurbitulæ magnitudo vsui sit, de corporis parte, cui ad mouenda est, considerato coniecturā ve facito. Cum vero locum pertruderis inciderisue, de parte inferiore sanguinem trahito, & excipito. Sanguis enī pateat oportet in locis manu tractatis, alioqui circulum contractum ne pertundito: caro nanque laborantis tenacior est. Scalpris autē, gladio, lis ve recuruis retortis ve in summo vtitor: nec valde angustis: nam sanies quandoq;

quandoq; crassa, & glutinosa exit, q̄
 si in angusta pertusioe remaneat, sub
 sistatue, periculum est. Quæ autem ve
 næ in brachiis sunt, compressionibus
 captentur, nam caro quæ tegit venas
 in multis venæ non bene quadrat, co
 aptaturue: cum enim caro fluxa sit,
 per eam sæpe vtrarumque fallit inci
 sio. Tecta siquidē, vena sufflatur, san
 guinique defluxus impeditur, pluri
 mis autē & puris, saniei ve, quapro
 pter in hac re insistito. Si quidem hæc
 duo detrimenta talis manuum ope
 ra chirurgia ve defert, secto quidem
 dolorem, laborē ve, secanti vero par
 uam gloriam, honorem ve, sed sum
 mum dedecus: quod & in omnibus
 seruari, fieri ve mandatur. Quæ qui
 dē in munere medico necessaria sunt
 instrumenta. quæque eum scire oport
 teat, qui hanc artem didicerit, profi
 teaturq; hæc sunt. quilibet enim, dē
 tiū vossellis, odontagresimve, & vuē
 vossellis staphylagresimue scit uti: nā
 earū vsus simplex ē, & facilis. De tu
 berculis aut, h ulceribusq; quæq; ma
 iorū morborū sunt maius negotium

y

HIPP. DE MEDICO

est. Tubercula. siquē posse discutē, collectionesq; eorū cōpescere, magis artificiosum est. cōsequens autem est hęc in patentem, & paruum locum deducere, tuberculiq; coactionem collectionemue planam, æqualemue reddere. Nam si plana, æqualiaue non sint, periculum est ne dehiscant, hūcusque cum difficultate curetur, sanenturue. Quare cuncta complanentur, coæquanturue, maturenturque, nec ante pertundantur, aperianturue, sua nec sponte dehiscere sinantur, q̄ matura sint. Quæ autem hoc faciant, in aliis dictum est. Quatuor autem vias hūlcera habere vidētur, quarum vna tendit alte, in profundumue, quæ fistulosa sunt, quæque sub cicatrice putria, & intrinsecus caua sunt: secunda autem in altum, & superna tendit, quæ supercrescentem carnem emittunt: tertia vero late spargitur, quæ serpentia hūlcera dicuntur: quarta sola naturaliter mouetur, & procedit. Hæ quidem sunt carnis calamitates, quibus omnibus fermē eadem conferunt: quorum quidē, signa in aliis de-

MEDICIVE OFFICIO 170

monstrata sunt, quòue pacto curentur, quòue congestum conflatumue discutiatur, plenumque vacuetur, cauum compleatur, quodque in latum tendit, de core còpescatur, deque horum signis, notisue, & curatione, in aliis dictum est: de linimentis vero seu emplastris, cataplasmatibus sic habet Linteorum quidem quæ superponuntur, præcipuus & accuratus usus esto qua morbo & hulceri commodum erit superponuntur. Circa vulnus autem emplastro, cataplasmateue utitor, quod eius usus artificiosus est, quodque plurimum prodest, quod circumponitur. Nam quod circumponitur, vulneri, hulceriue adiuumento est. Lin-teum autem seruato, quæ quidem extra vulnus, hulcusue sunt, cataplasma, seu emplastrum linimentumue adiuuat. Horum autem usus, talis esse debet. De temporibus autem quibus hæc vsui esse debent, facultatesque viresue quemadmodumque hæc quæ scripta sunt, discenda & exequenda sunt, nunc prætermittitur: quoniam rei medicæ plurimam & longiorem procura-

y ii

HIPP. DE MEDICO

tionem exigunt, quæ plurimum artē
excessit. Horum autem consequens
est de vulnerum, quæ in militia, be-
li sue fiunt, manuum opera, chirur-
giæ dicere, telorumque spitulorum
ue extractione, quæ in urbium obse-
dione, expugnationeue cadunt. Sed
horum paruus est vsus, nam raro lon-
gō que tempore ciuiles, & hostiles ex-
peditiones fiunt, sæpius hoc in publi-
cis, seu generalibus expeditionibus
euenit. Quam ob rem qui manuum
opera, chirurgiæ i his volet uti, hos
sequatur, cumque his tanquam com-
milito degat, & militet, sic enim me-
lius in hac re sese exercebit. hoc profe-
cto videtur eē circa hæc, aut de his ar-
ticiosius dixisse. Signa vero telorū
existentium, prompte, cumulatue co-
gnoscere pars est artis maxima, cir-
caque hæc manū operæ, chirurgiæ
ue. quod si inierit, nunq̃ saucius igno-
ratus præteribitur, cum non rite cura-
tur. Solus enim horū signorum peri-
tus, his, quemadmodum decuit, ma-
nus admouebit. De his autem omni-
bus, in aliis scriptum est.

HIPP. DE LEGE 171
HIPPOCRATIS DE
LEGE LIBER.



EDICA quidem ars
cunctis profecto arti-
bus præstat, sed eorum
inscitia, qui ea vtuntur
ac eorū iudicio, qui his
de hominibus non bene lentiūt, cun-
ctis iam artibus inferior habetur. Ho-
rum autem erratio hanc mihi potis-
simam causam habere videtur: quo-
niam soli medicæ arti nulla alia pœ-
na in vrbibus posita est & irrogata,
præter quā vituperationis, infamiæ
ve: quæ quidem errantes non punit,
qui psonis maxime similes sunt, quæ
in tragædiis producuntur. Figuram
autem, formamue & habitum eorū,
quos agunt, habent, tamen illi non
sunt: sic medici plurimi quidem ver-
bis, sermone, famaue sunt, opere au-
tē, & re vera ppauci. Nā qui vere me-
dicæ artis cognitionē, prudētiāue sibi
paraturus est, commodeue ad eam
se accinget, hæc nanciscatur & ha-
beat oportet: Naturam, ingeniumue,
y iii

HIPP. DE LEGE

puerilem disciplinam, bonos mores, laboris amorem, tempus. Primū quidem omniū, natura, ingenioe opus est. natura enim repugnante & contrafaciēte, cuncta cassa & vana sunt, quæ si ad optima ducat, scientia artis facile paratur & fit, quam cum prudentia acquirere oportet, discēdo in puerili ætate loco ad disciplinam cōmodo, laboris autem amorem, laboriositatemue in multum, longumue tempus producere & conferre. Disciplina hæc vti naturaliter insita videatur, dextereq; & opportune maturos fructus ferat, cuius similitudinē & in his, quæ terra gignūtur videre est. nā nostra natura, seu ingenium tanquā seges & ager est, doctorum vero præcepta, dogmataue, semina sunt: disciplina autem & scientia puerili ætate comparata suo tempore est semina in segetem, agrumue sationi paratū iactata fuisse. Locus autem, quo discitur nutrimentum est aeris, quod segeti & satis accedit: laboris vero cupiditas est opera, tractatioe, & subactio agelli: tempus autem hæc omne

nia corroborat, pleneque nutrit, præbetue quæ ad medicam artem, veræque eius cognitionem conferunt. Sicque hi, qui per vrbes vagantur & versantur, nō solum verbis & sermone, sed opere & re medici censebuntur. Nam ignoratio & imperitia malum conditorium, & thesaurus est, malūque depositum his qui habent, somniumque est & eius quædam imago, cognitionisque veræ, prudentiæque expers est, timiditatisque & ignauia & audaciæ nutritrix. Timiditas enim & ignauia præ sese impotētiam fert, sed audacia artis ignorationem. Duo enim sunt, scientia, persuasique & opinio quarum altera scire facit, secunda autem ignorare. Hæc itaque cum sacra sanctaue negotia sint, sacris, sanctisque viris demonstrantur, prophanis vero fas non est, priusquam disciplinæ sacris initientur.

y iiii

HIPP. DE SPECIE
HIPPOCRATIS, DE SPE-
CIE, ACIE VISVVE, ET
OPSIOS OCULO,
RVM CORRV-
PTA, LI.
BER.



Vm quidem species, aci-
es, & visus oculorū sua-
pte natura, spōteue cor-
rumpuntur, veneti co-
loris, cyanitidesue fiunt
quod cum venit, curationem non su-
scipit. Quæ vero maris coloris tha-
lassoideesue fiunt, sensim longo tem-
pore perduntur, corrumpunturue,
saepaque longo tempore alter oculus
perditur corrumpiturue. Quamob-
rem huius caput purgato, venasque
perurito, quique sic per exordia cura-
tur, huius malum sistitur, in peiusque
non procedit. Quæ autem inter ve-
neti marisque colorem sunt, si quidē
puero fiant, cum adoleuerit, sistuntur
& abeunt: sin autem septē annis ma-
iori, melius admodum magna, cla-
ra, proculque videt, non tamen clare

perspicit, si quidque admodum oculis admoveat, aliud vero nihil. Huic purgatio capitis perustioque confert. sanguinem vero his mittere non confert nec in colore veneto, nec marino. Lumien autem in oculis sana specie & acie puerorum mas foeminaue sit, crescente adhuc corpore, nunquam iuueris. Cum vero non crescet, oculum spectato, palpebralque radens extenuato, sicque egere videatur, & intus vrito ferramento non admodum candenti seu ignito, deinde crura distendito colligatoque, sellamque mensulamue subterponito, qua manibus firmetur, medium aliquis teneto, postea scapulares venas captato, considerato, consignatoue, deinde crassioribus ferramentis plaide perurito, ne sanguis cum vres prorumpat. Sanguinem vero, si tempus videatur ante mittito, posterioraque ad os usque perurito: postea spongiam oleo tinctam oleatamue superponito, & inurito non valde ad os usque: si vero spongia vstione causteriorue consumeretur, pinguiorem & crassio rem

HIPP. DE SPECIE

alterā indito & inurito, postea melle tinctum arum superponito. Cum autem venam penitus non vsseris, cū crusta decidet, similiter vena tēditur, tumet, completur, salit, pulsatur, cū sanguis subterfluit. Si vero penitus vsseris, minus hæc omnia patietur. Quid si primo minus perusseris, rursus perurito, spongiamque vehementius super venam fluentem positam perurito. Crustæ namque bene perustæ citius decidunt, cicatricesque ad os perustæ pulchrius veniunt. Cum autem vlcera sanescunt, rursus inflantur, tolluntur, rubent plusquam cætera: sicutique eleuata tumentesue comparēt, donec tempus superueniat transeatque, capite, pectore perusto similiter toto corpore vbi quid perustum sit. Cū autem oculi palpebras rades, tergesque, melleis lanæ puro flore circa summum conuoluto, radito tergitoue, coronamque oculi conseruato custoditoue, neue ad cartilaginem vsque peruraras caueto. Signum autem erit te satis vssisse terfisseue, cum sanguis non syncerus purusue, sed cruenta aquo-

saue sanies defluet. Tunc medicamen-
 to linimentoue aliquo, in quo æris
 flos sit, linito: post autem vstionē tera-
 sionemque cum crustæ deciderint, vl-
 ceraque purgata fuerint pullulabunt
 quæ, lineam per verticem, frontisue
 supremam partem ducito, secatoq;
 cumque sanguis defluerit, medica-
 mento quod sanguinem sistat con-
 glutinetue, linito. Huius autem & om-
 nium vltimum siue primū opus est,
 caput purgare, palpebrasque cū cras-
 siiores turgidiore sue sunt, quàm sua
 pte natura esse consueuerint, subter
 secare quàm lenissime potest. Postea
 ferramentis non admodum canden-
 tibus conseruata non læsaue pilorum
 natura radiceue superurere, tenuiue
 eris flore perusto spargere: cum vero
 crusta deciderit, sicuti cætera curato.
 Cum autem palpebræ scabie labora-
 bunt prurientue, æris floris glebulā
 cote terito, deinde palpebras eo lini-
 to spargitoue, postea squamā æris te-
 nuissime tritā succo vux acerbæ pco-
 lato, vase rubri æris commisceto, do-
 nec sicuti moretum, polētaue crasse

HIPP. DE SPECIE

scat: postea cum aruerit, trito tenuiter
 vtitor. Luscius nyctalopusue me-
 dicamentum elaterium potato, ca-
 put purgato, ceruicē posteriore par-
 te scalpro aperito, diuque sic purga-
 to præmitoue, deinde crudum bouis
 iecinoris frustulum vnum duoue quā
 maximum poterit melle tinctum de-
 uorato. Si quis oculis sanis non vide-
 at, scalpro huic verticem summāue
 frontem, siue bregma aperito, cutem
 ab osse remoueto, os secato, aquam
 educito, deinde curato, sic sanescet.
 Malo autem oculorum lippitudiniue
 seu ophthalmiæ consueto passimque
 vaganti, capitis ventriculique inferio-
 ris purgatio confert, sanguinisque
 missio: si corpus patiatue, habeatue,
 cucurbitulæque horum dolorum si
 quibusdam admoueantur secundum
 venas. Cibus modicus esto panis &
 aquæ potio, locoque obscuro cuba-
 to, proculque à fumo, igne, cæterisque
 luminibus obliquis, quæ cuncta val-
 de caueto, modo que in dextera, mo-
 do in sinistra cubato, caput ne ma-
 facito, siquidem nō confert. Linimē,

tum vero cataplasma ve, quod præ-
sertim destillationem compescat, nō
confert: si dolor non inest, tumoribus
vero qui non doleant. post acria do-
loris medicamenta data & inuncta
cum dolor cessauit post medicamētū
inunctionem, tunc linire & empla-
strare confert emplastratione ea, quæ
tibi conferre videatur. Sed neque cō-
tente diu contueri confert, lachrymā
enim prouocat, cum oculus non pos-
sit aduersus clara lumina resistere. Sed
nec etiam clausis oculis diu iacere cō-
fert, si præsertim calidum distillet,
quod retentum calefacit, quamobrē
cum non distillat & arefcit, tunc lini-
to, quia confert.

F I N I S.

PIO LECTORI.

HAbes hic præterea lector optime
hos libellos, quos huic opusculo
curauimus imprimendos: vnum, vi-
delicet, Hippocratis de medico, siue
de medici officio, alterum autem de
lege, tertium vero de specie & visu.
Nulla enim horum mentio fit in pri-
ma pagella huius voluminis: quoad
freti fuimus cuiusdam prudentis con-
silio, qui, cum opus ad bonam vsque
partem confectum erat & propemo-
dum excussum, admonitos iri nos
voluit, ipsos cum istis adiungi, quasi
magnum aliquod huius operis adiu-
mentum allaturos.

Impressum Venetiis in ædibus Hie-
ronymi Pencii Leucæsis. Sumpti-
bus Hieronymi Paulucii &
sociorum. Anno nati-
uitatis. 1530. die
primo mensis
Ianuarii.

TORL.

in hunc opus
vnde opus
dicitur vnde
medico, in
autem d
rie & v
in pri
quod
vnde con
vnde v
de propo
in no
ing, qu
opus v

188

